



28,391/B/1

53/50
Ch. Povel
FRIDERICI HENNING

MEDICINAE DOCTORIS ET PRACTICI BARDENSIS

ANALECTA LITTERARIA
EPILEPSIAM
SPECTANTIA.

*Multorum disce exemplo, quae facta sequaris,
Quae fugias! — —*

CATO.

LIPSIAE,
APUD HENRICUM GRAEFF
MDCCXCVIII.

1798

THE HISTORY OF THE

WELLINGTON COLLEGE

LIBRARY

M A 1 2 9 3 1 1 1



PROOEMIUM.

Ille profecto, qui sub docti meditantisve medici nomine circumferri velit, inter alia et historiae medicinae in omnibus partibus consideratae accuratissimum non potest non impendere studium; quoniam haec sola, quae cuivis saeculo accepta referenda sint, iuste dijudicat atque metitur; nec non quanta unicuique saeculo, auctori et inventori merita sint tribuenda, quot et quanti pretii nostra aetas fecerit progressus, ad unguem satis demonstrat et exponit. Defendet nos eadem cura ab eo, quod veteres nunquam errasse putemus, nosque impediet, ne nobis nimis indulgentes majorum opera ludibrio habeamus. Quamobrem quivis medicus, qui, sanae philosophiae alumnus, obscura hujus doctrinae illustrare et ex variis ejus commutationibus historiae humanae scientiae materiam suppeditare studet, omnia maxima qua potest animi gratitudine accipiet, quae praeteritorum saeculorum studia nobis ad hanc disciplinam illustrandam praebent emolumenta.

Quae si negari non possunt, nonnulla huc illuc de hacce materia collecta in chartam conjicere atque in lucem emittere non pudet: nec pudet, haec mea compilata nominare.

Sint enim sententiae de compilationis pretio a pluribus doctis illustribusque viris datae, quorum Baldingerum Grunerumque nominare sufficiat — sint, inquam, mihi

palladio, propugnaculo! Ego enim non alienus sum ab eorum sententia, qui bonas compilationes ad historiam nostrae scientiae illustrandam eoque facilius intelligendam nonnihil tribuere arbitrantur: consentio illis, quum bonum compilatorem non modo mechanice agere, sed quoque materiam pertractandam necessario rite cognoscere et perspicere jubeant. Itaque, qui ad hoc munus suscipiendum his armis paratus est vir, hercle risu et cavillatione docti, quod dicunt, publici non dignus est; praesertim, si opera et diligentia singulari in priorum temporum scriptis perscrutandis versatur, et exinde, quae ad rem suam pertinent, non modo trahere, sed etiam in ordinem systematicum ita redigere studet, ut quivis artis peritis totum hoc opus, et quatenus ex illo sequuntur, eo facilius perspicere possit. Nec tamen hoc meum opusculum boni compilatoris imaginem fronti praefixam habere, affirmare audeam, sed potius justis Tribunalis publici suffragiis illud dijudicandum subijciam. Ego enim sum ille, ex quo, licet forsan non omni ad hanc rem propria facultate destituto, quia amplae mihi non patent Bibliothecae, opus omnibus numeris absolutum non expectandum confiteor. Ideoque, lectores benevoli, aura lenitatis ac facilitatis Vestrae haec mea, quae Vobis tradere possum tantum pauca, adjuvare haud dedignemini, et quisque utinam Vestrum pro ingenio et animo non nihil inveniat, quod magis exponere et provehere sibi proponat!

„Votum Averrhois et Cratonis, ut nossent epilepsiae causam
„et remedium, adhucdum est votum medicorum.“

BOISSIER DE SAUVAGES.

Quod effatum hanc materiam mihi vindicatam contra adversarios infestos defendat! Nec hodie, quae ad originem,
decur-

decursum et medelam hujus morbi pertinent, ita enucleata et distincta sunt, ut non potius, quidquid hoc nomine prodesse posset, dignum sit votis nostris et omnia ejusmodi tentamina nostro adjumento et auxilio sint digna. Nemo igitur me vituperabit, quod, dissertatione mea inaugurali — sist. Analecta historica ad theoriam epilepsiae. Gryphiae 1788. — publico olim assensu celebrata *), filum istius dissertationis quasi retexere, ex integro quasi vires recipere atque in longiorem hujus materiae campum excurrere mihi proposuerim. Sed quamquam in ista, quam indigitavi, disputatione, nonnulla ad variorum de epilepsia scriptorum definitiones adjece- rim critica, hîc, quum non nisi compilandi animus est, non judicandum esse mihi visus sum, ideoque consulto non ipse judicavi et quidem eo magis, quia commentis meis inesse posset nil nisi, quod unicuique meditati et experto, quem solum hîc recogito, medico per se ipsum jam liquet. Si au- tem forsan tempus procedens alia aliaque lugendi hujus morbi observanda mihi praebeat et judicium meum cum the- oreticum tum practicum magis ematurescat atque se excolat: feliciora et utiliora non dubito fore mea practica de hac vel illa hypothese commenta; quin tutior sane erit via, qua ince- dam hoc vel illud celebratum remedium dijudicaturus, atque scriptorum in fine libri adhibitorum dignitatem et utilitatem secundum expertas artis criticae regulas significaturus, indi- caturus.

Lectoribus meis falsa obtruderem affirmando, me ipsum omnia huc illuc allegata scripta legisse et omnia citata
ex

*) vid. Allgem. Litter. Zeit. 1788. p. 231.

Baldinger's medic. u. phys. Journ. St. 27. p. 52.

Stark's Archiv für Geburtsh. B. I. St. 4. p. 170.

ex primis fontibus hausisse; quod enim ne ullus quidem compilatorum vere de se praedicet. Quantum vero fieri poterat, perlegendis et comparandis aliis scriptis me dedi, ut hoc opusculum ista, qua non immerito quaevis compilatio instructa sit, diligentia exaratum ederem. Attamen ubi non solum citata, sed etiam eorum propria adhaerendi potestas fuit, verbis parenthesi inclusis pro fine mea tantum attingere conatus sum.

In oeconomia totius operis vel typographica Celeberrimi Ploucqueti Repertorium, exemplar sua laude non defraudandum ante oculos habui. Quae licet nimias forsan impleat plagas, oculis tamen celeriter perlustrantibus non potest non esse magno adjumento.

Ex etymologica quidem hujus operis parte ad medicum fateor practicum nullum redundaturum esse usum; litteraturae vero cultor non dedignetur, quod illam hinc in chartam conjecerim.

Quod si animus sit mihi objurgandi, me causas epilepsiae remotas in justas non redegisse classes, nullo partium studio captus fateor, omnes hucusque tentatas classificationes logicis principiis haud accommodatas, easdemque difficultatibus mihi videri expositas, quas tantummodo ille aliquando vincat, qui justam et naturae cujusvis morbi et naturae effectusque omnium irritamentorum causalium sibi conciliaverit notionem, qua deficiente judicis competentis munere fungi nemo valet. Unumquemque vero artis peritum hanc causarum seriem non omnino a natura rei alienam, nec non diversis systematibus adaptatam invenire, etiam atque etiam velim et putem.

Caeterum in hoc opere et epilepsiam proprie sic dictam et eclampsiam uno tenore simulque tractavi, quia haec distinctio

etio ad alias aliasque deducit devias et quoniam in aliis morbis recensendis τὰ acuta et τὰ chronica saepius distinguendi gratia audiuntur, quibus — si quid judicem — et hîc non immerito forsan uti liceat.

Brevi porro in fine pathologicae partis adhibito observatorum, ex epilepticorum corporum sectionibus redundatorum, conspectu me medicorum usibus non male infervisse arbitror.

Therapeutica hujus morbi et olim et hodie laudata remedia, ut facilius sint conspicua, ex ordine litterarum vulgari commemoravi et quidem τὰ simplicia magna ex parte sub istis, quibus in prioribus Systematis Linnaeani editionibus audiuntur nominibus, omnibus medicis sane notis, vel eo potius commemoravi, quo magis recentiorum in historia naturali distinctiones et nomina adhucdum inter se dissentiunt. Arcana, specifica, et alia composita antepileptica sub inventorum nominibus posita, ubi fieri poterat, artem illa praeparandi in eorum comitatu habent. Longiorem forsan me in allegandis, quae olim laudabantur, remediis, finis hujus scripti defendat! Quae enim de novis remediis memoratu sunt digna, uniuscujusque medici animo magis obversantur, eademque facillime perscrutari quivis potest. Quae majores experti sunt, diligentius sunt colligenda, ne tempore rapaci deleatur, quidquid ex iis forsan granulorum instar aureorum nostra cura et diligentia sit dignum. Sunt, fateor, quae huc illuc occurrunt, Obsoleta, Superstitiosa etc. deridenda, nec tamen neminem me vituperaturum puto, quod illa commemoravi; forma enim et usus eorum pristini temporis genium et hodie non ubique extinctum nobis adumbrant. Caeteroquin cuivis medico vel gaudio vel dolori sit audire, quod multa hodie laudata remedia jam priscis temporibus,
alia

alia forsan forma induta, maxime in deliciis fuerint, quorum exempla — Columbae applicatio externa et Afini sanguis — hoc probabunt.

Chronologicum istarum, quae de epilepsia editae sunt, monographiarum indicein magna ex parte Bibliothecae practicae Hallerianae acceptum refero et huc illuc non nihil de meis ipse adjeci. Interdum forsan unam eandemque dissertationem uno eodemque sub anno collocatam duplici loco et sub praefidis et respondentis nomine a me esse receptam haud negare velim, quum, denegato mihi saepius istius scriptiunculae aspectu et variante citatorum modo, non semper hoc sat satis distinguere mihi licuerit.

Verum enim vero, Lectores benevoli, ne nimis vestra abuti videar patientia, vela praefationis meae hinc contraham pedemque hinc figam, favori et benevolentiae vestrae me commendaturus. Tantummodo in votis mihi est, ut haecce collectio unum alterumve Hippocraticae artis cultorem ad lugendi hujus morbi feliciorum provehat medelam et cuidam futuro hujus morbi illustratori quamdam, etsi exilem, offerat symbolam! En jam, Lectores benevoli, quae opusculo meo praemittenda judicavi, ut benignum assequeretur judicem. Valete faveteque mihi. Dabam Bardiae VIII. Iduum Januarii. MDCCXCVIII.

P A R S I.

E t y m o l o g i c a.

Cfr. Bebelii (Henr.) nomenclatura morborum corporis humani graecolatina, quae prodit cum aliis Ejusd. opp. Argentorat. 1513. 4.
Dietrichii (Joh. Conrad.) Jatropeum hippocraticum, p. 452.

Analempsia v. Epilentia. (citat. e Barthol. Anglico.)

Analepsia a Riverio passim nominatur.

Apoplexia parva a Constantino medico teste Barth. Anglic. de propriet. rerum L. VII. cap. IX.

Astralis morbus apud

Paracels. de morb. caduc. Lib. III. §. 3.

putabatur enim ab astrorum conjunctione dependere. vid.

Forest. Observat. Lib. X. obs. 60.

Hartmann. introd. in Philos. vital. p. 19 et 32.

et ab singulis astris vid.

Ganivet. amic. medicor. Frfrit. 1614. p. 266. (a Mercurio.)

Caciva gutta.

Vita St. Praejecti, Lib. II.

Caducus morbus. (a repentino epilepticorum in terram casu.)

Barthol. de Moor (in Pathologia Cerebri, Amstelod. 1703. pag. 362.) distinguit morbum caducum ab epilepsia, sub illo intelligens morbum habitualement, sub hac symptomaticas ejus species.

Cadux passio.

Alexand. Jatrofoph. L. I.

Catalempsia v. *Epilentia*. (citat. e Barth. Anglico.)

Comitialis morbus jam apud Plinium Lib. VIII. 32. f. 50. et Celsum
L. III. cap. 23.

Seu, quod in comitiis aliisque hominum congregationibus illo morbo
laborantes maxime infestarentur, seu, quod comitia, in quibus ali-
quis epilepticus cecidisset, dirimerentur, quod suo suffragio etiam
confirmat *Quint. Seren. Sammonicus* p. 162.

*Est subiti species morbi, cui nomen ab illo est,
Quod fieri nobis suffragia iusto recuset:
Saepe etenim membris acri languore caducis
Concilium populi Labes horrenda diremit.*

Pro sinistro enim habebatur omine secundum

Vincent. Alfarium a Cruce de epileps. L. IV. Sect. I.

Seu, quia iste morbus eo infestatum a comitiis excludebat.

Seneca, de Ira L. III. 2.

Duretus ab omnibus dissent, illamque rationem vult, quod in con-
cionibus publicis propter metum oratoribus identidem eveniat.

Convivalis morbus, quia paroxysmus in conviviis facile recurrere solet.

Langii oper. medic. pract. T. III. p. 58.

Deifica lues,
Divinus morbus } ab Apulejo et Platone,

quia creditur, hunc morbum a numine quodam aut daemone esse de-
missum, contra quam opinionem jam multa philosophatur Autor libri
pseudohippocratici de morbo sacro.

Cfr. Hieron. Tacquet et Bonaventura Hachette, non
ergo in Epilepsia *ἁγιῶν τῶν*. Parisiis 1598.

Eclactisma s. *Eclactismus* denotat eclampsiam incipientem, seu agitationem
istam, qua infantes exiliunt et calcitrant propter nervorum et cerebri
irritationem, qua voce jam usus est

Hippocrates Coac. Lib. III. aph. 35.

Cfr. J. Gorraei Definition. L. XXIII.

Eclampsia denotat epilepsiam acutam.

Eclam-

Eclampsia.

vid. J. Gorraei Definition. l. c.

Epilenticus morbus.

Alexand. Jatrofoph. L. I. cap. 8.

Epilencia in Glossario quodam latino-gallico. vid.

Onomatol. med. pract. T. I. p. 2439.

Epilensia.

Aegidius Corborienfis in *Mscr. Carm.* de medicamentorum virtutibus. v. Onom. med. pract. T. I. p. 2440.

Epilensis in *Capitulis general.* Sanct. Victoris Massiliensis. (Mscr.)

v. Onom. med. pr. l. c.

Epilentia.

Ugotio. v. Onomat. med. pr. T. I. p. 2439.

Barthol. Anglicus de proprietatibus rerum Lib. VII. cap. IX. ubi sequentia invenies:

„Epilentia fit in capite ex materia existente in cerebro;

Analempsia vero fit ex materia existente in stomacho, non in cavitate, sed in arteriis et nervis ipsius stomachi, per quorum medietatem materia ebulliens rapitur ad cerebrum;

Catalepsia vero fit ex materia existente in extremitatibus, ut in manibus et pedibus, quae propriis quidem signis dignoscitur.“

Epilentica passio.

Bernard. a Breidenbach itinerar. hierosolymit. p. 106.

Epilenticus morbus.

Du Cange Glossarium, p. 97.

Epilenticus morbus.

Sanct. Odonis Legenda de Sancto Geraldo L. IV. cap. 8.

Epilepsia, e graeca lingua ortum trahens et Hippocrati II. aphor. 45. III. aphor. 29. et alibi jam usitatum nomen. Ab ἐπιλαμβάνω, (prehendo, invado,) quia morbus iste ex improvise hominem invadat autprehendat: vid.

Thom. Burnet Hippocrates contractus, Edinburg. 1685. 12.

Lib. V. sect. 4.

Non ab ἐπὶ et laedo, ut latino-barbari putarunt.

Fœdus morbus (αἰσχρὸς νοῦσος).

Galen. de loc. affect. Lib. III.

Herculeus s. *Heracleus morbus* (Ἡρακλεῖος νοῦσος).

Lib. pseudohippocr. de morb. mulier. Lib. I. S. XVII. 6.

non confundendus cum mania, cui secundum Erotianum idem nomen saepius datum est. Hocce autem nomine vocatur epilepsia, aut propter vehementiam et difficilem ejus curationem.

Galen. comm. in L. VI. Epidem. Ed. Chart. T. IX. p. 550.

quem locum Hippocratis etsi non plane clarum eodem tamen modo jam declarat

Alexander Trallian. Lib. I. cap. 15: Opp. ed. Guinth. Andernac. Basil. 1556. 8. p. 62.

aut, quia Herculem eo correptum fuisse putant, quod demonstrari videtur ex loco quodam

Sophocli. Trachin. V. 797.

Cfr. Aristotel. Problem. Sect. XXX. Quaest. I.

Andr. Reyheri Theatrum Romano-teutonicum, sub voce: Comitialis.

aut, quia herculeo opus est robore, ut aegroti paroxysmi tempore teneantur. (διὰ τὸ δυσκαταμάχῃτον. Galen. l. c.)

Ger. van Swieten Comment. in Boerh. Aphor. ed. Hilpershus. T. III. p. 391.

Infantis s. *puerilis morbus* (παιδικὸν νόσημα), quia huic aetati frequentior.

Hippocr. de aëre, loc. et aqu. ed. Chart. T. VI. p. 190.

Paul. Aeginet. L. III. cap. XIII. p. 29.

Insputatus morbus, quia epilepticos insputare soliti erant veteres. vid.

Plaut. Captiv. Act. III. Scen. 4.

Plin. Hist. nat. Lib. XXVIII. cap. 4. ubi sequentia verba legis:

Ita despuimus comitiales morbos, hoc est, contagia regerimus.

Cūr veteres in epilepticos exspuerunt? vid.

Camerarii Syllog. memorab. medic. Cent. XVI. part. 12.

Plura de hac re videas in

Wolfg. Wedel Pr. de morb. insputato. Jenae 1687.

Ejusd. Exercit. med. philolog. sacr. et profan. Dec. IV. exercit. 8
D. Er-

D. Ernest. Lud. Nebel epist. gratul. ad illustr. Thon de mor-
bis veterum obscuris. Giesſae 1794. 8.

Johannis (Sti.) Morbus: ob vires medicatrices Sancto Johanni tributas:

Du Cange. vid. Onomat. med. pract. T. I. p. 95.

aut. quia veteres Catholici morbi originem iratis Sanctis tribuebant,
quam opinionem profert

Joh. Storch v. d. Kinderkhten. B. II. Eysenach 1750. 8. p. 69.

Lunaticus morbus. Eo, quod ad lunae phasēs commoveatur;

Arætaeus de caus. et sign. morb. L. I. cap. 4.

feu, quia tempore interlunii nati huic morbo magis obnoxii judi-
centur.

Alexand. Trallian. L. I. cap. 15.

Fr. Hofmann institut. L. III. cap. 88.

Lunaticorum in sacris bibliis (e. g. Matthaei IV. 24. et XVII. 15.)
nominatorum morbum veram fuisse epilepsiam elucere videtur e Marc.
IX. 18. Luc. IX. 39.

Major morbus, (μεγας, Hippocr.) ob vehementiam ita vocatus.

Celsus de re medic. L. III. cap. 28.

Mater puerorum, vocatur a Schneidero. Oritur ex arabico idiomate,
quo vocatur Alferetia. Marcus Mironius autem putat, matrem
puerorum apud Arabes esse spasmum ex exinanitione.

Marc. Mironii L. II. de infantibus. Turon. 1553. fol.

Mensalis morbus, vid. *Convivalis morbus.*

Peditio: quia pedes in paroxysmo inordinate moveantur.

Avicenna Lib. de Epilepsia.

C. Gaulken D. de Epilepsia. Erford. 1693.

Primus morbus, vocatur a Lucretio.

Puerilis morbus, vid. *Infantilis.*

Sacer morbus (ἱερὸν νοσος), non confundendus cum alio morbo sacro dicto,
qui et Ignis Sti. Antonii vocatur, de quo vid.

Histoire de la Société royale de Medecine à Paris, 1776. Tom. II.
p. 260. sq.

Samml. der gemeinnütz. Aufsätze a. d. Schrift. d. königl. medic.
Gesellsch. zu Paris. Übers. u. m. Anmerk. von D. C. G. Gru-
ner. Th. I. Halle 1784. 8. p. 354.

Treu-

Treuner D. f. morborum migrationes. Jenae 1783.

Jam a graecis scriptoribus usitatum nomen,

feu, quia omne magnum sacrum quandoque vocatur, vid.

Aretaeus de causis et signis morborum L. I. cap. 4.

feu, quod animi partem rationalem, quae longe sanctissima sit, violentet, vid.

Apulej. in Apologia.

feu, quia sacra illa cerebri penetralia occupare putatur, vid.

Joel Langelott. D. de epilepsia. Lugd. Bat. 1647.

feu, quia sacer valet idem ac execrabilis, ut apud Virgilium:

Auri sacra fames quid non mortalia etc.

feu, quod crederent, hunc morbum a numine quodam aut daemone esse demissum. vid. *Divinus morbus*. Antiquitus enim hujusce morbi originem daemonibus esse tributum ideoque eo affectos publicis commendatos esse precibus, probat locus quidam in

Gregor. Nazianzen. Orat. XVI. p. 242.

Cfr. Wier. de praestig. daemon. L. V. cap. 14. p. 494.

De hacce epilepsiae denominatione cfr.

Mizaldi memorabil. Cent. IV. aphor. 2.

Scelestus morbus.

Honor. Bouche Tr. de morbo scelerato. Avenionae 1634. 8.

Sideratus morbus; ob astrorum influxum in epilepsiam.

Joh. Storch l. c. p. 69. cfr. *Astralis morbus*.

Sonticus morbus; ob noxae gravitatem, quae justam non comparendi coram iudicio excusationem praebuit.

Plin. Hist. nat. L. XXXVI. cap. 9.

Gellii noct. att. L. XX. cap. 1.

feu, quia, quos vexabat, ab omni militia immunes reddebat, ne ipsi sibi vim inferrent.

cfr. Pandect. V. 1. 46. — XXI. 1. 65. — XLI. 1. 60.

Sputatorius morbus; quia homines sani ad ejusmodi aegroti conspectum exsputare solent, vel, quia ille morbus salivationem aliquando comitem habet indeque a chemicis ad morbos mercuriales refertur. vid.

Theoph. a Meza compend. pract. Fasc. V. Havniae 1781. p. 14.

Valen-

Valentini (Str.) morbus. cfr. *Str. Johannis morbus.*

Du Cange vid. *Onomatol. med. pract.* T. I. p. 95.

Viridellus f. Vitriolatus morbus.

Paracels. paramir. L. I. de origine morborum ex tribus primis
substant. cap. 6. (quia vitriolum remedium ejus esse putat.)

Anglice.

Epilepsy. The falling sickness.

Arabice.

Alferetia. vid. Christ. a Vega opp. omn. Lugd. 1587. fol. p. 311.

Kabat f. Kabal. (significat quoque obsessionem daemoniacam.)

vid. C. F. Volney's Reise nach Syrien und Aegypten, a. d. Franz.

Th. II. Jena, 1788. p. 24. not.

Gallice.

Epilepsie. Haut mal. Mal caduc. Mal de St. Jean. Mal de la terre.

Vapeurs epileptiques.

Germanic.

Epilepsie. Fallsucht. Die fallende Sucht. Die schwere Krankheit. Die schwere Noth. Das schwere Gebrechen. Das böse Wesen. Das Unglück. Das Elend. Der böse Feh! Die Gichter. Der Feigel (in Saxonia inferiore).

Epilepsiam infantilem praecipue denotant sequentia nomina:

Der Jammier. Der Fraisch (in Suevia). Das Scheurchen. Der Ringel (in Salisburg).

Hispan.

Gota coral. Morbo caduco.

Derivationem nominis hispanici *gota coral* vid.

Christoph. de Vega opp. omn. Lugd. 1537. fol. p. 311.

„Quoniam aegrotantes ferunt in accessionis principio, cum thoracis motus vitiatur, animali facultate non transmissa libere, veluti guttam aquae frigidae a capite descendere in cor, cum tamen nihil aliud sit, quod sentiunt praeter impedimentum distensionis thoracis et refrigerii cordis.“

Hol-

Holland.

Fallende Ziekte. Sint Jans euwel.

Stuype denotat epilepsiam infantum.

Ital.

Mal caduco. La bruta (Venetiis).

Suecic.

Fallende Sot. Hjärtsprång, quod autem potius denotat epilepsiam infantilem.

P A R S II.

P a t h o l o g i c a.

C A P. I.

Variae definitiones epilepsiae.

1. **T**erraemotus microcosmicus ab effervescencia spiritus vitae ortum trahens.
Theophr. Paracelsus L. de morb. caduco, p. 596.
2. Motus convulsivus.
Waldschmidt praxis. p. 337.
3. Convulsio f. concussio totius corporis.
River. praxis L. I. cap. 7.
Barbette prax. Barbett. L. I. cap. 1.
Henr. Petraei nosolog. harmon. T. I. diff. 6.
Thom. Willis de morb. convuls. cap. 2.
Fernel. pathol. L. V. cap. 3.
A. E. Büchner rsp. Chr. von Steinen D. de atonia nervorum.
Halaë, 1749. §. 57.
4. Ablatio et cessatio actionum principum sensuum motusque.
Sennert. praxis, L. I. p. 590.
Plater. praxis. T. I. p. 14.
Unzer. de epileps. L. I. cap. 2.
Johnston. univers. med. L. VIII. art. 2.
C. V. Schneider rsp. Sam. Sturm D. de epileps. Viteberg.
1650. §. 3.

5. Defectio cum convulsione.

Michaelis oper. pract. Caf. VI. p. 384.

6. Contractio nervorum cum praeternaturali corporis commotione et cessatione.

Gerh. Blasius in medic. curat. special. cap. 38.

7. In vita, violenta, praeternaturalis partium nerveo-membranosarum, hinc musculosarum et totius corporis concussio, cum sensuum abolitione stipata, a membranarum, cerebrum, spinalem medullam ac nervos cingentium, spasmodica strictura et hinc fluidi mobilissimi impetuosiori in organa motoria, pariori in sensoria influxu natales suos mutuans.

Fr. Hofmann. opp. omn. T. III. p. 9.

8. Membranarum, quae cerebrum, medullam spinalem et nervos includunt, spasmodica contrictio.

Henr. v. d. Beets D. de morbo comitiali. L. B. 1643.

H. P. Juch. rsp. J. G. Hannimann. D. de epilepsia. Erford. 1741.

9. Convulsio cum sensuum interceptione.

Petr. Velden D. de epilepsia. L. B. 1648.

10. Aegritudo prohibens membra animata ab operationibus sensus et motus.

Savanarola Tr. de epileps. p. 88. coroll. 3. litt. E.

11. Subitanea cessatio omnium sensuum cum motu partium convulsivo a fermento quodam peregrino in corpore cacoehymico nervosum genus irritante orta.

A. H. Fasch' rsp. Joh. Fuhrmann D. de epilepsia. Jenae 1679.

12. Varia et mixta actionum praesertim animalium laesio cum aliorum saepe symptomatum concursu, imprimis motus localis depravatus totius corporis vel certorum ejus membrorum, cumque sensuum hebetudine ab aura acida spiritus animales et lympham potissimum diversimode inquinante dependens.

J. V. Jägerfeldt D. f. infantem epilepticum. Altdorf. 1684.

13. Detentio principum functionum sensuumque quum internorum tum externorum cum motu convulsivo totius corporis per intervalla repente, ab insigni membranarum cerebri et nervorum irritatione dependens.

Fasch' rsp. Dan. Boefius D. de epilepsia. Jenae 1686. p. 6.

14. Con-

14. Convulsio repentina et universalis per intervalla repetens cum sensuum internorum abolitione e repletionem potissimum ortum ducens.
Barthol. de Moor pathol. cerebr. p. 403.
15. Motus convulsivus, qui materialem causam pro fundamento non habet, sed sine aliorum morborum complicatione e consuetudine et ideali tantum ratione, certis plerumque temporibus et non raro circa phases lunae occurrit, atque per quascunque causas occasionales, praecipue autem patheticas, facile excitatur.
J. Junker. rsp. Abr. ab Heimbach D. de nova methodo curandi epilepsiam sine specificis. Halae 1741.
16. Motus convulsivus partium musculosarum, tendinearum, membranosarum et nervosarum corporis a natura excitatus ad eliminandam materiam nocivam et peregrinam.
Joh. Storch v. d. Kinderkrankh. B. II. p. 70.
17. Invita tonica musculorum fibrarumque contractio cum mentis functionibus simul abolitis novaque cum periodo rediens.
J. de Gorter. Compend. medicin. P. I. Francof. et Lipf. 1744. p. 117.
18. Genus morbi spasmodici clonici chronici intermittentis, cujus accessus subita interceptione sensuum, variorum musculorum agitatione et dyspnoea notatur.
Fr. Boissier de Sauvages nosol. method. T. II. P. II. p. 86.
19. Convulsio major minorve plures paucioresve corporis partes exagitant, rediens cum mentis sensuumque interceptione.
Tiffot v. d. Epilepsie. p. I.
20. Convulsio cum sopore.
W. Cullen Anfangsgr. der pr. Arzneiw. Th. III. a. d. Engl. Leipzig 1784. p. 151.
21. Sensuum omnium quam internorum tam externorum subitanea interceptio cum violenta alternaque musculorum prope omnium voluntati famulantium contractione et relaxatione plus minus perdurans, donec tandem homo ita affectus ad pristinam integritatem et quietem redeat, quid ei contigerit, plane ignarus et nescius.
Barber. a Kanisfeld Institut. medicin. practie. Vol. III. Lipsiae 1787. p. 218.

22. Morbus ex impetu vis vitalis nimio in sensorium commune directo, sensorii functiones, quae motibus voluntariis praesunt, nimium incitante.

C. G. van der Heuvell tentamen nosologicum. Lugd. Batav. 1787. 8.

C A P. II.

Variae auctorum de parte in epilepsia affecta opiniones.

1. Cerebrum.

Autor Lib. pseudohipp. de morbo sacro. (passim.)

Galen. de loc. affect. L. III. cap. 7.

Paul. Aeginet. L. III. cap. 13.

Carol. Piso de morb. a colluv. serof. Sect. II. part. 2. p. 145.

Rolfink. Epitom. method. cognosc. et curand. affect. cap. 18.

Plater. prax. l. c.

Unzer l. c. Lib. I. cap. 5.

Blasius l. c. cap. 38.

van Swieten l. c. T. III. p. 401.

Tiffot l. c. p. 22.

Contra hanc opinionem multa profert

Conr. Vict. Schneider de Catarrho. Viteb. 1661. 4. Lib. III.

2. Ventriculi posteriores cerebri.

Don. Ant. Altomare de medend. corp. hum. malis. Venet.

1558. fol. L. I. cap. 18. p. 168.

3. Spiritus animales intra cerebri medullium confiti.

Thom. Willis de morb. convuls. cap. 2.

G. K. Tatai Hercules vere cognitus, p. 10 et 11.

4. Nervi, alii liberi, alii obstructi.

J. Walaëus rſp. Joh. de Schaſter de Epilepsia. Lugd. Batav.

1646. §. 5.

J. E. Schaper Progr. de epilepsia. Rostoch. 1695.

5. Cor.

5. *Cor.*

Quercetan. Tetras. cap. 8.

6. *Os stomachi* (Cardia).

Helmont. Tr. de fede anim. §. 7. pag. 274.

C A P. III.

Epilepsiae causa proxima.

1. *Tὸ πνεῦμα* inclusum omnia movens.

Aretaeus de morb. acut. Lib. I. cap. 5.

2. Humor crassus viscosus (pituita scil. et *μελαγχολή*, ut cap. 6. se explicat) ventriculos ac meatus cerebri replens et obstruens.

Galen. de loc. affect. Lib. III. cap. 5.

Roder. de Vega opera. Lugd. 1593. p. 368. Plures hujus sententiae asseclas recenset

Matth. Unzer de epileps. L. I. cap. 12.

3. Humor humidus, quo ventriculi cerebri non perfecte opilantur.

Constantin. Medicus. vid. Barthol. Anglic. de propriet. rer. Lib. VII. cap. 9.

4. Occlusio ventriculi medii aut postremi cerebri vel obstructio arteriarum, carotidum venarumque jugularium.

Vinc. Alfarii a Cruce de epileps. praelect. bononiens. L. III. Venet. 1603. 4.

5. Nimia repletio aut evacuatio vasorum capitis.

Barthol. de Moor patholog. cerebri. Amstelod. 1704.

Archib. Pitcairn Element. medic. Leid. 1737.

Contra hanc sententiam pugnat

Bazin non ergo a sola copia humoris epilepsia. Parisiis 1610.

6. Compressio et subsidencia cavitatum et meatuum cerebri.

Hercul. Saxonia praelect. pract. P. I. Cap. 15. §. 9.

Duncan. Liddellii art. medic. Lib. III, cap. 6.

7. Lympha acris nervos vellicans.

Barbette praxis. Cap. I. de epilepsia.

8. Lym-

8. Lympha acido auctera.

Decker vid. Gaulken Diff. cit. Sect. X.

9. Moleculae acres volatiles aliquo liquore contentae cerebrum irritantes.

Theod. Zwinger D. de epilepsia. Basil. 1714.

10. Sanguinis intemperies frigida, crassa, viscosa, salinis particulis immixta cum fermento in tubulis solidarum partium, non nisi singulari de causa inde eluendo, non modico, non solido, sed valde peregrino, poros habente omnino abludentes a reliquis sanguinis et humorum poris et hinc aetherem intra sese sovente, qui non debet non cum sanguine commixtus ferinum ejus ciere motum et quasi in spumam illum adigere non absimili ratione atque ovi accidit albumini conquassato aut aquae salinae ad littora maris valide a vento commotae. Sicut enim illa spumescit et in bullas vertitur, sic etiam viscositati existenti in sanguine dum jungitur id fermentum falsum, sanguinem cum humoribus circulantibus cum spiritibus animalibus, qui in cerebri versantur ventriculis, in spumam commutat, cui spumae eodem includuntur modo spiritus, quo ventus sive aer aquae saponi mistae.

A. H. Fasch rsp. J. Fuhrmann D. de epilepsia. Jenae 1679. Thef. IX.

11. Ichorefcentia humorum imprimis sanguinis fermentifica.

Wedel vid. Schaper rsp. Bartholomaei de epilepsia. Rostoch. 1695. Thef. IV.

12. Fermentum acefcens perversum in liene.

Hogelande in oeconom. animal. p. 186.

13. Acidum nervos irritans.

Waldschmidt. praxis. p. 10.

14. Vaporosa et tenuis quaedam materia, qualem Pelops, Galeni praecceptor, πνευματικὴν τὴν ἀσπερ αἶρα vocitabat, quae tam acrimonia quam mordacitate ac qualitate venenata cerebri substantiae prorsus infensa, meninges ac nervosum genus ad noxii expulsionem stimulat.

Joel. Langelott D. de epilepsia. Lugd. Bat. 1647.

15. Irritatio facultatis expultricis in membranis cerebri, quod exemplo ventriculi a re acri ad singultum stimulat declarat Galenus (de loc. affect. L. III. cap. 7.), et similitudine sternutationis, quam et diminutam

- nutam epilepsiam vocat, illustrat Avicenna (Fen. I. L. III. Tract. 5. cap. 8.).
 Petr. Velden. diss. cit. §. IV.
 Wolfg. Wedel rfp. Roefer de epilepsia. Jenae 1673.
 Fernél. de abdit. rerum caus. L. II. cap. 15.
 Sennert. instit. med. L. II. P. III. Sect. 2. cap. 6.
16. Divisio seu solutio unitatis cerebri a mordicante et vellicante acrimonia.
 Hieron. Mercurialis de morb. pueror. L. II. cap. 8.
 Lud. Mercatus de intern. morb. curat. L. I. cap. 16.
 — — — de affect. mulier. L. II. c. 5.
17. Vapores corrupti et virulenti qualitatis tenuis, mordacis, venenatae.
 Forest. observat. L. X. obs. 54.
 Antiparacels. p. 107.
 Heurn. L. I. cap. 22.
 Henr. van der Beets D. de morb. comitial. Lugd. Batav. 1643.
 §. 7.
 Horst. quaest. therap. Dec. II. quaest. 9.
 Sennert. instit. L. II. P. II. Sect. 2. cap. 6.
18. Mercurialis, salinus, vitriolatus liquor.
 Paracelsus de morb. caduc. l. c.
 — — — Schol. ad. 3. paragr. cap. 2. §. 3.
 Hieron. Petraeus in nosol. harmon. Diss. 6. thes. 16. squ.
 Unzer de epilepsia, cap. 4 et 14.
 Sennert. prax. med. L. I. P. II. cap. 31. qu. 3.
19. Vapores et humores subito in cerebrum ruentes.
 Car. Piso l. c. part. II. p. 146.
20. Spiritus male affectus.
 Langii oper. med. pract. T. III. p. 60.
 Gaulken. l. c. §. 9.
21. Spiritus acidus acris.
 de la Boe Sylvius vid. Gaulken. l. c. §. 10.
22. Spiritus animalis e cerebro in nervos nimia profusio.
 Plater. l. c. T. I. cap. 2.
 Hoechstatter. obs. med. rar. Dec. IV. cas. I. Schol.

23. Archeus furiosus e stomacho prodiens.
) Helmont. Tr. de ideis morbosis.
 — — de morb. archealib. §. 17. sqv.
 H. Cöller. D. de morb. sacro. Gieslæ 1658.
24. Heterogeneae et explosivae particulae nitrofulphureae in cerebri medulla.
 Willis de morb. convulsiv. cap. 2 et 7.
 Contra hanc sententiam:
 Michaelis oper. med. p. 574.
25. Spiritus animalis impetuosior et depravatus motus.
 Sylvius in praxi L. II. cap. 20. §. 73.
26. Inordinatus et perversus spirituum animalium motus in cerebro et violenta explosio in nervos.
 Mich. Ettmüller rsp. G. Heintke D. f. Valetudinarium infantile. Lipsiae 1675. §. 30.
27. Halitus quidam mixtus e nitroso et vitriolaceo.
 J. V. Jägerschmidt diss. cit. p. 7.
 Michaelis oper. med. p. 578. (et salinose styptico.)
28. Retractio nervorum.
 Joh. de Schafer diss. cit. §. 4.
29. Violenta spasmodica constrictio durae matris, quae nervorum omniumque totius corporis membranarum quasi mater existit, qua constricta influxus spirituum animalium inordinatus redditur.
 F. Hofmann. rsp. A. P. Bornemann D. sist. affectus haereditarios. Halae 1699. p. 23.
30. Major variusque fluidi nervei in nervos motorios influxus.
 J. C. de Steinen diss. cit. §. 53.
31. Spiritus animales omne praeternaturale in corpore humano fugientes introitum impedire tentantes tanto molimine, ut quandoque membra ignobiliora opprimantur.
 C. F. Luther rsp. D. H. Höfllich D. de epilepsia. Kiloniae 1730. pag. 6.
32. Vis nervorum venas constringendi indeque musculos contrahendi modo nimio aucta.

Musgrave Speculations and conjectures on the qualities of the nerves, Sect. I.

33. Is cerebri status, in quo eae cerebri partes claudantur, quae ad sensus respiciunt, apertis manentibus iis, quae ad voluntarios motus pertinent, et celerius a spiritibus animalibus perfluxis.

H. Boerhave praelect. academ. T. VI.

34. Nimia cerebri in nervos motorios, nulla in sentientes actio.

J. van Swieten l. c. p. 455.

Tralles de usu opii. Sect. III. p. 17.

35. Vehemens impulsio fluidi nervei in organa sensus et motus et impedio ejus regressus.

C. G. Ludwig institut. clin. p. 309.

36. Aër elasticus in intestinis clausus.

J. G. Pietsch erklärte Ursach und Cur der fallenden Sucht. Hamburg u. Leipzig 1753. p. 40.

37. Abundantia viscidae pituitae et aurae elasticae in primis viis.

Unzer der Arzt. T. VIII. p. 67. squ.

cui sententiae quoque inclinant

Hirschel, Gedank. die Heilart d. fallenden Sucht betreff. 2te Aufl.

Berlin 1770. p. 6 — 11.

Fothergill in Medical observat. and inquiries. Vol. VI. Lond.

1784.

38. Compressio aut contractio originum nervorum, qua spiritus animales in nervos motorios pari modo, quo cordis contractione sanguis in arterias, expelluntur, eorundem autem in nervos sensorios, aequae ac sanguinis contracto corde e venis in cor, introitus prohibetur.

Tiffot l. c. p. 27 — 29.

39. Digestionis functiones laesae indeque orta humorum spissitudo.

E. J. P. Houffet D. sur les parties sensibles du corps animal etc.

Lausann. 1770. 8.

40. Morbosa sensus interni mutatio.

Preffav in nouveau traité des vapeurs, ou traité des maladies des nerfs, dans lequel on developpe les vrais principes des vapeurs.

à Lyon 1770. 12. p. 102.

41. Extensio cerebri.

W. Threlful Essay on Epilepsy, in which a new theorie of that disease is attempted, from which the proximate cause is investigated and indications brought from thence, shewing clearly the consistency of the method of cure. London 1772. 8.

42. Impetus vis vitalis nimius in sensorium commune directus, sensorii functiones, quae motibus voluntariis praesunt, nimium incitans.

C. G. van den Heuvell tentamen nosologicum. Lugd. Batav. 1787. 8.

C A P. IV.

Litteraria ad causas epilepsiae remotas pertinentia.

S E C T. I.

Dispositio haereditaria, s. Parentes epileptici.

Cfr. Auctor libr. pseudohippocr. de morbo sacro. S. V. text. 7. 8.

Beaumes v. d. Convulsion. d. Kinder. a. d. Franz. Leipz. 1791. 8. pag. 6.

Boerhave aphorism. 1075. — (non semper epilepsiam haereditariam generationis ordines prosequi, sed saepius gradus intermedios transilire contendit.)

Cunningham (Alexand.) D. de epilepsia. Lugd. Bat. 1725. p. 11.

Frank (J. P.) System der med. Poliz. Th. I. p. 297. squ.

Mithof (H. B.) D. de sede irritamenti in epileps. Goetting. 1788. 4.

Rougemont (J. C.) Abh. v. d. erblichen Krankheiten; a. d. Franzöf. v. F. G. Wegeler. Frankf. 1794. 8.

v. Swieten Commentar. edit. Hilpershus. T. III. p. 404.

Tiffot l. c. p. 31. et not. transl. 13.

Exempla observata habent:

Boerhave prax. medic. T. V. p. 30. (omnibus liberis patris epileptici hunc morbum lethalem fuisse vidit.)

Brun-

- Brunner Confil. n. 16.
 E. N. C. Dec. III. ann. IX et X. obs. 126.
 Erberfeld D. de epilepsia haereditaria casum exhibens. Duis-
 burg. 1705.
 Fernel. Physiolog. L. VII. cap. 6.
 Holler. Cent. II. curat. 47.
 Linnée, rsp. P. Zetzel D. f. confectaria electrico-medica. Up-
 sal. 1754.
 Marcell. Donat. med. histor. mirabil. L. IV. c. 18.
 Michaelis medic. Bibl. B. I. p. 360.
 Poterii Curation. Cent. II. n. 47.
 Quarin. animadversion. p. 15.
 Saillant in Memoir. d. l. Societ. roy. d. med. T. III. p. 305.
 Stahl (G. E.) D. de haereditaria dispositione ad varios affectus.
 Halae 1706. p. 48. (omnia cujusdam familiae membra puber-
 tatis tempore epilepsia infesta vidit.)
 Stoll de morbis chronic. T. II. p. 2.
 Wepfer observat. 131.
 Zacut. Lusitan. prax. admir. L. I. obs. 36. (Patris epileptici
 filii VIII. et nepotes III. quoque epilepsia laborantes.)

Scholion.

Hic optimus mihi videtur locus ad interponendam opinionem quorundam
 veterum, epilepsiam nempe fieri, ubi concipitur homo fluentibus
 menses, uti testantur Arabes, ideoque in legibus Mosais coitum
 cum muliere menstruata esse interdictum.

vid. Theoph. de Meza Compend. med. pract. Fascic. V. Hav-
 niae 1781. p. 14.

SECT. II.

Matris partum in utero gerentis variae commotiones.

- Cfr. Alberti Jurisprud. med. append. p. 33.
 Hofmann (Fr.) D. de morb. foetuum in utero materno. Halae 1702.
 §. 7. p. 9.
 Reiniger (E. S.) D. de prole parentum culpas luente. Lips. 1774. p. 37.

Sprengel (K.) in annot. ad Buchan's Hausärzeneikunde. Altenburg. 1792. (negat huncce epilepsiae originem.)

v. Swieten Comment. T. III. p. 406.

Tiffot l. c. p. 33 — 38. cfr. et not. Ackermanni.

Exempla enarrant:

E. N. C. Dec. II. ann. IV. Append. p. 209. (Congenita epilepsia re-
currentis ex viro lepore, ob terrorem matris tempore graviditatis
ex lepore perceptum.)

Fabric. Hildan. Observ. chirurg. Cent. III. obs. 8. (Epil. a ter-
rore, quem mater ex aspectu epileptici perceperat.)

Miscell. Nat. Curios. Dec. I. Ann. III. obs. 160.

Reiniger l. c.

Tiffot l. c.

SECT. III.

Capitis vitia.

A) *Commotiones capitis.*

Acta Nat. Curios. Dec. II. ann. I. obs. 92. (Epilepsia ex contu-
sione capitis.)

Alberti Jurispr. medic. P. I. p. 411. (a concussionem temporum.)

E. N. C. Dec. I. ann. II. obs. 259.

— — — — VI et VII. obs. 107. (a lapsu.)

Greding l. c. Th. II. p. 56.

Hoechstaeffer Observat. Dec. II. cas. 5. (a lapsu.)

Hornung Cist. med. p. 290. (a lapsu.)

Meyer Abrahamson, in Meckel Archiv d. pract. Arzn. B. III.
St. I. n. 2.

Miscell. Nat. Cur. Dec. I. ann. IV. obs. 35. (Epilepsia infantis,
cujus caput a nutrice contra incunabulas graviter concussum erat.)

Ortlob in E. N. C. Dec. II. ann. IV. V. obs. 198. (Epilepsia a lapsu
infantis, hinc perpetua infantia, imbecillitas, dein hydrocephalus,
cum tamen annum tricesimum septimum adtigisset.)

Pouteau Melanges de Chirurg. Lyon 1760. 8. p. 85. (ab ictu in
cranium.)

Schell-

Schellhammer (G. C.) in Act. N. C. Dec. II. ann. VI. obs. 114.
(ab ictu in synciput post octennium orta.)

Schenk (Joh.) Lib. I. obs. 202 et 213. (ab ictu in os temporis.)

Schurig. Chylologia, p. 205.

B) *Cranii vitia et laesiones.*

Act. Nat. Cur. Cent. VII. p. 299. (a fissura ossis frontis.)

— — — Dec. I. ann. 4. 5. obs. 35. (ab incurvatione diplois
internae.)

Anderfon, vid. Auserl. Abhandl. f. pr. Aerzt. B. XIII. p. 712. (cra-
nium dura matre concretum.)

Baldinger D. de epilepsia ex tumore durae matris scirrhus et carie
cranii. Jenae 1771. recus. in Waiz. Auszüge. B. VI. no. 7.

Ballonii (Guil.) paradigmata et historiae morborum ob raritatem
observatione dignissimae, Paris. 1648. 4. p. 45. (Calva depressa,
inde nata epilepsia, dein factum, effracto cranio, ut elevaretur,
quod depressum erat.)

Bartholini Anatom. reformat. Lib. IV. cap. 5. (Ep. a prava futu-
rarum dispositione.)

Berengarii (Jac.) Tr. de fracturis calvariae. Bononiae 1518. 4.
p. 71. (a vulnere cranii.)

Binninger. observat. medicinal. Cent. IV. obs. 64. (a vulnere cranii.)

Blegny Zodiac. gallic. Ann. 1679. Febr. obs. 7. (plura exempla
habet.)

Bonnet. Sepulchr. anatom. L. I. Sect. XII. obs. 4. (singular. cranii
conformatio.)

— — — — app. (Suturarum prava dispositio.)

Boretii (Matth. Ern.) resp. J. G. Arnold D. de epilepsia ex de-
presso cranio. Regiomont. 1724.

§. 7. Ep. a plica nimis ligatae mitrae cranium premente in in-
fante decem hebdomadum.

§. 19. Ep. a depressione cranii ab ictu praeceptoris incauto.

Clossy Observations taken of morbid bodies. Sect. I. obs. 9. p. 17.
(Ep. a tumore in ossè frontis ab ictu.)

Cöler, vid. Schmuckers vermisch. Schrift. Th. I. p. 259. (a vul-
nere cranii.)

Didier

- Didier Patholog. p. 316. (a globulo sclopetario intra ossa cranii haerente et, supino jacente homine, paroxysmum epilepticum ex pressione cerebri producente.)
- Duretus, vid. H. Boerhav. prael. de morb. nerv. p. 118. (Ep. a casu et inde oborta depressione cranii.)
- Fernel. de abdit. rer. caus. L. I. cap. III. (a vulnere cum fractura cranii.)
- Gabelchover Observ. Cent. IV. p. 117. (a vulnere cranii.)
- Greding (J. E.) sammtl. Schrift. herausg. v. Dr. C. W. Greding. Greiz. 1790. Th. I. p. 290. (a tumore cranii inter futuram sagittalem et coronalem nucis juglandis magnitudine a casu in juventute perpeffa.)
- Hofmann (J. M.) in E. N. C. Cent. VIII. obs. 29. (E. funesta a fissura ossis frontis a lapsu oborta.)
- Leveling (Henr. Palm.) D. de cranio militis quondam venerei, postea epileptici, tandem apoplectici defuncti. Ingolstadt. 1774. 4. c. tab. aeneis.
- Lemonnier in Journal de Medec. T. LIX. Paris. 1783. p. 421. (Cranium dura matre cohaerens.)
- Locher. (Max.) Observ. pract. p. 81. (a topico syphilitico cranii.)
- Loehrl de morbis ossium in genere, p. 22. (exostosis cranii.)
- Mekel Recherches sur les causes de folie. obs. 14. (a lamina ossis duram matrem irritante.)
- Morgagni, v. Lieutaud historia anat. med. ed. Schlegel, T. II. Longosal. 1787. 8. p. 321. (In epileptico post capitis contusionem foramen paulo minus, ut apicem digiti admitteret, dura matre occlusum, sub quo occurrit fovea magni ovi capax.)
- Pew (Rich.) Skizzen a. d. Heilkunde; a. d. Engl. von D. C. F. Michaelis. Leipzig 1787. 8. p. 2. sq. (Multa profert de inaequalitate ossium cranii et inde destructa harmonia proportionali inter cranium et cerebrum, nec non de exostosis cranii.)
- Pozzis (Ant. de) in E. N. C. Dec. I. Ann. IV. V. obs. 34. (a lamina ossis sinuum falciformem premente.)
- Quarin (Jof.) animadv. practic. in divers. morb. chron. Viennae 1786.

- Cap. II. p. 19. Ep. ab exostosi e lue venerea neglecta.
 — — p. 22. Ep. a topho cranii ex eadem causa.
 Rhodii Observat. Cent. I. obs. 55. (a tumore cranii.)
 Stalpart v. d. Wiel Observat. Cent. I. obs. 38. (Ep. a deformitate cranii.)
 Vieirac in Verhandelingen uitgeg. d. d. Holland. Maatschapp. d. Weetensch. te Haarlem. B. XIV. Haarlem 1773. 8. p. 49. (a carie ossis occipitis.)
 Vieussens (Raim. de) Histoir. des malad. intern. à Toulouse 1774. (E. a festuca cranii cerebro impacta.)
 Wurm in Schmucker verm. Schrift. T. I. p. 252. (a vulnere cranii.)
 Zechius, v. Bonet. Sepulchr. anat. L. I. S. XII. obs. 3. (a vulnere et depressione cranii.)

C) *Cerebri et cerebelli vitia et laesiones.*

a) *Structurae et massae.*

- Baader (Joseph.) Observat. medic. incisionibus cadaverum anatomicis illustratae. Friburg. 1762. 8. p. 107. (Cerebri substantia tam corticalis quam medullaris durior et scirrhusa.)
 Baumer (J. W.), rsp. G. J. Pfeffer D. de convulsionibus clonicis. Gieslae 1773. 4. p. 13 et 15. (Cerebrum duriusculum.)
 Glandorp. Spec. Chirurg. obs. 6. (Cerebrum sphacelatum.)
 Greding l. c. p. 306. (Exempla cerebri foetidissimi.)
 — — — p. 309. (Exempla mollitiei cerebri nimiae.)
 Guarinoni, v. Lieutaud l. c. p. 355. obs. 153. (In cadavere veneri simul epileptici pars sinistra cerebri fere tota corrupta et gangraenosa.)
 Kortum de vitio scrophuloso etc. T. I. Lemgov. 1789. p. 76. (Induratio cerebri a materia scrophulosa cerebrum occupante indeque epilepsia.)
 Marchettis (Petr. de) observat. chirurg. Patav. 1664. 4. p. 59. (Mollities nimia massae.)
 Morgagni de sed. et caus. morb. Epist. IX. §. 16. (Hemisphaerii sinistri pars anterior mollissima gelatinosa collapsa.)
 — — §. 18. Mollities thalami nervorum opticorum,

Mor-

Morgagni de sed. etc. §. 25. Cerebri pars anterior cartilaginea.

— — — §. 26. Substantia corticalis plane indurata passim scirrhusa, passim cartilaginea.

Salmuth (Phil.) Observat. med. Cent. III. posthum. Brunsvic. 1648.
4. Cent. III. obs. 22. (Cerebrum sphaelatum.)

Schmidt (Ern. Gottl.) observat. chirurg. obs. 3. (Hemisphaerium dextrum plane liquefactum.)

Sponius (Jac.) in Act. Erud. Lips. Ann. 1689. (Cerebrum sub-
durum.)

Tiffot l. c. p. 116. §. 46.

b) *Stagnationes et Effusiones.*

α) *Sanguineae.*

Bartholini Histor. anatom. Havn. 1654. §. Cent. II. obs. 92. (in
supremo cerebro prope cranium sanguis concretus.)

Drelincourt, in Bonet. Sepulchr. anat. T. I. p. 294. (Vasa fan-
guine turgida rupta.)

Dulac, v. Lieutaud l. c. T. II. p. 361. obs. 173. (a.) (Vasa ce-
rebri turgida.)

Johnstone in Medic. Observat. and Inquir. Vol. II. n. 6. p. 115.
(Vasa sanguine turgida. Guttulae sanguineae ex substantia ce-
rebri transscilla abunde stillantes.)

Marquissius in Zodiac. med. gall. Ann. 1682. (Sanguis in ventri-
culos cerebri effusus.)

Mekel Recherch. sur les causes de la folie, in Memoir. de Berl. 1760.
obs. 10.

Morgagni l. c. Epist. IX. §. 12. 14.

Richter Anfangsgr. der Wundarzn. Vol. II. §. 207. (varicosa va-
forum expansio et repletio.)

Rümmler (J. Udalr.), in Bonet. l. c. T. I. p. 274. (Effusiones fan-
guinis.)

Sponius (J.) in Act. Erud. Lips. Ann. 1682. et in Bonet. l. c.
T. I. p. 299. (in lobo cerebri dextro magna effusi sanguinis copia.)

Tiffot l. c. p. 122. squ.

Valsalva, vid. Lieutaud l. c. p. 381. obs. 236.

We-

Wepfer (J. J.) in E. N. C. Dec. III. Ann. I. obs. 135. (Vasa turgida sanguinis $\&$ j. effusa.)

β) Serosae. - Gelatinosae.

Bang (Fr.) Auswahl aus d. Tageb. d. Königl. Friedr. Krankenhaus. zu Copenhag. aus d. Lat. von Jugler. Th. I. Copenh. u. Leipz. 1790. 8. p. 129. 165.

Baumer (J. W.) Diff. cit. p. 15.

Bontii (Jac.) Observat. select. ex dissectione cadaverum et autopsia descriptae. Amstelodam. 1694. 8. (Materia viscida in ventriculis.)

Borell. (Petr.) Observat. Cent. I. obs. 78.

Drelincourt, v. Bonet l. c. T. I. p. 296. (Ventriculi flava spissaque gelatina repleti super totum cerebrum effusa.)

Lieutaud histor. anatom. T. II.

p. 354. obs. 150. Morgagni. (in dextra cerebri parte fovea sero subfusco et sanguine repleta.)

p. 430. obs. 414. Mangold. (Seri tanta quantitas, ut omnes cerebri recessus intus et extus subiisset.)

p. 443. obs. 469. Morgagni. (Sub tenui meninge materia gelatinosa cum bullulis aëreis. Pauca serosa colluvies in ventriculis.)

p. 444. obs. 470. a. Baader. (Lympha mucosa, gelatinosa et copiosissima inter cerebri corticem et meninges stagnans. Ventriculi sero pleni.)

p. 448. obs. 480. a. Baader. (In hemisphaerio sinistro et ipsa substantia corticali et medullari copiosa lympa crassa et mucosa.)

Piso (Carol.) de morb. a colluv. seros. Sect. II. cap. 7.

Poupart. in Memoir. d. l'Acad. d. Sc. à Paris 1705. p. 62. (Gelatina dura firmiter durae matri adhaerens.)

Rhodii Observ. med. Cent. I. obs. 49. (Ventriculi cerebri et cavitates medullae spinalis sero repleti.)

Riverii (Lazar.) Observat. med. et curat. insign. Paris. 1646. 4. Cent. I. obs. 37.

Schenk. (Joann.) observat. med. L. I. obs. 222.

Thoneri (Augustin.) de admirand. convulsivis motibus Libr. IV.

D

Ulm.

Ulm. 1651. 4. L. II. obs. 2. p. 92. (Epilepsia non a sola vaporosa materia, sed humorosa copiose in cavitatibus cerebri inventa proveniens.)

γ) *Aquosae, e. g. Hydrocephalus.*

Bartholin. (Thom.) Histor. anat. Cent. III. hist. 80. (Aquae in cerebro.)

Bonet. Sepulchr. anatom. T. I. obs. 7. 8. 10. 12. 13. 15. 17.

Coiter. (Volcher.) Observ. anat. chirurg. Norimb. 1572. fol. p. 57.

Forest. (Petr.) de capit. et ventr. morbis L. III. Leidae 1590. 8. (Epil. a hydrocephalo.)

Gavassetti, in J. B. Morgagni l. c. Ep. IX. §. 3. p. 68.

Grëding l. c. p. 294. (∇ inter duram et piam.)

p. 304. (inter piam et subst. corticalem.)

p. 310. (in ventriculis lateralibus.)

p. 316. (in ventriculo tertio.)

p. 326. (in ventriculo quarto.)

Harder. (Jo. Jac.) Apiarium. Basil. 1687. 4. (Ventriculi aqua repleti.)

Lieutaud l. c. p. 359. obs. 167. Inter substantiam corticalem et piam matrem et in ventriculis lateralibus maxima aquae copia. — Acta Londinensia.

p. 361. obs. 172. Ventriculus sinister aqua plenus. — Miscell. curiosa.

p. 375. obs. 217. ∇ in ventriculis. — Journ. de Medec.

p. 448. obs. 481. (a.) — — — Fournier.

Riverii Observ. Cent. I. obs. 37. v. Ejus opera med. Genev. 1737. fol. p. 473.

Roche (de la), in Edinburg. med. Comment. B. I. p. 229.

Rucker, in Commenc. litt. Nor. 1739. p. 337. (Ep. a hydrocephalo.)

Sauvages Nosol. method. ed. Daniel. T. III. p. 106.

Vogel (S. G.), in Hufeland Journ. der pract. Arzneik. B. I. St. 2. p. 275.

Walter, in Leske auserl. Abhandl. B. II. p. 7.

δ) *Purulentae. Abscessus.*

Bauhin, v. Bonet l. c. p. 371. (Abscessus in dextro cerebri lobo.)
Bau.

- Baumer. in Diss. cit. p. 14.
 Borrich. (Ol.) vid. Bonet l. c. p. 293. (Abscessus in dextro lobo cerebri ovum gallinaceum magnitudine superans.)
 Cloffy Observations taken dissection of morbid bodies. Sect. I. obs. 9. p. 17. (Parva ulcera in superficie interna durae matris.)
 Fernel. Pathol. Lib. V. cap. 3. (Abscessus in cerebro.)
 Pouppe Desportes Histoire des maladies de St. Domingue. à Paris 1770. T. II. p. 209. (Glandula pituitaria magnitudinis ovi fungosa ad tertiam partem repleta involucro obvoluta.)
 Rümler, v. Bonet l. c. p. 274. (Dura mater ulceribus erosa.)
 Salmuth Observat. Cent. I. obs. 17. (Pus in meningibus.)

* * *

- Baader (Jes.) Observat. medic. 1762. p. 107. (Abscessus ad ovi gallinacei magnitudinem accedens in subst. medullari.)
 Comment. Lips. Vol. XII. P. IV. p. 615.
 — — — Vol. XVI. P. IV. p. 714.
 Lieutaud l. c. p. 346. obs. 118. (Abscessus magnitudine ovi columbini, cujus pus album et foetidum viam sibi cuderat versus medullam oblongatam.)
 Massa (Nicol.) Epist. medic. Venet. 1550. 4. Lib. II. Ep. 2. (retenta sanies in vulnere capitis. Cannula immissa indeque saniei exitu restituta, epilepsia est sublata.)
 Meckel Recherch. sur les causes de la folie, in Memoir. de Berl. T. XX. p. 85.
 Morgagni l. c. Ep. IX. art. 20. 21.
 Mutzell Wahrnehm. Th. II. n. 21.
 Perotti, v. Comm. Lips. Vol. III. p. 651.
 Röderer Pr. de cerebri scirrho. Gotting. 1762.
 Severini nov. observat. p. 116.
 Vieirac in Verhandelingen van Harlem, B. XIV. p. 49.

D) *Concrementa.*

α) *Scirrhus.*

- Baldinger (E. G.) Diss. de epilepsia ex tumore durae matris scirrhus et carie cranii. Jenae 1771.

Fantoni (Joa.) opusc. med. Genev. 1738. 4. p. 37. (Scirrhus in corpore calloso.)

Lieutaud l. c.

p. 361. obs. 172. (in plexu choroideo.) — Misc. curios.

— — obs. 173. (a) idem. — Dulac.

p. 376. obs. 221. (Corpus glandulosum fabae magnitudinem aequans in substantia corporis striati dextri.) — Act. Parisin.

Moor (Barth. de) Cogitat. medic. L. III. Amstelod. 1695. 8.

Plater. (Felic.) observ. med. Basil. 1680. 8. Lib. I. pag. 103. (In parte anteriori cerebri scirrhus magnitudine ovum gallinaceum superans.)

Roederer Pr. de cerebri scirrho, Gotting. 1762.

Sorbait (Paul. de) universa medicina theoretica et practica. Norimberg. 1672. fol. (in plexu choroideo.)

β) *Carnosa. Adiposa.*

Borelli Observat. Cent. II. obs. 78. (Materia adiposa in ventriculis.)

Greding l. c. p. 298. (Corpora mollia alba semiglobularia fungosa in utroque latere regionis frontalis piaae meningi oblidentia.)

Güntz (F. G.) de cerebro, Prolus. II.

Langii opera omn. T. III. p. 62. (adiposa in ventriculis cerebri.)

Lieutaud l. c. p. 375. obs. 217. (Septem sarcomata circa sinum longitudinalem sita et pisi molem aequantia.) — Journ. de Medec.

— — — p. 377. obs. 224. (Varia sarcomata involucris cerebri annata.) — Miscell. curios.

Rhodii Observ. Cent. I. obs. 55. v. Bonet l. c. p. 283. (Sarcoma in ductu venoso cerebri.)

γ) *Polyposa.*

Blasius (Gerhard.), v. Bonet l. c. Lib. I. S. XII. addit. obs. 24. p. 283. (In omnibus fere cerebri venis.)

Greding l. c. p. 298. (in sinu falciformi.)

Schroek, in Comm. litter. Noric. 1750. p. 165. (in ventriculis cerebri, maxime in ventriculo anter. sinistro.)

Wagner (Frid. Aug.), in Epistol. gratulat. de morborum insanabilium

lium curatione. Lipsiae 1792. 4. p. 8. (Polypus in sinu longitudinali longitudine trium pollicum crassitie calamus scriptorium superante.)

δ) *Lapidea. Arenosa.*

Bonnet. Sepulch. anat. L. I. Sect. XII. p. 276. (inter duram et piam matrem in regione occipitali.)

Brieu, in Journ. de Medec. T. XIV. p. 319. Avril 1761. (Septem in dura matre.)

Greding l. c. p. 320.

Güntz (F. G.) Pr. de lapillis in glandula pineali inventis. Lips. 1753. 4.

Lieutaud l. c. p. 355. obs. 153. Guarinonius.

ε) *Ossea.*

Fasch (A. H.), rsp. Boesio D. de epilepsia. Jenae 1686. 4. p. 15.

Greding l. c. p. 295. (Concrementum osseum tentorio adhaerens.)

— — — p. 301. (Ossificationes in corporibus fungosis sub β supra dictis.)

Hunauld, in Memoir. de l'Acad. d. Sc. à Paris 1734. (prope finum longitudinalem.)

Lieutaud l. c. p. 322. obs. 41. — Miscell. curios.

— — — p. 324. obs. 50. — Lieutaud adversar.

Motte (de la) Traité complet de Chirurg. T. II. p. 397. obs. 171. (pone cerebri falcem.)

Pozzis (Ant. de), in Miscell. natur. curios. Ann. IV. obs. 34. et in Bonet. Medicina septentr. collatit. L. I. p. 113. (in media cerebri parte.)

ζ) *Hydatides.*

Greding l. c. p. 315. (in plexu choroideo.)

Johnstone, in Med. obs. and Inquir. T. II. n. 6. (ibidem.)

Lieutaud l. c. p. 359. obs. 167. — Phil. Transact.

— — — p. 361. obs. 172. — Misc. nat. cur. (ibid.)

Lysons pract. Essays etc. Bath. 1772. 8. p. 160. (ibid.)

Moritz (F. C.) D. de convulsionum therapia. Francof. ad Viadr. 1792. p. 34. (Hydatis in hemisphaerio sinistro cerebri, ex qua circiter feri uncia effluebat.)

Rhoe-

Rhoetus in Philos. Transact. N. 299 et 315. Obs. II. (in plexu choroidæo.)

Valsalva, v. Morgagni l. c. p. 68. (ibidem.)

E) *Corpora aliena in cerebro.*

Bonnet. Sepulchr. anat. L. I. Sect. XII. obs. 25. (gladioli frustulum.)

Eraſti Diſput. IV. p. 58. (Mercurius per aures in cerebrum illapſus.)

APPEND. I.

Commotio columnæ vertebralis et medullæ spinalis læſiones.

Liceat mihi addere huic ſectioni illos epileptiæ caſus, qui e læſionibus et commotionibus medullam ſpinalem infeſtantibus ortum forſan trahunt. Et in epilepticorum poſt mortem ſectione majori quam hactenus induſtria columnam vertebralem et medullam in ea contentam ſpinalem eſſe explorandam omnino mihi videtur neceſſarium. Forſan aliquando varia quædam hujus morbi ſpeciei ſymptomatiæ cauſa, quæ nunc nobis in inferioribus extremitatibus latere videtur, in illa reperiatur.

Cfr. J. P. Frank orat. acad. de vertebralis columnæ in morbis dignitate. — in Ej. Delect. opuſcul. medicor. Vol. XI. Ticin. 1792.

Varias epileptiæ a lapſu aut ictu obſervationes, jam ſupra ſub A. et B. commemoratas, forſan et hic collocandas eſſe puto. Specialia exempla enarrant:

Alberti Jurisprud. medic. app. p. 166. (Epileptia a plagis in dorſo.)

Bonnet. Sepulchr. anat. T. I. obs. 25. (a carie vertebrarum medullam ſpinalem denudatam vellicante.)

Ettmüller Oper. omn. T. III. Francof. 1708. fol. (a verberibus.)

Manardi (Joann.) Epistol. Lib. III. Epist. 6. (a caſu in nates.)

APPEND. II.

Læſiones fovearum externarum capitis.

Iſtas quoque huic ſectioni addendas eſſe cenſeo, quum facile opinari liceat, illas etiam aut commotione aut irritatione vicini cerebri produxiſſe epilepſiam.

Boyle uſefulneſs of experim. Philoſophy. P. II. p. 248.

Fabricii Hildani obſervat. Cent. I. obs. 4. (a globulo vitreo auri immiſſo orta epilepſia.)

Hor-

Hornung Cista medica. p. 394. (ab aurium purulentia.)
 Muys Podalirius redivivus. p. 103. (a globulo altius auri inhaerente.)
 Salmuth Observat. Cap. I. obs. 74. (ex oculi percussione.)

SECT. IV.

Animi Pathemata.

Cfr. Falconer (Will.) Abhandl. von d. Einflusse d. Leidenschaften auf die Krankh. des Körpers. a. d. Engl. von Dr. C. F. Michaelis. Leipzig 1789. 8. Kapit. 15. Epilepsie. p. 87.
 Geseenius (W.) mediz. moral. Pathematologie etc. Erfurt 1786. 8.
 de Marées D. de animi perturbationum in corpus humanum potentia. Gotting. 1775. 4.
 Monjé (J. J.) D. de animi pathematibus eorumque effectibus. L. B. 1785. 4.
 Zückert von d. Leidenschaften.

a) *Tristitia.*

Alberti Jurispr. med. Suppl. p. 407. §. 30.
 Amati Lusitan. Observat. Cent. II. Curat. 9.
 Auszüge aus dem Tagebuche eines ausüb. Arztes. Berlin 1791. 8.
 n. 7. Epilepsia a moerore quartanam simulans et dein in febrim quartanam transiens.
 Grimberg (Nicol.) Observat. medic. Havniae 1689. 12. p. 55.
 Hofmann medic. ration. T. IV. P. III. p. 39.
 Hornung Cista medica. Norimb. 1625. 4. p. 415.
 Nicolai Patholog. Th. I. p. 276.
 Riedlin. Lin. med. obs. 13. p. 939. (paroxysmum accelerans.)
 Schneider de Catarrho, T. V. p. 252.

b) *Gaudium.*

Boerhave (H.) de morb. nervor. p. 804.
 de Marées Diff. cit. §. 15.
 Marx (M. J.) bestätigte Kräfte der Eicheln. Hannov. 1781. p. 28.
 Swieten (G. van) Comm. in Boerh. aphor. T. III. p. 414.

c) *Amor, praecipue non satiatus, prohibitus.*

Aaskow in Collect. Societ. med. Havn. Vol. II. p. 16.

Bor-

Borrich (Ol.), in Th. Bartholin. Act. Havn. Vol. III. obs. 39.
(a repudiato amore paralysis, epilepsia et fatua oblivio.)

Cornarii (Diomed.) Consil. med. Lips. 1595. 4. Lib. I. cons. 3.

Dolaeus (J.) in E. N. C. Dec. III. Ann. II. obs. 75.

Donat. (Marcell.) de histor. med. mirab. Lib. II. cap. 4.

Heucher (J. Henr.) opuscul. sist. morbos ex nimio veneris usu.
Viteberg. 1700. 4. (Observavit virginem, quae ob conspectum
juvenis formosi epileptica humum decubuit.)

Rolfink (Gu.) Consultat. et consil. Jenae 1669. 4.

Schrenk (Jo.) observ. rarior. Lib. I. obs. 4.

Tiffot l. c. p. 76 et 307.

d) *Timor.*

Boerhave de morb. nervor. p. 411 et 803.

Burmester (J. J.) D. Consultatio medica super morbo spastico etc.
Gottingae 1791.

E. N. C. Dec. II. Ann. II. obs. 149.

Heers (Henr. ab) Observ. med. Lugd. Bat. 1685. 12. p. 209.

Lange (J. C.) Diss. de morb. caduco. Lips. 1706.

Perioux observat. med. p. 85.

Pew mediz. Skizzen, p. 30. sq.

Schenk a Grafenberg observat. med. p. 112.

Tiffot l. c. p. 45.

e) *Terror.*

Ackermann, in vers. german. Libr. cit. Tiffot. not. 41.

Act. Erud. Lips. 1694. Jan. p. 2.

Albrecht (J. P.), in E. N. C. Ann. III. obs. 95. (ab insomnio ter-
rifico.)

Act. N. C. Vol. I. obs. 25. p. 67.

— — Cent. I. p. 189. app.

— — Dec. I. Ann. VI. obs. 63.

— — Dec. II. Ann. IV. obs. 17.

Appel (J. J.) Discursus de epilepsia. Altenb. 1713. 8. p. 10.

Bagliv. prax. medic. Lib. I. Cap. XIV. §. 2.

Bartholin. histor. anat. Cent. III. histor. 41.

Bau-

- Baumer Diss. cit. p. 17.
 Beaumes l. c. p. 90. (ab exploso tormento.)
 Bierling (C. Th.) adversar. curios. Jenae 1679. 4. p. 32.
 — — — Medicus theor. pract. ib. eod. p. 577.
 Binninger observat. med. Cent. I. obs. 1.
 Boerhave de morb. nervor. p. 801. et p. 833.
 Breslau. Samml. 1720. II. p. 163. 447.
 — — — — 1724. August. p. 218.
 — — — — 1725. May. p. 532. 533.
 Büchner, in Misc. Nat. Cur. 1729. p. 275.
 Camerar. Syllog. memorab. medic. Cent. XVI. partic. 26. 33.
 Crell. D. de Zinco. Helmstad. 1780.
 E. N. C. Dec. I. Ann. VI. VII. obs. 32.
 — — Dec. II. Ann. III. obs. 101. 177.
 — — — Ann. IV. Append. p. 209.
 — — — Ann. VI. Append. p. 71.
 — — — Ann. X. obs. 20.
 — — Dec. III. Ann. II. obs. 93.
 — — — Ann. V. VI. obs. 28. 263.
 — — — Ann. IX. X. obs. 56. 57. 151.
 — — Cent. I. Append. p. 189. sequ.
 Fischer (J. A.) D. de convulsionibus epilepticis habitualibus ex terrore. Erford. 1727.
 Fothergill medic. Observat. and Inquir. Vol. VI. p. 79.
 Gabelchover Cent. IV. p. 42.
 Gesners Beobachtung. Th. I. n. 19.
 Greding l. c. Th. I. p. 14, 15, 16, 17, 51, 61, 63, 67, 76, 77, 81, 84, 87, 146, 186.
 Gruelmann D. f. observat. de usu Cicutae. Gotting. 1788. p. 30.
 Haen (de) Rat. medend. P. V. p. 121.
 Hagendorn Observat. med. Cent. III. Francof. 1698. 8. Cent. I. obs. 13.
 Heers (Henr. ab) observ. med. p. 274.
 Hemmann (J. A.) chirurg. Aufsätze. Berlin 1778. (ad sedandam
 E narium

marium haemorrhagiam aegrotae aqua frigida transfundebatur, indeque epilepsia.)

Hermes, in Versuch einer chirurg. Privatgesellschaft. v. Tode medic. chir. Bbl. Th. II. St. II. p. 192.

Histoire de l'Acad. des Scienc. à Paris 1753. p. 77.

Hofmann Medic. ration. system. T. IV. P. III. p. 25. 27.

Hurlebusch (G. L.) Diss. Zincum medicum inquirens. Helmstädt. 1776. (Observat. Cl. Beireis.)

Jacquinnelle, in Journ. de Med. T. LXXXIV. Aout, Paris 1790.

Kornzweig D. de epilepsia a terrore orta. Gieslae 1713.

Langii opp. omn. T. III. p. 35. 62.

Lentilius (Rosin.) Miscell. med. pract. P. II. Ulm. 1693. 4. p. 309.

Linnée, resp. P. Zetzel, D. f. confectaria electrico-medica. Upsal. 1754.

Loof (J. A.) Historia epilepsiae foliis Aurantium persanatae. Gröning. 1771.

Marx (J. M.) Observat. quaed. medic. Berol. 1772. 8. p. 33.

Miscell. Nat. Cur. Ann. VI. obs. 24. (ab explosio scelopeto.)

— — — — — obs. 32. (a spectro.)

Morgagni de sed. et caus. morb. Lib. I. Epist. IX. artic. 6.

Nicolai Patholog. T. I. p. 273.

Paullini (C. F.) Observ. med. phys. Lips. 1706. 8. Cent. IV. obs. 74.

Peiroux. observations medicinales, p. 85. (post minimum terrorem rediens epilepsia.)

Pew med. Skizzen, p. 30. 39.

Pfündel, in Hufeland Journal der prakt. Arzn. B. II. St. II. p. 272. (a terrore tempore menstruationis.)

Reil. resp. J. A. Neumann, D. de crisi. genuinis morbis nervosis peculiaribus, Halae 1792.

Reinold, in Samml. auserl. Abh. für prakt. Ärzte, Th. XIII. St. 4. p. 677. 680.

Riedlin nov. Observ. p. 939. (paroxysmum accelerans.)

Salmuth Observ. Cent. III. obs. 41.

Schaarschmidt. Berlin. Nachricht. Th. I. p. 134.

Schenk observ. med. Lib. I. obs. 215. (p. 1574. 1575.)

Seger

- Seger (Georg.), in E. N. C. Ann. III. obs. 95. (ab insomnio terrifico.)
 Selle, neue Beiträge, Th. I. p. 39. sequ.
 Starke, Nachr. v. klinisch. Institute zu Jena, p. 178.
 Stein (G. A.) D. de faba Sti. Ignatii. Erlang. 1793. 8.
 Struve (C. A.), praef. C. F. Ludwig, D. de vi terroris in corpus
 humanum. Lipsiae 1790.
 v. Swieten Comment. T. II. p. 183. T. III. p. 415.
 Thilenius medic. chir. Bemerkungen. Frankf. am M. 1789. p. 129.
 Tissot l. c. p. 45. 46.
 Untzeri *ισογονοσολογία*. P. I. cap. 16. P. II. cap. 5.
 Weinrich (Mart.) de monstribus. Wratislaviae 1595. 8. cap. 15.
 Wepfer Observ. med. pract. de affectib. capitis. Scaphus. 1727. 4.
 p. 626.
 Wilhelm (F. H. M.) observat. electrico-medic. Wirceburg. 1774.
 8. p. 148.
 Zacuti Lusitani prax. admirand. Lib. I. obs. 34.
 Zimmermann, von d. Erfahrung. Th. II. cap. 11. p. 444.
 f) *Ira*.
 Crell D. f. Zincum medicum. Helmstad. 1780.
 E. N. C. Dec. III. ann. 11. obs. 6.
 Gabelchover Cent. IV. obs. 59.
 Greding l. c. p. 54, 57, 70.
 Hoffmann med. rat. syst. T. IV. P. III. p. 39.
 Morgagni de sed. et caus. morb. Ep. IX. art. 5.
 Nicolai Patholog. Th. I. p. 275, 276.
 Riedlein Lin. med. Ann. VI. April. obs. 27. p. 455. (ab ira re-
 fuscitata.)
 Sauvages nosol. meth. ed. Daniel. T. III. p. 117. (in puero ab ira
 ob cibum denegatum.)
 Schenk. obs. med. p. 157.
 Schneider de catarrho. Viteberg. 1660. 4. T. V. p. 282.
 Schurig Sialogia. Lips. 1729. 4. p. 377.
 Tissot l. c. p. 51, 151.
 Wileri de ira morbo ejusdemque curatione Liber. Basil. 1577. recens.
 in Oper. p. 771.

g) *Sympathia.*

Liceat mihi, huic subungere titulo ista epilepsiae exempla (vel sic dictam communicativam epilepsiam), quae ex adpectu epileptici vel aliarum rerum mentem ingrato modo afficientium orta erant. Illa quidem, quae ex subitaneo horum horribilium symptomatum adpectu oriuntur, majori jure epilepsiae ex terrore fuissent addenda; minime vero ea, quae ex diuturno fere et consueto epilepticorum adpectu ortum trahere videntur. In hoc nempe casu saepissime accidit, quod aegrotus nullius ex adpectu percepti horroris sibi sit conscius. Et quum e plurimis a me perlectis observationibus non satis accurata discrimina evolvere possim, rectius judicavi, varias et omnes istas observationes sub hoc, ut mihi videtur, magis quadrante conjungere titulo.

Aaskow, in Collect. Soc. med. Havn. Vol. II. p. 14 — 22.

Act. Medicor. Berolin. ed. J. D. Gohllo. T. III. Ann. I. Berolin. 1731. 8.

Act. Nat. Cur. Vol. II. obs. 133.

— — — Vol. III. obs. 58.

Buchhave, in Act. Soc. med. Havn. T. I. p. 218.

Commerc. litt. nor. 1735. p. 266.

Detharding, rsp. G. H. Stieler, D. de chorea S. Viti. Rostoch. 1760. 4. p. 29. (Ministra virginis cujusdam nobilis, chorea S. Viti laborantis, quotidiano hujus morbi adpectu commota in epilepsiam incidit.)

Duncan medical cases. Edinb. 1778.

E. N. C. Dec. I. Ann. IV et V. obs. 43.

Gkachi (i. e. Manitii) Medicus hujus saeculi. Dresdae 1693. 8. p. 247. (Ancilla epileptica ab adpectu cadaveris demortui domini.)

Ledel, in E. N. C. Dec. II. ann. III. obs. 101.

Lettfom, in Memoirs of the med. Societ. of London. Vol. III. Lond. 1792. 8.

Marcellus Donatus l. c. Lib. II. cap. 4. p. 146.

Meza Compend. med. pract. Fasc. V. Havniae 1781. p. 15.

Miscell. Acad. Nat. Cur. Ann. IV. p. 74.

Salmuth l. c. Cent. II. obs. 73. (ex conspectu phlebotomiae.)

h) Ni-

b) *Nimia meditatio.*

- Beunie, in Verhandelingen van Vlietsingen. B. VI.
 Galen. de loc. affect. L. V. ed. Chart. T. VII. p. 492.
 Hofmann med. rat. syst. Cap. de Epileps. §. 19.
 Journ. de Medec. T. XII.
 Langii oper. omn. Vol. III. p. 62.
 Pechlin. obs. phys. med. L. III. Hamburg. 1691. 4.
 Plater observat. Lib. III. Basil. 1641. 8. Lib. I. p. 22.
 Platner ars medend. §. 647.
 Swieten l. c. T. III. p. 413.
 Tiffot l. c. p. 51. (epilepsia recurrens a meditatione breviter post
 prandium instituta.)
 — — v. d. Krankh. d. Gelehrt. in Sämmtl. Schrift. Th. II. p. 41.

SECT. V.

Nervorum affectiones mechanicae.

1. *Nervorum Vulnera.*

- Appel (J. J.) Discurs. de epilepsia. Altenb. 1713. p. 11, 12.
 Baumer et G. P. Pfeffer Diss. cit. p. 9, 19.
 Borrich. vid. Bonet Sepulchr. anat. T. I. p. 294.
 Consbruch D. observ. fascic. Stuttgart. 1777.
 Fabricii Hildani obs. chir. Cent. IV. obs. 22.
 Forest. l. c. L. X. obs. 99. (punctura nervi a venaesect. in brachio.)
 Kaempf von d. Krankh. des Unterleib. p. 293. (ab irritato nervo
 in pollice pedis.)
 Maerklin, in E. N. C. Dec. I. Ann. VI et VII. obs. 77.
 Marchetti observat. p. 81.
 Maret, in Nouv. Memoir. de Dijon. 1784. Prem. Semestr.
 Rahn medic. Briefw. Th. I. p. 570.
 Salmuth l. c. Cent. I. obs. 35. Cent. III. obs. 74.

2. *Pressiones. Tensiones.*

a) *Tumores aut Concrementa.*

- Bonet. Sepulchr. anat. T. I. p. 291. squ. (Tumor in regione in-
 guinali.)

Cap.

Cappel D. de tumore nervo vago inhaerente. Helmstädt. 1781.

Haen rat. med. P. V. ed. Ilda. Vienn. 1763. p. 117. (durus nodus nervo diaphragmatico in medio ejus decursu circumcretus aliusque similis priori eo loco, ubi nervus in diaphragma abiturus erat.)

Loeffler, Beiträge zur Wundarzn. B. I. (Concrement. durum in genu.)

Plater observat. Lib. I. p. 24. (Tumor in manu.)

Rhases Continens L. XV. cap. 1. fol. 307. b. (iam concrementa nervis obsidentia epilepsiam producentia observavit.)

Rhodiï l. c. Cent. I. obs. 58. (Tumor in genu.)

Sarcone Krankh. v. Neapel. B. III. p. 94.

Short, in Edinb. med. Veri. B. IV. p. 543. sq. (Concrem. cartilagineum pisiforme in crure.)

Schmucker chirurg. Wahrn. Th. II. p. 183. (a hydrocele epilepsia.)

Swieten l. c. T. III. p. 419. (tumor in femore.)

Tritschler D. f. observat. Trigun. Tubing. 1787. (concrem. lapideum nervo crurali adnatum.)

b) *Artuum luxationes.*

Dictionnaire universel de Medecine, T. I. p. 564. (a luxatione pollicis pedis.)

c) *Calculus.*

Bartholin. (Thom.) Opusc. med. T. I. p. 59. (Calculi renales et vesicales.)

Beaumes, in Journ. de Medec. T. LVII. p. 320. (Cholelithi.)

— — — — — p. 504. (Signum hujusmodi epilepsiae esse dolorem in dextro latere epigastrii, nec non in brachio et genu ejusdem lateris.)

Brendel. (J. G.) Progr. de calculi natalibus. (renales.)

v. Ej. opusc. mathem. et medica, ed. Wrisberg. Gotting. 1769. 4. P. I. p. 59.

E. N. C. Dec. I. ann. II. obs. 8. (in matrona nephritica ab oleo therebint. dato.)

— — Dec. II. ann. X. obs. 20. (renales.)

Fabri.

Fabricii (Ph. C.) Progr. ad J. B. Hofmann. Dissert. Helmstad. 1756. p. 6.

v. Ej. Animadv. var. argument. Helmstad. 1783. no. 6. (Cholelithi.)
Helmont de lithiasi, Cap. 7. (renalis et urethralis.)

Hofmann (Fr.) med. rat. syst. Cap. de Epileps. obs. 3.

Jens., in Mercure Danois. Aout, 1758. p. 99. (Cholelithi.)

Motte (de la) Traité compl. d. Chir. T. II. p. 416, 419. (renales.)

Sauvages nosol. method. ed. Daniel. T. III. p. 100. (Epilepsia nephritica.)

Tiffot l. c. p. 72.

d) *Dentitio.*

Cfr. clarissimos de morbis infantum scriptores, e. g. Rosenstein,
Armstrong, Hufeland, etc.

E. N. C. Dec. I. ann. II. obs. 67.

— — Dec. II. ann. X. obs. 100.

Heister. Compend. med. pract. Cap. XVIII. §. 24.

Sauvages nosol. meth. ed. Daniel. T. III. p. 101. (eclampsia a dentitione.)

Selle medicin. clinic. p. 371.

e) *Funiculi spermatici ligatura in castrationis encheiresi.*

Bromfield (Will.) Observations. T. I. p. 166, 336. (Nervum separandum esse, priusquam arteria spermatica ligaretur.)

Dran (le) (meram arteriarum et non vas deferentis, et nervorum ligaturam suadet ex epilepsiae metu.)

Gooch (Benjam.) pract. Treatise on Wounds and other surgical subjects. Norwich. 1767. T. I. p. 429. (Arteriam solam esse ligandam.)

Guenel, in Journ. de Medec. T. L. p. 528. (funiculum non esse ligandum, sed merè digitis premendum.)

Marshall (F. G.) von d. Kastrazion. Saizburg 1791. 8. (Separationem funiculi spermatici usque ad annulum abdominalem necessariam esse ad avertendas convulsiones contendit.)

Pott (Percival), v. Wasserbruch. Kopenhag. 1770. 8. p. 77.

Saviard Recueil d'observations chirurgicales. à Paris 1784. (funiculum esse torquendum.)

Schmu-

Schmucker, chirurg. Wahrnehmung. Th. II. p. 207. (Nunquam ex hacce causa motus vidit epilepticos ideoque totum funiculum spermaticum subligare suadet.)

Theden (J. C.), Neue Bemerk. aus der Wundarzn. Berlin 1771. 8. p. 41, 52, 58. (Pluries ex hacce causa abortam per totam vitam continuantem observavit epilepsiam, ideoque a ligatura plane abhorret, haemorrhagias agarico sedare curans.)

White (C.) Cases in Surgery. London. 1770. p. 53.

f) *Partus difficilis.*

Alberti Jurispr. medic. P. I. p. 80. (ventilatur quaestio: an foeminae sub partus negotio in hunc morbum inclinent?)

A. N. C. Dec. II. Ann. II. obs. 32.

Bagliiv. prax. medic. p. 336.

Breslau. Geschicht. Versuch X. p. 607.

E. N. C. Dec. I. Ann. II. obs. 67, 317. Schol. p. 535.

— — — Ann. X. obs. 14.

— — Dec. III. Ann. VII. VIII. obs. 124.

Engelmann D. de motibus convulsivis et partu difficili. Altdorf. 1752.

Gehler (J. C.), rsp. J. G. Gutsch, D. de eclampsia parientium gravi morbo quidem nec adeo funesto. Sectio prior pathologica, Lipsiae 1776. 4. Sect. II. therapeutica, rsp. C. A. Gerischer. Lipsiae 1777. 4.

Fried (G. A.) Element. art. obstetr. L. II. cap. 11.

Hofmann (G. F.), Versuch einer Abhandl. über die Ursachen und Heilung der sogenannt. Gichter bei Schwangern, Gebährenden und Kindbetterinnen. Frankf. am M. 1795. 8.

Mauriceau obs. sur la Grossesse. à Paris 1728. T. II. obs. 552.

Motte (de la) Traité des Accouch. L. III. Cap. XII. p. 307.

Pereboom, in Nov. Act. Nat. Cur. T. III. p. 20.

Petri (G. H. Ph.) D. de convulsion. gravidarum, parturientium et puerperarum. Gotting. 1790. 4.

Püzos Traité des Accouch. à Paris 1759. p. 172.

Röderer, Anfangsgr. der Geburtshülfe, überf. von Henkenius, p. 402 — 406.

Sauvages nosol. meth. T. III. p. 99. ed. Daniel.

Schafonski D. de gravid. partur. et puerper. convulsionibus. Argentorat. 1763.

Schenk Observat. Lib. I. obs. 206.

Storch, von den Krankh. der Weiber. Gotha 1747. T. III. p. 126. et 240. T. V. p. 706.

Tissot. l. c. p. 84. 85.

Zacut. Lusitan. Prax. admir. Lib. I. obs. 26. 33.

Forſan variae hujusmodi epilepsiae observationes Sectioni, epilepsiam a congestione sanguinis ad caput continenti, essent annumerandae: sed cui hoc sat satis distinguere liceat? Nec minus fere omnes de epilepsia sic dicta pedisymptomatica enarratae observationes, quas infra, ubi de aurâ epileptica agitur, collexi et heic praecipue ad rubrum 2. a. fuissent collocandae. Probabile enim est, omnia hujus generis exempla locali cuidam vitio nervum laedenti aut prementi esse tribuenda. Sed meum omnino est, ab omni hypothetica desistere via et tantum ista, quae ocularis inspectio et experientia sat satis dilucidavit, suo quodam loco lectoribus tradere.

SECT. VI.

Nervorum minus distinctae affectiones.

1. *Ticillatio.*

Robinson new System of the Spleen, vapours etc. London 1729. 8. p. 148. squ. (primo paroxysmo lethalis epilepsia inde orta.)

Swieten (van) Comment. etc. T. III. p. 415. (inde epilepsia saepe facileque rediens.)

Popularibus regionis nostrae opinionibus quoque annumeranda est non contemnenda illa, infantes ob metum epilepsiae sub planta pedis non esse titillandos.

2. *Mutationes tempore pubertatis corpus humanum afficientes.*

Beaumes l. c. p. 253.

Guenault (Fr.) et Ludov. Robillat Ergo epilepsiae aetatis mutatio. Parisiis 1615

Meza (S. Th. de) Observat. de adfectu spasmodico refractario, in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 265. (vidit epilepsiam in juvene

XVI. annorum eamque ex spermatis confectione provenisse censet. Omnia et methodica et empirica remedia quamvis recenti morbo incassum adhibuit.)

Stahl (G. E.) D. de haereditaria dispositione ad varios affectus. Hae-
lae 1706. p. 48. (Omnes cujusdam familiae ac singulos, puber-
tatis tempore epilepsia laborantes, vidit.)

Tiffot l. c. p. 205. §. 99. (Saepius ex hoc fonte epilepsiam obser-
vasse.)

Willis (Th.) Pathol. cerebr. Oxon. 1667. 4. p. 75.

3. *Coitus.*

Non de nimia veneris exercitatione, corpus paulatim labefaciente, sermo est, de qua nobis infra (sub rubro Evacuat. nimiae) erit loquendum. Forfan et hujus rubri varia exempla sectioni, epilepsiam a sanguinis conge-
stione ad caput continenti, essent annumeranda. Nemo autem negabit, ple-
rumque morbosum illum tristemque coitus effectum vi in nervos agentis et
nervos concussanti esse tribuendum.

Cole, in Phil. Transact. n. 174. p. 115. (tres dies post nuptias sine
alia explicabili causa in femina quadam epilepsia.)

Didier, in Quaest. med. an epilepsiae mercurius vitae.

Feurstein (J. H.) D. de epilepsia. Gotting. 1792. p. 83. (in foe-
mina, quotiescunque rem habuit cum marito.)

Galen. de loc. affect. L. V. c. 6. (in mare.)

Haller Elem. Physiol. T. VII. p. 567. (Exempla in coitu mor-
tuorum.)

Lorry, vid. Beaumes l. c. p. 131. (nihil magis, quam coitum,
epilepsiam excitare contendit.)

Sauvages nosol. method. Cl. IX. artic. 31. n. 6. (in mare ad unum-
quemque coitum rediens.)

Swieten l. c. T. III. p. 412. (in mare.)

Tiffot l. c. p. 75. (per coitum aucta et post quemdam coitum.)

— — — p. 207. (foemina primo post nuptias die epileptica.)

Vater (E.), in E. N. C. Dec. III. ann. IX. obs. 163.

4. *Praegnatio.*

A. N. C. Cent. I. p. 115. (conceptionis indicium esse epilepsiam.)

A. N.

A. N. C. Cent IX. p. 296. (conceptioni superveniens.)

Rhodius l. c. cap. I. obs. 60.

Tiffot l. c. p. 79.

5. *Graviditas.*

A. N. C. Dec. I. ann. III. obs. 160. (simul foetum infestans.)

— — — — — obs. 161. 162. (cum caecitate et strabismo.)

— — Dec. II. ann. X. obs. 72.

Comm. litter. nov. 1741. hebd. 40. p. 313.

E. N. C. Dec. I. Ann. III. obs. 317.

— — Dec. II. Ann. X. obs. 89.

— — Dec. III. Ann. IX. obs. 208.

— — Cent. X. obs. 27.

Fernel. pathol. L. V. cap. 3. in Opp. omn. Hanov. 1610. fol. p. 408.

(multa de hac re observata.)

Gerber (Marc.), in E. N. C. Dec. III. Ann. X. obs. 72.

Gulbrand, in Act. Soc. med. Havn. Vol. I. Havn. 1777. (absque foetus noxa.)

Hoechstætter observ. med. Dec. VI. cas. 5. 6.

Hofmann (G. Fr.), Versuch einer Abhandl. über die Ursachen und Heilmittel der sogenannten Gichter bei Schwängern, Gebärenden, und Wöchnerinnen. Frankf. am M. 1795. 8.

Horstii (Gregor.) observat. med. singul. L. IV. Ulm. 1625. 4. L. II. obs. 21.

Jachini (Leonb.) Comment. in IX Libr. Rasis. Basil. 1574. cap. 14. p. 132.

Jacotius (Desider.), vid. Magni Hippocratis Coeca praesagia c. Comment. Hollerii et Jacotii. Lugdun. 1576. fol. Lib. IV.

Sect. 2. aph. 24. p. 675.

Mauriceau observ. sur la Grossesse. T. II. obs. 552.

— — — — — derniers observat. obs. 93.

Meier, in Balding. N. Mag. f. A. B. IV. St. 6. p. 481. (lethalis.)

Motte (de la) Chirurgie complete, T. II. p. 422. obs. 176. (mulier foetum masculinum in utero gestans epileptica, si autem foeminum, ab epilepsia plane libera.)

Petri (G. H. Ph.) D. de convulsionibus gravidarum parturientium et puerperarum. Gotting. 1790. 4.

Schafonsky D. de gravidarum etc. convulsionibus. Argentor. 1763.

Schenk (Joann.) observ. med. p. 120.

Seger (Georg.), in E. N. C. Dec. I. Ann. III. obs. 160. (cum motibus foetus in utero vehementibus.)

Storch (Joh.), von den Krankh. der Weiber. Gotha 1747. T. III. p. 126. 240.

Tiffot l. c. p. 80. squ.

Zacut. Lusit. prax. adm. L. I. obs. 21. 29.

6. *Dispositio ex epilepsia generata epilepsiam generans.*

Saepius jam observatum est, remota jam omni causa materiali remanere tamen talem systematis nervosi habitum, ut a levissima saepius non detegenda causa morbus recurrat. Ex eadem quoque causa quaevis epilepsia quo diutius hominem infestat, eo difficilior evadit curatu.

Feurstein (J. H.) D. c. p. 21.

Fischer (J. A.) D. de convulsionibus epilepticis habitualibus ex terrore. Erford. 1727. 4.

Kaempf l. c. p. 293. (Epilepsia ab irritatione nervi pollicis pedis orta sublatoque irritamento tamen perdurans.)

Petit (Guil.) et Nicol. Rainssant Ergo tantum ab habitu epilepsia. Parisiis 1662.

Richter (A. G.) medic. chirurg. Bemerkung. B. I. Götting. 1793. Cap. 8. p. 130—143. (In epilepsia habituali paroxysmos tantum suppressendos esse, ad quem scopum vomitorium ante paroxysmum datum optimum praebere effectum.)

Rumpelt (C. A. F.) D. sist. pathologiam epilepsiae. Lipsiae 1793. 4. pag. 34.

7. *Imitatio et simulatio epilepsiae tanquam verae epilepsiae causa.*

Cl. Cullen epilepsiae ab animi pathemate ortae annumerat quoque istam, ut ait, speciem epilepsiae simulatae (the feigned epilepsy), quae jam diutius simulata talem systematis nervosi habitum generavit, ut ad veri morbi gradum sit perducta. Jam contigit mihi, varia hujusmodi tristitia observare exempla. Ad hanc speciem ab aliis distinguendam aptissimum mihi vide-

videtur nomen: Epilepsia e simulata acquisita. Optimo jure hisce annu-
mandas esse puto istas epilepsiae proximas terribilesque convulsiones non
semper simulatas Quietistarum, Exorcistarum, Schamanorum Sibiricorum,
Fanaticorum Gebennensium (Sauvages nosol. meth. III. p. 115.) et
plurium varii hujus generis aut Enthusiastorum aut impostorum.

Cullen, Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. Leipzig 1784. p. 157.

Metzger (J. D.), System d. gerichtl. Arzneiw. Königsb. u. Leipzig
1793. p. 320.

8. *Hysterica passio.*

Epilepsia hysterica. Epilepsia uterina (Sennert). Epilepsia ab
utero (Johnston).

Act. Berolin. Dec. I. Vol. II. p. 12. (post abortum.)

Act. Erud. Lipf. Ann. 1712. Novemb. p. 520.

— — — Ann. 1727. Sptbr. p. 401. (cum amaurosi.)

Act. Nat. Cur. Vol. I. obs. 25. p. 67. (cum amaurosi.)

Alberti Jurispr. medic. P. II. p. 573.

Andree on hysteric fits, p. 27. (hysteriam saepius in epilepsiam
transire.)

Bierling (C. Th.) Medicus theor. pract. Jenae 1697. 4. p. 466.

Binniger Observ. medic. Cent. III. obs. 91.

Breslau. Geschichte. Versuch VII. p. 83.

— — — — — Vers. X. p. 607.

— — — — — Vers. XXVIII. p. 433.

Brunner (Balthaf.) Consil. med. ed. Laur. Hofmann. Halae
1617. 4. no. 13.

Büchner Miscellan. 1730. p. 1478.

Busch, in Balding. N. Magaz. f. A. B. X. St. 6. p. 566.

E. N. C. Dec. III. Ann. VII. VIII. obs. 104.

Eikmeyer D. de epilepsia uterina. Ultraject. 1698.

Falk (J. G.) D. de epilepsia seu convulsivis motibus virginum. Got-
ting. 1754. 4.

Fonseca Consil. T. I. n. 15.

Forest. Observat. et Curat. L. X. obs. 66.

Fouquet, in Journ. de Medec. T. LVI. p. 441.

Guarinoni Consil. medica. Venet. 1610. fol. n. 179. et 495.

Gül-

- Güldenklec (Balth. Timaei a) Casus medicinal. Lipsiae 1691. 4.
p. 27. 217.
- Helwig (Joh.) Observat. phys. med. August. Vindel. 1680. 4.
obs. 56.
- Hildesheim (Franc.) de cerebri et capitis morbis internis spicile-
gium. Francof. 1612. 4. p. 39.
- Lottich (J. P.) Consil. et observ. med. L. VI. Ulm. 1644. 4. p. 104.
- Mercati (Lud.) method. medend. Francof. 1608. fol. L. II. cap. 5.
- Mercurialis (Hieron.) respons. et consil. T. II. Venet. 1598. fol.
n. 101.
- Montani (J. B.) Consultat. medic. ed. Donzellini. Basil. 1557. 8.
n. 43. 47.
- Moor (Barthol. de) patholog. cerebri practica delineatio. Amstelod.
1704. 4. cap. 5.
- Mouram (Didacius) de passione hysterica s. de epilepsia hysterica.
Orthosii 1626. 4.
- Nigrifoli (Franc. Maria) Tractatus varii ad recentiorum mentem
concinnati. Ferrariae 1690. (Hystericum malum veram esse epi-
lepsiam contendit.)
- Nunn (A.) D. de epilepsia uterina. Erford. 1764.
- Piso (Car.) de morbis e serosa colluvie. n. 24 — 32.
- Pomme von den Nervenkrankh. beider Geschlechter; a. d. Franz. v.
Gladbach. Breslau u. Leipzig 1775. p. 124.
- Riedlin (Vit.) Observat. med. Cent. III. August. Vindel. 1691. 12.
obs. 52.
- Riverii (Lazar.) Observat. med. Cent. II. n. 31.
- — — Observat. commun. p. 466.
- Rubaei (Franc.) exercitat. nocturn. Genuae 1622. 8. p. 45.
- Sauvages nosolog. method. ed. Daniel. T. III. p. 115.
- Schülze D. casus hyterico-epileptici resolutio. Halae 1736.
- Smetii (Henr.) Miscell. med. Francof. 1611. 8. p. 214. 311.
- Tulpil (Nicol.) Observat. med. Amstelod. 1672. 8. Lib. I. cap. 10.
- Wedel D. de epilepsia hysterica. Jenae 1676.
- Welfsch. Hecatoft. II. p. 49.
- Wepfer Observat. p. 590. (simul cum mania.)

Zacut. Lusitan. de medic. princip. histor. L. VI. Amstelod. 1641.

S. Lib. I. hist. 32.

Zechii (Joann.) Consult. medicin. Francof. 1650. 8. n. 92.

9. *Hypochondriaca passio.*

Cumme (A. H.), in Act. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. obs. 85.

Moor (Barth. de) l. c. cap. VI.

Rhodius Cent. I. obs. 56.

Sylvatici (Bened.) Mercurius compilat. Artic.: Epilepsia. §. 40.

Tilemann (Ad. cognomine Schenk) D. de epilepsia hypochondriaca. Lugd. Bat. 1677.

10. *Idiosyncrasia.*

Act. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. X. obs. 92. p. 170. (ab odore ranunculi hortensis.)

Ammann Medicin. critic. Consil. 59 (a febi et candela fumantis foetore.)

Beaumes l. c. p. 84. (in juvene quoties oryzam coctam comedit.)

Büchner (J. P.) D. de rachitide perfecta. Argentorati 1755. (in infante ex adpectu cujusvis subjecti rubri.)

Clerc (Gabr. le) Medicus veri amator. p. 139. (ab odore cannabini; it. ab odore Raphani.)

E. N. C. Dec. II. ann. VII. app. p. 133. (a plumis passerum in lecto.)

Hannes (Chr. Rud.) über d. Friefel. Wesel u. Leipzig 1770. (ab adpectu coloris rubri excitata epilepsia.)

Paullini Cent. I. obs. 75. (a passerum plumis in vitta applicatis.)

— — Lagograph. p. 206. (ab adpectu leporis; etiam picti.)

Riedlin. Curat. med. curat. 607. (a capite vitulino comesto.)

Rondelet (Guil.) Method. curand. morbor. Parisiis 1576. 8. Lib. I. cap. 36. p. 170. (dare homines, qui ab aurium etsi levi refrigeratione epilepsia infestantur ideoque hoc incommodum ferici aures leviter claudentis ope evitare student.)

Sauvages l. c. T. III. p. 117. (In muliere, quoties templum ingreditur.)

Schenk Observat. L. I. obs. 117. (a quovis lentium esu.)

Schubart Medicin. septentrional. Cap. XI. p. 111. (a gratis et ingratis odorientis pari modo resuscitata.)

Tif-

Tiffot l. c. p. 158. (a potu Chocolatae aut Vini.)

Timaeus a Güldenkleee l. c. L. VII. cap. VIII. p. 314. (ab odore foliorum Juglandis.)

SECT. VII.

Plethora et sanguinis congestiones ad caput.

Armot, in Journ. de Medecine, pr. Mfr. Bacher. T. XCI. à Paris 1792. (Epilepsia a tumore glandularum et membranarum trachealium sanguinis a capite defluxum impredientium.)

Baldinger von d. Krankheit. einer Armees. Th. I. cap. 4. (a congestione ex refrigeratione.)

Beaumes l. c. p. 115.

Benivenius de abditis ac mirandis morborum causis. Florent. 1502. 4. Cap. 46.

Bierling. adversar. curiosa. Jenae 1679. 4. p. 218. (a motu nimio.)

Brassavola (Ant. Mus.) Comment. in Hippocratis aphorism. Basil. 1541. fol. p. 152. (a potu vini cyprici.)

Comm. litter. Noric. 1736. p. 154. (a potu spiritus frumenti in puero trienni.)

Dolaei (Jo.) encyclopaedia medica. Francof. 1691. 4. pag. 126. (a refrigeratione.)

— — — — p. 127. (a vini fortis potu.)

Drelincourt, v. Bonet l. c. obs. 6. p. 294. (a motu nimio brevi post prandium immodice sumtum.)

E. N. C. Dec. II. Ann. II. obs. 160. (a refrigeratione.)

Forest. (P.) l. c. L. IX. obs. 27. (ab ebrietate.)

Frankfurt. mediz. Wochenbl. 1782. no. 4.

Gabelchover (Oswald.) curat. et observat. Cent. VI. Tubingae 1617. 8. p. 125. (ab ingurgitatione vini.)

Greding l. c. p. 131. (a spiritus frumenti nimio potu.)

— — — p. 303. (in variis epilepticorum cadaveribus vasa cerebri sanguine turgescencia.)

Hagedorn, in Medicin. septentrion. T. I. Cap. XIX. p. 115.

Heers (ab) l. c. obs. 24. (plures epilepticos ob vini potum consuetum non posse sanari.)

Johr-

- Johnstone, in *Medic. Observ. and Inquiries*. Vol. II. n. 6. p. 115.
 Ledel (Sam.), in *E. N. C. Dec. II. Ann. VIII. obs. 85.* (a frumenti
 spiritu uberius sumto caecitas, epilepsia et mors.)
- Levret *Traité des Accouch.* p. 224.
 Lieutaud l. c. Vol. II. p. 381. obs. 235. Obs. Bartholini.
 — — — — — obs. 236. Valsalva.
 — — — — — p. 392. obs. 272. Act. Lipliens.
 — — — — — p. 394. obs. 280. Sponius.
 — — — — — p. 395. obs. 282. — —
 — — — — — p. 399. obs. 301. Act. Londinens. (in variis
 epilepticorum cadaveribus vasa cerebri sanguine turgescētia.)
- Löffler *Beiträge z. Arzneiw. und Wundarzneiw.* Th. I. Leipzig u.
 Altona 1791. (Calidius clima exacerbare observavit. Epilepti-
 cus quidam, qui vix uno per singulos menses paroxysmo afflige-
 batur, tricies intra XII horarum spatium eo corripiebatur, quum
 navis, in qua aegrotus erat, aequatori appropinquaret. In Eu-
 ropam redux sexto quovis mense una morbi accessione vexatus
 est. v. Richter chir. Bibl. B. XII. p. 327.)
- Marcard (H. M.) *über d. Natur u. Gebrauch der Bäder.* Hannover
 1793. p. 410. 411. (a balneo frigido.)
- Mekel *Recherches etc.* in *Mémoires de Berlin.* 1760. Obs. 10.
 Meza (Sal. Theoph. de), in *Coll. Societ. med. Havn. T. I. Havniae*
 1774. n. 19. p. 154. (a saturatissimo Coffeae potu lethalis epi-
 lepsia.)
- Mithof (H. B.) *D. de sede irritamenti in epilepsia.* Gottingae 1788.
 p. 14. (ab ebrietate consueta.)
- Morgagni l. c. *Epist. IX.* §. 12 et 14.
- Pelargi *medizin. Jahrgänge.* Vol. II. p. 183. (a potu spiritus vini.)
- Ramel *Epist. ad Dr. Percy de ebrietate cum convulsionibus,* in
Journ. de Médec. 1793. Aout, n. 2.
- Richard (Nicol.) et Phil. Caron, *Ergo epilepsiae venarum ju-
 gularium sectio.* Paris 1689.
- Riedlin (Vit.) *Observat. med. Cent. III. August. Vindel.* 1691. 12.
 obs. 90. p. 210. (a spiritus vini potu.)

- Saillant, in Mémoir. de l'Acad. d. Sc. à Paris. ann. 1779—1782.
T. III. (epilepsia a vera humorum abundantia.)
- Saur, in Vetensk. Acad. Handling. Vol. XXXIV. Stockholm. 1773.
pag. 92.
- Sauvages l. c. p. 102. 113.
- Schenk l. c. L. I. obs. 218. — ex Benedicto. — (ab ebrietate.)
- Schneider de Catarrhis, p. 234.
- Severini (Marc. Aurel.) de efficaci medicina L. III. Francof. 1671.
fol. p. 42. (epilepsia a spirituosorum potu aucta.)
- Sponius, in Act. Erud. Lipf. Ann. 1682. vid. Bonet l. c. T. I.
pag. 299.
- Tiffot l. c. p. 121 et 152.
- — — p. 125. (a vini potu et motu nimio.)
- — — p. 136. (a vini potu immodico.)
- — — p. 153. (ab exercitatione nimia in hypocausto nimis
calido.)
- — — p. 155. (a nimio labore.)
- — — p. 157. (a refrigeratione extremitatum inferiorum in
aqua frigida.)
- Tralles uf. opii. Pars III. Cap. I. p. 23.
(1. a congestione ad caput, ira et motu excitata.)
(2. a congestione ad caput ex vita sedentaria, potu cerevisiae ni-
mio, et frequentiore ciborum assumptione.)
p. 32. (epilepsia a vini potu aucta.)
- Untzer (Matth.) *ιστρονοσολογία*. p. 102. (a motu nimio.)
- Wedel, in Act. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. obs. 160. (a conge-
stione ex refrigeratione.)
- Wiel (Corn. Stalpart. van der) Observat. med. Cent. II. Leidae 1687.
8. Obs. 15. Scholion, p. 177. (a nimio calore.)
- Zacut. Lusitan. Prax. admir. L. I. obs. 21. (a plethora universali.)
- — — — obs. 27. (a plethora in gravida.)

SECT. VIII.

Evacuationes nimiae.

1. *Sanguinis.*

Baumer (J. W.) Diff. cit. p. 24.

E. N. C. Dec. III. Ann. V. VI. obs. 263.

Hagendorn (Ehrenfr.) Observat. et historiar. medico-pract. Cent. II.

Rudolstadt, 1698. 8. p. 54. (a narium haemorrhagia.)

Hippocratis aphorism. Sect. VII. aphor. 9.

Jacquinnelle, in Journ. de Medecine. T. LXXIV. Juillet — Septem-

bre. à Paris 1790. (Cl. Richter in Chir. Bibl. T. XI. p. 551.

huncce epilepsiae casum aut terrori aut immodicae venae sectioni tribuit.)

Morgagni (J. B.) l. c. Lib. I. Epist. X. art. 21,

Paul. Aegineta l. III. cap. 19.

Pew (Rich.) Skizzen a. d. Heilkunde. p. 23. squ.

Sauvages l. c. T. III. p. 102.

Schroeder D. de convulsionibus ex haemorrhagia nimia oriundis.

Marburg. 1752.

2. *Sudoris.*

E. N. C. Dec. III. Ann. II. obs. 46.

Gabelchover l. c. Cent. IV. curat. 59.

3. *Seminis.*

Fonte (Lael. a) Consult. medic. Venet. 1608. fol. n. 95.

Gafferi (Achill. Pyrmin.) Curat. et observat. med. una cum Wel-

schii consiliis edit. 1668. obs. 3.

Gazette de Santé 1783. n. 4. p. 13, 76.

— — — — 1784. p. 169. (ab onania.)

Heers (Henr. ab) Observat. med. p. 176.

Hofmann (Fr.) Tr. de morbis a nimia et intempestiva venere oriun-

dis. Halae 1725. 4.

Journal de Medec. milit. T. II. p. 346. (ex onania.)

Krause Beobacht. einer Epilepsie von Onanie, im mediz. Wochenbl.

v. Dr. Müller u. Hofmann. Frankf. a. M. 1792. p. 454 — 460.

G 2

Marx

- Marx (M. J.) bestätigte Kräfte der Nieren. Hannov. 1781. p. 24 et p. 35. — Observatio Cl. Bloch — (ex onania.)
- Quarin (Jof.) animadv. med. p. 29. (ab onania cum mucosi e genitalibus humoris effluxu.)
- Reinold, in Samml. auserl. Abhandl. für pr. Ärzte. B. XIII. p. 681.
- Schenk l. c. Lib. I. obs. 208. (ex Alsharavio.)
- Sinibaldi (J. Bened.) γενεαυθρωποια, s. de hominis generatione decateuchon. Romae 1642. fol. p. 718. (varia exempla epilepsiae ex immodica venere.)
- Tiffot l. c. T. II. p. 453, 461, 634. (ex onania.)
- Zimmermann von d. Erfahrung. Zürich 1764. Th. II. p. 403. (ab onania)

4. *Seri et muci.*

- Feurstein (J. H.) Diss. cit. p. 83. (in femina ab onania.)
- Hagendorn l. c. Cent. I. histor. 21. p. 36. (lethalis epilepsia a purgatione nimia.)
- Ranoe (A. B.), in Act. Soc. med. Havn. Vol. II. Havn. 1791. S. p. 108. (a purgatione nimia.)
- Tiffot l. c. Th. V. p. 86. not. 26. (a fluore albo maligno.)

SECT. IX.

Retentio et suppressio evacuationum naturalium et praeternaturalium.

1. *Haemorrhagiarum variarum.*

- Act. Berolinens. Dec. I. Vol. II. p. 12. (e retento sanguine post abortum.)
- Gabelchover l. c. Cent. II. p. 54.
- Hagendorn l. c. Cent. I. histor. 20. p. 35. (a haemorrhagia narium suppressa.)
- Hemmann (J. A.) chirurg. Aufsätze. Berlin 1778. 8. (aut a subito suppressa narium haemorrhagia aut a terrore epilepsia.)
- Riedlin (Vit.) Lineae medic. 1695. p. 454.
- Tiffot l. c. p. 134. (a narium haemorrh. suppressa.)

2. *Menstrui fluxus.*

Baumer Diff. cit. p. 23.

Binninger (Joh. Nicol.) observ. medic. Cent. V. Mont. belg. 1673.

8. Cent. II. obs. 99.

Boueix, in Journ. de Medec. T. XXX. p. 440.

Brendel Opuscul. T. I. p. 178.

E. N. C. Dec. I. Ann. I. obs. 86.

— — — Ann. III. obs. 259.

Falk D. de epilepsia s. motibus convulsivis virginum. Gotting. 1754. 4.

Feller (C. G.) D. de therapia per electrum. Lips. 1785. p. 23.

Franklin, in London. Magazin. May, 1757. p. 211.

Greding l. c. T. I. p. 17.

Guigou, in Journ. de Medec. T. XLIX. p. 427.

Göldenklöe (Tim. a) oper. omn. Lips. 1677. 4. p. 27, 314.

Heer (Henr. ab) Observat. n. 24.

Helwig observat. phys. medic. posthum. ed. Luc. Schroekh.

August. Vindelic. 1680. 4. p. 74.

Langii opera omn. Vol. III. p. 62, 63.

Mangin histoire generale de l'Electricité, T. III. à Paris 1752. 12.

— pag. 85.

Nunn D. de epilepsia uterina. Erford. 1764.

Paulini (C. F.) sacra herba, s. nobilis salvia. August. Vindelic. 1688.

4. p. 127.

Plater (Fel.) Observat. Basil. 1614. Lib. I. p. 19.

Regii (Henr.) praxis medica. Ultraject. 1657. 4. Lib. I. fol. 36.

Riedlin observ. med. Cent. III. obs. 43.

Sauvages l. c. p. 115.

Sigwart D. sist. casum puellae post mensium suppressionem epilepticae. Tubing. 1780.

Spengler (Lor.) Briefe und Erfahrungen über die Wirkungen der Electricität in Krankheiten. B. IV. Kopenhag. 1754. p. 39.

Swieten (G. van) Comment. T. III. p. 447.

Tissot l. c. p. 131. squ.

Walther (C. L.) obs. med. chir. Lips. 1715. 8. obs. 58.

Welfsch

Welfsch (G. H.) Sylloge curat. et observ. med. August. Vindelicor.
1667. 4. Dec. IV. n. 6.

Wilhelm (H. M.) Diss. list. observat. electrico-medicarum semicen-
turiam. Wirceburg. 1774. p. 148.

Willis (Thom.) Patholog. cerebri. Oxon. 1667. 4. p. 96.

3. *Haemorrhoidum.*

E. N. C. Dec. III. ann. I. obs. 119.

Gazette salulaire de Bouillon, 1775.

Langlois (Flor.) et Euseb. Renaudot D. ergo epilepsiae et me-
lancholiae haemorrhoides salutares. Parisiis 1640.

Rhodius l. c. Cent. I. obs. 65.

Tiffot l. c. p. 133. et nota translatoris n. 9.

Zacut. Lusitani prax. admir. P. I. obs. 25 et 28.

4. *Lochiorum.*

E. N. C. Dec. III. ann. II. obs. 100.

Greding l. c. T. I. p. 56.

Güldenkleee (Timacia) oper. omn. Lib. I. ep. X. p. 476.

5. *Alvi.*

E. N. C. Dec. I. ann. I. obs. 88. (diarrhoea suppressa.)

Gabelchover l. c. Cent. II. obs. 38. (obstruct. alv.)

Hollerii Comment. in coacas Hippocratis, p. 876. (dysenteria sup-
pressa.)

Medicina septentrion. collatitia, T. I. pag. 20. (diarrhoea
suppressa.)

Tiffot l. c. p. 61, 133.

Tulpil Observat. Lib. I. obs. 11. (obstruct. alv.)

6. *Seminalis.*

Ackermann in annot. ad l. c. Tiffoti, n. 25, 26.

Bonet Sepulchret. anatom. Lib. I. Sect. II. obs. 44.

Frank (J. P.) System der med. Poliz. T. I. p. 118. squ.

Krünitz D. de matrimonio multorum morborum remedio. Francof.
ad Viadr. 1749. 4. p. 21.

Stahl Theoria medicin. ver. p. 1355. (deliria et epilepsia cum pria-
pismo pollutionibus sanantur.)

Stege-

Stegemann (Ambros.), in E. N. C. Dec. III. Ann. V. VI. obs. 12.
Virideti (Jo.) Tractat. nov. de prima coctione, praecipue de ventriculi fermento. Genevae 1691. 8. p. 305. (a castitate post frequentem coitum.)

Zacut. Lusitan. Prax. adm. L. II. obs. 119. (a castitate post frequentem venerem. Semen acre post mortem in vase deferente repertum.)

7. *Salivae.*

Tiffot l. c. Th. V. p. 138.

8. *Urinae.*

Baumer Diff. cit. p. 21.

Graff (Sigism.), in E. N. C. Dec. III. Ann. II. obs. 212.

Heurnius (Jo.) de morbis, qui in singulis partibus capitis insidere consueverunt. Lugd. Batav. 1594. 4. Cap. XXII. p. 234.

Hoechstætter obs. med. rarior. Dec. V. Basil. 1627. 8. p. 695.

Sauvages l. c. p. 102.

Schneider de catarrh. p. 244.

Tiffot l. c. p. 138.

Wedel, in E. N. C. Dec. I. ann. III. obs. 15.

Zacut. Lusitan. Prax. admir. L. I. obs. 35.

9. *Transpirationis.*

Baldinger von d. Krankh. einer Armee, Th. I. cap. 4.

Baumer Diff. cit. p. 21.

Benivenius (Ant.) de abdit. morborum causis. cap. 46.

Dolaei Encyclop. medic. p. 126.

E. N. C. Dec. II. Ann. II. obs. 160.

— — Dec. III. Ann. III. obs. 106.

Monro (Donald) Account of Diseases most frequent in the British military hospitals. p. 237.

Riedlin Lin. med. Ann. I. August. obs. 6. p. 232.

10. *Ulcerum consuetorum exsiccatio.*

Amati Lusitani curation. medicinal. Centur. altera. Venetiis 1552.

12. histor. VI. (in crure.)

Bartholin (Thom.) histor. medic. Cent. XXX. hist. 20. (in crure.)

Bres-

Bresl. Samml. 1721. p. 661.

— — — 1725. p. 532.

E. N. C. Dec. II. Ann. VI. obs. 201.

— — — Ann. VII. obs. 144.

Fabricii Hildani Observat. Cent. II. obs. 10. (in crure.)

Lentilii (Rosin.) Miscellan. med. pract. P. I. Ulm. 1698. 4. p. 3.
(in crure.)

Miscell. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. obs. 29. (in crure.)

Pechlin (Joh. Nic.) Observat. physico-med. L. III. Hamburg. 1696.
4. Lib. II. obs. 30.

Ponteau Oeuvres posthumes. T. II.

Riedlini (Vit.) Curat. medicin. millenar. Ulm. 1709. 4. p. 88, 574.
(pone aures.)

Tulpia Observat. L. I. cap. 8. (in capite.)

Zacut. Lusitan. Prax. adm. L. I. obs. 32. (in lepore nasi.)

II. *Vulnerum praecox oclusio.*

Jacquinelles, in Journ. de Medec. T. LXXIV. à Paris 1790. (post
vulneris in amputatione facti oclusionem, v. Richt. chir. Bibl.
B. XI. p. 457.)

Marchettis (Petr. de) Observat. chirurg. Patav. 1664. 8. (Capi-
tis vulnus.)

12. *Variarum.*

Ackermann (J. C. H.) mediz. Skizzen. Heft II. Leipzig 1790.
p. 70. (Metastasin lacrymarum ad cerebrum statuit indeque epi-
lepsiam infantum a fletu prohibito derivat.)

Demerchenc de la Conseillere D. de auditu. Ultraject. 1710.
(ab aurium fluxu suppressio.)

Tiffot l. c. p. 88. (a suppressione sputi purulenti.)

SECT. X.

Ventriculi et abdominis vitia organica.

Bartolin. histor. anat. Cent. V. hist. 61. (renum.)

Beaumes l. c. p. 245. (a lapsu scrobiculum cordis laedente.)

Bonet Sepulchr. anat. L. I. Sect. XII. obs. 42. (Lien scirrhusum.)

Bres.

- Bresl. Geschicht. Verf. XII. p. 445. (invaginatio ilei in infante.)
 Bresl. Samml. 1725. April, p. 421. (carnosum concrementum in intestinis.)
 Delii (H. F.) amoenit. medic. Lips. 1745. 8. Dec. 5. in praefatione. (Foramen oris callosis floreni magnitudine prope pylorum.)
 E. N. C. Dec. II. ann. II. obs. 152. Schol. (globuli pingues intestinis adhaerentes.)
 Galen. de loc. affect. L. V. cap. 6. ed. Chart. T. VII. p. 493.
 Graef (Jo. Paul.) D. f. casum de motibus epileptico-convulsivis herniae incarceratae supervenientibus per venae sectionem sublatis. Altorf. 1747.
 Harder Apiarium. Basil. 1687. 4. obs. 99. (intestina tenuia erosa.)
 Hollerii opera omnia. Cap. XVI. Schol. p. 105. (Lien obstructum.)
 Journal de Medec. T. LXXXI. Novembr. 1789.
 Morgagni de sedib. et caus. morb. Ep. LXII. art. 2.
 Rhodius l. c. Cent. I. obs. 61. (Mesenterii vitium.)
 Schenk Observat. Lib. I. obs. 193. (Lienis.)
 Schmucker Wahrnehm. Th. II. p. 183. (hydrocele.)
 Sorbait (Paul. de) universa medicina theoret. et pract. Norimb. 1672. fol. p. 115. (Ventriculus erosus et perforatus in püero.)
 Tiffot l. c. p. 57. (Cardiae ulcus carcinomaticum.)
 — — — p. 73. (Ulcus vesicae urinariae.)
 Tulpil Observat. L. I. obs. 9. (Lienis.)
 Welfch Hecatost. II. obs. 79. p. 49. (hepatis.)

SECT. XI.

Impuritates primarum viarum.

- Aëtius, in Tetrabibl. II. Serm. II. c. 13. 17.
 — — — — III. Serm. I. cap. 18.
 Alexand. Trallian. Oper. Basil. 1556. fol. T. I. cap. 15. pag. 62. (biliosae.)
 Bang (Fr.), in Act. Havn. T. I. p. 98. (biliosae.)
 Beaumes l. c. p. 80, 106. (ab oleosorum esu.)
 Boerhave de morb. nervor. p. 433. (biliosae.)
 Bonet Medicin. septentr. L. I. Sect. XIV. cap. 1. Tom. I. p. 105.

- Bonet Sepulchret. anat. Lib. I. Sect. XII. obs. 40.
 — — — — — addit. obs. 9.
 Brückmann (C. P.) Enarratio choreae S. Viti et epilepsiae. Francof. 1786. 8. (Epilepsia a sordibus putridis cum humeri luxatione periodica.)
 Brunneri (Balthaf.) consil. medic. Halae 1617. 4. conf. 21.
 Burggrav auserlesene mediz. Fälle und Gutachten. Frankfurt 1784. 8. p. 114. (a pituita abundante.)
 Chiflet (Jo.) singulares ex curationibus et cadaverum sectionibus observationes. Parisiis 1611. 8. p. 115.
 Cledet (du) Ergo ab humore bilioso epilepsia. Parisiis 1645.
 Dolaei Encyclop. medica. p. 119. (a lacte matris corrupto in infante.) p. 127. (a brassica sale condita.)
 E. N. C. Dec. I. Ann. VI. VII. obs. 187.
 — — — — — obs. 201. (Meconium.)
 Engelhard (J. P.) D. sist. morbos hominum a prima conformatione usque ad partum. Jenae 1792. p. 18. (Epilepsia a nimia pressione regionis umbilicalis indeque orta bilis effusione.)
 Fernel oper. omn. p. 668. Consil. 7.
 Feurstein Diff. cit. p. 37. (a bile corrupta.)
 — — — — — p. 84. (a lacte nutricis iratae.)
 Forest. Observat. L. X. obs. 57. Schellion. (ab esu anguillae.)
 — — — — — obs. 64.
 Fothergill medic. and philosoph. Works. London 1781. p. 21. fq.
 Frankenau Satyrae medicae. p. 153. (a nimio anguillae esu.)
 Gabelchover l. c. Cent. IV. p. 117.
 Galen. Comm. in Hippocr. aphorism. L. V. aph. I. ed. Charter. T. IX. P. II. p. 195. (a mala ventriculi digestionem.)
 — — — p. 296. (a colluvie biliosa.)
 Guarinoni (Chrph.) Consilia medicinalia. Venet. 1610. fol. Conf. 1. 8.
 Haebert (Fr. Xav.) de febr. annuis etc. Monach. 1784. 8. p. 75. (Epilepsiam, durante constitutione biliosa, esse biliosam.)
 Heineke, v. Beaumes l. c. p. 59. (Lac nutricis iratae.)
 Hildesheim (Franc.) de cerebri et capitis morbis internis spicilegia. Francof. 1612. 4. p. 599. (ab esu pomorum et lactis.)

Hip-

- Hippocrates Epidem. L. VI. cap. 54. ed. Foef. p. 1201. (a biliofa faburra epilepsiam oriri.)
- Hofmann (Fr.) Medic. rat. system. Supplem. p. 50. §. 4. (meconium.)
- — — Tr. de usu et abusu medic. chym. p. 49. (lac matris nimis pingue.)
- Kaempf (J. G.) von einer neuen Methode die Krankheiten des Unterleibes zu heilen. 2te Aufl. Leipzig 1786. 8. p. 427, 445. (ab infaret. biliof.)
- Kaltfchmidt D. de convulsionibus ex atra bile. Jenae 1758.
- Kanold, in Breslau. Samml. Versuch XII. p. 405.
- Maffaria (Alexand.) responsa et consilia diurnalial. Venetiis 1613. fol. Conf. 13.
- Meibom (Brandan.) D. de epilepsia stomachica. Helmstad. 1740.
- Mithof (H. B.) D. de sede irritamenti in epilepsia. Gotting. 1788. 4. p. 12.
- Moebii (Gothofr.) fundament. physiolog. Francof. et Lipsiae 1678. p. 397. (colluvies biliofa.)
- Montagnana (Barthol. de) Consilia medica. Venet. 1497. fol. Conf. 43.
- Nov. Act. Nat. Cur. Vol. III. obs. 80.
- Paullini (C. F.) Anguilla. Lipsiae 1689. 8. p. 183. (ab anguilla comesta.)
- Pechlin Observat. L. II. obs. 29. p. 282. (a nimia flatulentia.)
- Pietfch von den Ohnmachten und Convulsionen, vornehmlich der fallenden Sucht. Hamburg u. Leipz. 1753. 8. — passim. — (praecipuam epilepsiae causam in vitiis gastricis latere contendit.)
- Piso (Carol.) de morbis a colluvie serosa. Pont-a-Mousson. 1618. p. 47. (ab aquae larga copia in ventriculo.)
- Rahn de consensu. P. III. p. 114. (a fordibus biliosis.)
- Reneauve (Paul.) ex curationibus observationes. Paris. 1606. 8. obs. 47.
- Rhases Continens L. V. cap. 1. fol. 96. a.
- Rosenau (Laur. Scholz. a) Consilia medica Cratonis aliorumque Cl. Virorum. Francof. 1598. fol. Conf. 379.
- Rümler l. c. obs. 69. (a fragis large comestis.)
- Salmuth Observ. med. Brunsvic. 1648. p. 35. (colluvies biliofa.)
- Sauvages l. c. p. 101. n. 5. — p. 114. n. 3.
- Schenk Observat. Lib. I. obs. 191. 192.
- Smetii (Henr.) Miscellan. medic. Francof. 1611. 8. p. 93.

- Starke Archiv für d. Geburtsh. B. I. St. IV. p. 139. (colluv. biliosa.)
 Stoll Ratio medend. P. VII. p. 293.
 Storch Abhandl. v. d. Kinderkrankheiten, B. II. p. 92.
 Swalwe (Bernard.) querelae et opprobria ventriculi respectu abusus tam
 diaetetici quam pharmaceutici. Amstelod. 1665. 12. p. 248.
 Thielow, in Comm. praelect. D. 11. Mai. 1794. in societate Erfordina:
 von den der Gesundheit nachtheiligen Folgen der Furcht. v. Mediz.
 chirurg. Zeit. 1794. B. II. p. 94. (Epilepsia in infante a lacte
 matris gravi timore affectae.)
 Thomafius (G.), in E. N. C. Dec. III. Ann. III. obs. 191. (dulciaria
 infantum.)
 Thoneri (August.) de admirandis convulsivis motibus Libri IV. Ulm.
 1651. 4. obs. 3. 4. p. 93.
 Tiffot l. c. p. 39, 54. squ.
 Trincavella (Victor.) consil. medic. Basil. 1587. fol. Cons. 10. 22.
 Unzer, der Arzt, B. V. p. 520. squ. (vitium digestionis specificum.)
 Valleriola (Franc.) Observat. medicinal. Lib. VI. Lugdun. 1573. fol.
 Lib. VI. obs. 7.
 Woodward (John) Select cases and consultations in Physik. London
 1737. 8. p. 313. (biliosa saburra.)
 Zacut. Lusitani Prax. admir. L. I. obs. 21.
 Zückert mediz. Tischbuch, p. 178. (a ciborum sale nimis conditorum
 usu. — Knolle, Schaarschmidt.)

SECT. XII.

Vermes in ventriculo et tubo intestinali.

- Ackermann (J. G.) D. de epilepsiae motuumque convulsivorum infan-
 tum causis praecipuis. Gryphiae 1765. 4. §. 7.
 Act. Nat. Curios. Vol. VI. obs. 127.
 — — — Vol. VII. obs. 19.
 Baldinger von den Krankheit. einer Armee. 2te Aufl. Kap. 3. p. 174.
 Bartholin Histor. anatom. Cent. IV. hist. 7.
 Cent. VI. hist. 20.
 Baumer, in Diff. cit. p. 26.

Beau-

- Beaumes l. c. p. 191. squ. — p. 331.
- Blumenbach medicin. Bibl. B. II. p. 257.
- Bosch (Jo. Jac. van den) historia constitutionis epidemicae verminosae.
Lugd. Bat. 1769. 8. p. 132.
- Bündell D. f. observat. morbor. rar. vid. Vogels kleinere academische
Schrift. n. 2.
- Commerc. litter. Noric. Ann. 1735. p. 314.
- Comte (le), in Journ. de Medecin. 1790. Juillet, n. 4. (taenia.)
- Doevern (van) Abhandl. von den Würmern in den Gedärmen. Leipzig
1776. 8. p. 239.
- Dupan, in Journ. de Medec. 1789. Septbr. n. 1.
- E. N. C. Dec. I. Ann. VI. obs. 187.
- — Dec. II. Ann. VII. obs. 135. Schol. 189.
- — — Ann. X. obs. 166.
- — Dec. III. Ann. II. obs. 133.
- — — Ann. III. obs. 191.
- Forest. (Petr.) Observat. L. X. obs. 64.
- Gockelii (Eb.) Consil. et observ. Decad. VI. August. Vindel. 1683. 4.
Dec. IV. obs. 8. (Animalculum lacertiforme per alvum egestum.)
- Gordack Geschichte der Krankheit und Kur eines siebzehn Jahre mit der
Epilepsie geplagten Frauenzimmers. Königsberg 1770. (vermes in
ventriculo.)
- Göldenklee (Timaei a) l. c. L. VII. cas. 19. p. 324. (hirudines de-
glutitae.)
- Hamburg. Magaz. B. XV. Hamburg 1755. 8. p. 313.
- Hautefierck (Rich. de) Recueil etc. T. II. p. 443.
- Heers (Henr. ab) obs. med. p. 280.
- Heister (Laur.) med. chirurg. Wahrnehm. p. 64.
- — — comp. medic. pract. Cap. XIV. §. 55.
- Hirschel (Leonh.) Gedanken üb. die Heilart der fallenden Sucht. Mie-
tau 1774. 8. (passim.)
- Horst (G.) epistol. medicinal. Sect. VII.
- Jaenisch D. f. pentas observationum medicarum. Halae 1768. vid. Bal-
ding. Auszug. Th. I. p. 119.
- Lachmann (Jof.) observat. nonnull. pract. Regiomont. 1783. p. 46.
- Loeff.

- Loefflers Beiträge. B. II.
 Mack (J. C.), in E. N. C. Ann. X. obf. 103.
 Medical observat. and Inquir. Vol. VI. p. 68, 70. fqu.
 Melle (de) D. de vi vitali, Lugd. Bat. §. 107.
 Mithof Diff. cit. p. 8.
 Pechlin l. c. Lib. I. obf. 65.
 — — — Lib. II. obf. 29.
 Phelfum (van) historia ascaridum. Leoward. 1762. p. 212.
 Philos. Transact. Vol. L. P. II. p. 212.
 Pietsch, in libr. cit. passim.
 Ranoe (A. B.), in Act. Soc. med. Havn. Vol. II. Havniae 1791. 8. p. 342.
 (Trichurides.)
 Rhodius Observat. Cent. I. obf. 59.
 Richter chirurg. Bibl. B. IX. p. 373.
 Riedlin l. c. Cent. III. obf. 42.
 Riverii Observat. Cent. IV. obf. 28. 59.
 Rougeres (de), in Journ. de Medec. T. XXX. p. 51.
 Sauvages l. c. T. III. p. 98.
 Scheidt (J. Val.) D. de epilepsia verminosa. Argentorat. 1708.
 Schenk l. c. L. III. obf. 110.
 Schmucker vermischte Schriften, Th. III. p. 19, 27.
 Stahl (G. E.) theor. medic. p. 1018.
 Tissot l. c. p. 60. fqu.
 Wepfer (J. J.), in E. N. C. Ann. II. v. Bonet. Sepulchret. anat. T. I.
 pag. 304.
 Zacut. Lusitan. de medic. princip. histor. Lib. VI. Amstelod. 1641. 8.
 Lib. II. p. 884.

SECT. XIII.

*Materia morbosa retenta, egressum moliens, retrogressa,
 metastatica.*

I. Exanthemata varia.

Allioni vom Friesel. Mühlhausen 1785. (varia exempla epilepsiae
 a miliaribus.)

Bang

- Bang Auswahl aus dem Tagebuche des Königl. Friedrich. Krankenhaus, Th. I. aus dem Lat. v. Jugler. Kopenhag. u. Leipzig 1790. p. 165. (Metastasis feri ad cerebrum a scabie retropulsa.)
- Baraillon obs. de quadam epilepsiae specie a miliaribus nata, in Histoire de l'Acad. d. Scienc. à Paris 1779. p. 217. (a miliaribus epidemica.)
- Beaumes l. c. p. 162. sq.
- Berchelmann Fragm. z. Arznei-Naturkunde u. Geschichte. Heft I. p. 5. (a scabie antegressa.)
- Bierling adversaria curiosa. Jenae 1679. 4. L. I. p. 40. (a variolis.)
- Bresl. Samml. Versuch XXIX. p. 84. (a purpura.)
- — — 1725. May, p. 532.
- Cartheuser (J. Fr.) patholog. T. I. cap. de epilepsia (in Suecia epilepsiam infantum ob consuetam tineae capitis per lotionem cum aqua frigida repulsionem est frequentiore.)
- Clarke (Th.), in Medic. Journ. June. London 1781. p. 428. vid. Samml. auserl. Abhandl. Th. VII. p. 201. (post variolarum inoculationem.)
- Coschwitz D. de exanthematum seroso-lymphaticorum retrocedentium noxis. Halae 1728. p. 13. §. 16. (ab achoribus repulsis.)
- Diemerbroek (Isbr.) Observat. et curat. centur. in Oper. omn. Ultraject. 1685. (a tinea capitis retropulsa.)
- Dufour, v. Beaumes l. c. p. 173. (a scabie retrogressa.)
- E. N. C. Dec. II. Ann. IV. obs. 89. Schol. (ab achoribus repulsis.)
- Gazette salulaire de Bouillon. 1775. p. 42. (a scabie retrogressa.)
- Güldenkleee (Tim. a) oper. omn. p. 1075. (ab achoribus repulsis.)
- Hagendorn l. c. Cent. I. histor. 8. p. 14. (ab achoribus repulsis.)
- — — — — histor. 9. p. 17. (a scabie retrogressa.)
- Heister (L.) comp. med. pract. Cap. XVIII. §. 24. (Variolae eruptionem molientes.)
- Herz üb. den Schwindel. 2te Ausg. Berlin 1791. p. 385. sq. (a scabie repulsa.)
- Hofmann (Fr.) Med. system. P. III. cap. 12.

- Lentilii (Rosin.) Miscell. med. pract. Ulm. 1698. 4. (a scabie retrogressa.)
- Linnée, in Abhandl. der Königl. Schwed. Acad. der Wiss. B. IV. p. 309. (ab achoribus repulsis.)
- Loeffler Beiträge zur Wundarzneik. B. I. (a scabie retrogressa.)
- Martii (Jerem.) observat. med. Cent. edit. a G. H. Welsch, in Syllog. curat. et obs. med. Ulm. 1668. 4. obs. 24.
- Meza (S. Th. de), in Collect. Soc. med. Havn. Vol. II. p. 261.
- Otto (B. C.), rsp. J. G. Kretschmer D. f. tres scarlatinae observationes. Francof. ad Viadr. 1793. (a scarlatina.)
- Rhodius l. c. Cent. I. obs. 62. (a herpete retropuls.)
- Riedlin Lin. med. 1696. p. 205. (a scabie retropulsa.)
- Roboel, in Handelingen van het Geneeskondige Genootschapp: Servandis civibus. Deel II. 1776. (a tinea capitis retrogressa.)
- Rochard, in Journ. de Medec. T. XXV. à Paris 1766. pag. 46. (a scabie.)
- Sauvages l. c. p. 103. n. 10.
- — — p. 119. n. 11.
- Schenk l. c. L. I. obs. 199. (a scabie retrogressa.)
- Sennert (Dan.) Paralip. ad Lib. V. Institut. med. Viteberg. 1642. 4. n. 2. (a scabie repulsa.)
- Stahl (G. E.), in Colleg. casual. minor. pag. 335. (ab achoribus repulsis.)
- Sydenham opusc. med. p. 80, 661. (a variolis.)
- Tiffot l. c. p. 140, 142. (a scabie-repulsa.)
- — — p. 172. (a scabie retenta.)
- Titius (Sal. Const.) de pellagrae morbi inter Insubriae austriacae agricolae grassantis pathologia. Vitebergae 1792. 4. p. II. (a pellagra.)
- Trincavella (Vict.) Consil. medic. Basil. 1587. fol. Lib. I. conf. 29. (a scabie repulsa.)
- Villar, v. Beaumes l. c. p. 171. (a tinea capitis retrogressa.)

2. Febris.

- Act. Nat. Cur. Vol. VI. obs. 39. (a putrida neglecta.)

Ahle-

- Ahlefeld (J.), rfp. Jo: Andr. Schreiber, D: de epilepsia feb-
brium intermittentium comite. Gieslæ 1765. 4.
- Becker (J.), in app. observationum ad Tr. de morte submerforum.
Gieslæ 1704. 8. obf. 10.
- Berchelmanmann Fragmente zur Arznei-Naturkunde und Geschichte.
Heft I. p. 5.
- Bournainville, in Journ. de Medec. Janvier, 1758. p. 43.
- Caldera, v. Beaumes l. c. p. 237. (febr. intermitt.)
- Cardani (Hieron.) de subtilitate L. XXI. Norimb. 1550. fol. L. II.
(a febre pestilentiali.)
- Coiteri (Volch.) observ. med. chirurg. Norimb. 1572. fol.
- Diverfi (Petr. Sal.) Tr. de febre pestilentiali. Francof. 1586. 8.
cap. 5. (a febre pestilentiali.)
- Finke (Leonh. Lud.) von den Gallenkrankheiten. Nürnberg 1787.
8. p. 74. (a febre biliosa.)
- Gualdo (Ferd.), in epist. ad Cl. Turra. vid. Turra osservazione
mediche e chirurgiche intorno alla faccolta febrifughe e antiset-
tiche della corteccia dell' ippocastano. Vicenza 1788. pag. 33.
(a febre tertiana.)
- Hagendorn l. c. Cent. I. obf. II. (post-quartanam.)
- Hoven (Fr. Willh. van) über d. Wechselfieber. Winterthur 1789. 8.
p. 42. (periodica in febr. interm.)
- Journal de Medecine, T. XXI. p. 224. T. 8. art. 6.
- Lanzoni, in Manget. Bibl. med. pract. . . . (a vehementi febris
paroxysmo.)
- Lautter (Fr. Jos.) Histor. medic. biennal. morbor. ruralium. Vin-
dobon. 1761. 8. (a febr. intermitt.)
- Lyfons (Dan) pract. Abhandl. von den Wechselfiebern. a. d. Engl.
Leipzig 1774. 8. p. 107.
- Maffa, v. Beaumes l. c. p. 237. (a febr. quotidiana.)
- Medicus (Fr. Casim.) Samml. von Beobacht. aus d. Arzneiw. B. II.
Zürch 1764. 8. p. 373, 387, 409.
- Morton (Rich.) Pyretolog. Cap. IX. hist. 14. 15.
- Sauvages l. c. p. 97. n. 1. (Eclampsia typhodes.)
- — — p. 107. n. 17. (Eclampsia febricosa.)

- Sauvages l. c. p. 118. n. 9. (Epilepsia febricosa.)
 Sennert (Dan.) de febris L. IV. Viteberg. 1619. 8. L. IV. c. 14.
 (a febre maligna epidemica.)
 Solenandri (Reiner.) Consilior. medicinal. Sect. V. Francof. 1596.
 fol. Sect. I. conf. 25. (a febre quotidiana.)
 Torti (Fr.) Responsiones iatro-apologeticae. Francof. et Lips. 1756.
 4. Lib. IV. Cap. IV. hist. 3. (a febre intermittente.)
 Valleriola (Franc.) Locorum communium L. III. Venet. 1553. 8.
 L. III. cap. 18. (a febre pestilentiali.)

3. *Varia.*

- Acta Berolinens. Dec. I. Vol. V. p. 19. (materia podagrica.)
 Astruc de morb. venereis. L. IV. cap. 2. §. 9. p. 359. (lues venerea.)
 Ballon (Guil.) oper. omn. Genév. 1762. 4. T. I. p. 21. (hydrops.)
 Blochs mediz. Bemerk. Berlin. 1774. 8. p. 178. (lues venerea.)
 Bonet Sepulchr. anat. Lib. I. obs. 7. 14. (Scorbutica acrimonia.)
 — — — Lib. I. Sect. XII. add. obs. 3. (venerea.)
 Bontè, in Journ. de Medec. Janvier, 1764. p. 41. (rachialgica.)
 Boucher, vid. Beaumes l. c. pag. 178. (metastasis scorbutica ad
 cerebrum.)
 Charles (Hug.) et Dion. Bazin Ergo epilepsia hydropi super-
 veniens lethalis. Paris. 1629.
 Drawitz (J.) de scorbuto. Lipsiae 1647. 8. p. 125. (scorbutica.)
 E. N. C. Cent. I. p. 272. (venerea.)
 — — Dec. II. Ann. VI. obs. 42. Schol. pag. 112. (arthritis re-
 trogressa.)
 — — Dec. III. Ann. IX. X. obs. 200. (erysipelas repulsa.)
 Eugaleni (Sev.) Lib. de scorbuto morbo. Bremae 1588. 8. p. 57.
 (scorbutica.)
 Fabre nouvelles observations sur les maladies veneriennes. à Paris
 1779. p. 73.
 Fontaine (F. L. de la) medicin. chirurg. Abhandlungen. Breslau
 u. Leipzig 1792. (a materia plicae polonicae ante metastasin hu-
 jusce materiae ad crines hinc inde circumvagante saepius epi-
 lepsia.)
 Gardane Gazette de Santé. à Paris 1773. p. 47. (venerea.)

Guarinoni (Chr.) *Consilia medica.* Venetiis 1610. Consil. 13.
(venerea.)

Kaempf. in Act. philos. med. Societ. acad. Scient. princip. Hassiacae.
Vol. I. Gieß. 1771. 4. p. 152. (venerea.)

Pelargi (Huld.) *medicin. Jahrg.* Th. II. Leipzig 1724. 4. p. 317.
(venerea.)

Plenk (Jof.) *de morb. venereis.* p. 132. (venerea.)

Sauvages l. c. p. 119. n. 12. (Epil. syphilitica.)

— — — p. 120. n. 14. (Epil. rachialgica.)

— — — — — (ab arthritide retenta.)

S E C T. XIV.

*Acria (mechanica, chemica) — Narcotica. — Venena vel
ingesta, vel externe applicata.*

Ackermann, in annot. ad Tissot. l. c. p. 58. not. 20. (a Laudano
liqu. Sydenh.)

Baldinger *Neues Mag. für Ärzte.* B. II. p. 254. (a cerussa infanti per
incuriam data.)

Barbette *prax. medic.* p. 3. (ab oleo Juniperi ingesto.)

Bartholin (Th.) *Histor. anatom.* Cent. V. hist. 66. (a vitro deglutito.)

Bauhin (Joh.) *Histor.* T. III. p. 101. (ab apii graveolentis esu.)

Baumer *diff. cit.* p. 22. (ab oleo therebinthinae ingesto.)

Becker, in app. ad Tr. de morte submersorum. obs. 6. (ab opio.)

Boehmer (Fr.), rsp. Titius; D de exanthematum differentia et origine.
Viteberg. 1766. p. 7. (a nimia dosi piperis longi ad fugandam febrim.)

Bresl. *Geschicht.* Vers. XVI. p. 413. (Epilepsia lethalis a deglutita
moneta in valvula coli haerente.)

Bresl. *Samml.* 1722. p. 286. 511. (a cicuta virofa.)

Camrarii (Jo. Rud.) *Memorab. med.* Cent. XX. Tübingae 1683. 8.
Cent. IV. n. 94. (a Mercurio.)

— — — Cent. X. n. 90. (ab esu radicis angelicae sylvestris.)

Donat (Marcell.) *de histor. med. mirab.* Francof. 1613. 8. L. II. c. IV.
p. 155. (a Mercurio.)

E. N. C. Dec. I. Ann. III. obs. 15. (ab ol. Junip. ingesto.)

- E. N. C. Dec. II. Ann. II. p. 470.
 — — — Ann. III. obs. 77. (a clysmate acri.)
 — — — Ann. VI. obs. 116. (a cicuta virofa.)
 — — — Ann. VII. obs. 162. (a purgante draſtico.)
 — — — — obs. 196. (a fumatione tabaci excitari.)
 — — Dec. III. Ann. I. obs. 65. } (a veratro.)
 — — — Ann. III. obs. 88. }
 — — — Ann. IV. obs. 30. (a vino lithargyriſato.)
 — — — Ann. VII. VIII. obs. 171.
 Garmann (C. Fr.) de miraculis mortuorum. Lipſiæ 1681. 4. Lib. I.
 Tr. V. §. 17. p. 54. (a petroſelino comefto.)
 Gùldenklec (Tim. a) oper. omn. p. 324. (a cantharidibus devoratis.)
 Hagendorn l.c. Cent. I. obs. 21. (a purgante draſtico.)
 Hannemann, in E. N. C. Dec. III. Ann. III. p. 78. (a petroſelino.)
 Hoechſtaetter (Phil.) Obſerv. med. Dec. VII. caſ. 9. (a vapore aquae
 fortis naribus excepto.)
 Hofmann (Fr.), rſp. G. L. Schott, de medicamentis infeſuris. Halae
 1713. p. 33. (a Mercurio.)
 Mardorff (J. J.) de maniacis nuperis Gieſſenſibus a Solano furioſo. Gieſ-
 ſae 1691. 4. (a Solano epilepſia.)
 Mariotte, in Journ. de Med. T. XXIII. p. 545. (a petroſelino comefto.)
 Moegling, v. Zeller docimaſia, ſigna, cauſae et noxa vini lithargy-
 rio manganifati. Tubingae, p. 18. (a plumbi venenata facultate.)
 Montani (Jo. Bapt.) Tr. de morb. gallico; recuſ. in Collect. Luſin. et in
 Ej. Opp. variis cura Hier. Donzellini. Baſil. 1558. T. II. (e mer-
 curialium longiore uſu quosdam aegrotos in epilepſiam incidille.)
 Mutzell medic. und chirurg. Wahrnehm. Berlin 1772. Samml. II. n. 20.
 (ab opio.)
 Nov. Act. Nat. Cur. Vol. VII. obs. 39. (a Mercurio.)
 Negendorp Cent. III. hiſtor. 84. p. 395. ſq. (a hyoſcyamo.)
 Paul. Aegineta L. III. cap. de epilepſia. (Colicae pictonum per roma-
 nam ditionem graſſantis a convulſionibus epilepticis concomitatae
 mentionem facit.)
 Quarin l.c. (Pulverem ſternutatorium Nicotianae epilepticis interdici-
 dum eſſe ob metum excitationis paroxyſmi.)

- Raiger, in E. N. C. Dec. III. Ann. II. obs. 23. (ab Opio in podagræo adhibito.)
- Raymond Traité des maladies, qu'il est dangereux de guerir. Avignon 1757. T. II. p. 303. (a Mercurio.)
- Riedlin Lin. med. 1700. p. 512. (a majori emetici dosi.)
- Rochard, in Journ. de Medec. Novemb. 1758. p. 430. (ab oenanthe crocata.)
- Roggert, in Joh. Cl. Tode med. chir. Bibl. B. VII. p. 199. (ab infuso Theae saturatissimo.)
- Sauvages l. c. p. 103. n. 11. (ab atropa belladonna.)
- — — p. 105. n. 15. (a coriaria.)
- Schenk l. c. p. 117. (ab alli esculenti diuturno esu.)
- Seger, in Medic. septentr. collat. Lib. I. Sect. XIV. c. 10. (a nimia dosi olei destill. Juniperi.)
- Seeliger, in Miscell. Nat. Curios. Dec. II. Ann. I. obs. 138. pag. 240. (a fomentatione capitis cum decocto Hyoscyami.)
- Sennert Prax. med. L. VI. p. 300. (a fungorum venenatorum esu.)
- Schwenke over de waare gedaante Aart en Uitwerking der Cicuta aquatica Gesneri. 1756. (a Cicuta virofa.)
- Tiffot l. c. p. 57. (a majori dosi balsami canadensis excitata.)
- Valentinus (M. B.), in E. N. C. Ann. X. obs. 118. (a comestis baccis belladonnae.)
- Verdries (Jo. Melch.) D. de convulsionibus, speciatim quatenus a remedium mercurialium vel saturninorum abusu provocantur. Giesæ 1732. 4.
- Welfch (G. H.), in E. N. C. Dec. I. Ann. II. obs. 8. (ab oleo therebinthinae matronae nephriticae dato.)
- Wendt (Fr.) Nachr. von dem Krankeninstitute zu Erlangen. Erlangen 1783. 8. (ab aspersione cerussae ad excoriationes.)
- Wepfer (J. J.) Cicutæ aquaticæ historia et noxæ commentario illustratæ. Basil. 1679. p. 5 et 24. (a cicuta virofa.)
- Widenfeld D. sist. observationum medicarum trigam. Gottingae 1768. v. Baldinger Auszüge. Th. I. p. 70. (ab acu deglutita.)
- Zannetti (F.), in N. A. N. C. T. VII. p. 184. (a Mercurio.)

Annotat. Huic sectioni addendum mihi videtur sic dictum contagium epilepticum five spuma in ore epilepticorum conquassata et quasi effervescente durante paroxysmo inter labia egrediens ab alio deglutita; illa enim olim magni in producenda epilepsia habebatur. Quae apud medicos exempla prostant, haec sunt:

Bresl. Samml. Vers. XXII. p. 573. (excitata per contagium.)

Comm. litt. noric. 1731. p. 29. } (per morsum epileptici.)
— — — — 1732. p. 406. }

Rayger (Car.), in not. ad Paul. Spindleri observat. medic. Francof. 1691. 4. (per salivam spumascentem communicata.)

Riedlin (Vit.) Observat. Cent. I. n. 33. (per pocula communicata.)

Sauvages l. c. T. II. p. 583. (aut ab ira aut a saliva per morsum communicata.)

Ejusdem fere argumenti sunt sequentes in animalibus factae observationes:

Langeolotti, in Misc. Natur. Cur. Ann. VI. et VII. 1675. obs. XII. (Epilepsia lethalis in cane, qui juxta ancillam epilepticam durante paroxysmo in lecto decubuerat.)

Winter (Joh. Jul.), in Hamburg. Adresscontoirnachrichten. 1793. n. 97. p. 774. (Jusculum, cujus partem mulier epileptica comederat, a cane quodam plane comestum in eo frequentes paroxysmos epilepticos produxit.)

APPENDIX I.

Eorum, quae epilepticorum sectiones docuerunt, secundum partium ordinem brevis expositio.

Scriptores.

- Bauder (Jof.) observ. medic. incisionibus cadaverum medicis illustratae. 1762. 8.
- Bartholin (Thom.) Histor. anatom. Cent. II. et III.
- Bonet Sepulchret. anatom. Lib. I. Sect. XII.
- E. N. C. (passim.)
- Fernelii (Jo.) de abditis rerum Causis Lib. II. Parisiis 1548. fol. L. II.
- Greding (J. E.), in Adversar. med. pract. Vol. II. et III.
- — — — — sämmtl. Schrift. Th. I. p. 289. usque ad finem.
- Leveling (Henr. Palm.) D. de cranio militis quondam venerci, postea epileptici, tandem apoplectice defuncti. Ingolstadt. 1774. 4. c. figg.
- Lieutaud (Jof.) Histor. anatom. medica. edit. Schlegel. Vol. II. Longobaliff. 1787. 8. Lib. III.
- Metzger Pr. sistens historiam sectionis anatomicae in cadavere foeminae maniaco-epilepticae. Regiomont. 1781. recus. in Ejusd. exercitat. academ. Regiom. 1792.
- Morgagni de sed. et caus. morb. Ep. IX.
- Tiffot l. c. (passim.)
- Thom. Willis pathologia cerebri. Oxoniae 1667. 4. (Utique convulsionum causam saepe quoque cadavere inciso fugere. Frequentem esse aquam in cerebro absque epilepticis motibus.)

S E C T. I.

Caput.

Cfr. Part. II. Cap. IV. Sect. III. Capitis vitia.

a) *Capitis magnitudo.*

Greding l. c. Th. I. p. 289. (Capitis magnitudinem praecipui in hac re esse momenti minime ei videtur. E XXVI. epileptico-furi-

furiosis erant IV. et ex XVI. epileptico-fatuis II. quibus caput nimis parvum. Ex XX. epilepticis nemini caput nimis grande.)

b) *Cranium.* (Cfr. P. II. Sect. III. Litt. B.)

α) *Diameter.*

J. B. Fontani observat. anat. med. Turin. 1699. 12. (in cadavere epileptici nihil vitiatum invenit in encephalo praeter miram cranii crassitiem.)

Greding l. c. p. 289. (in plurimis epilepticorum cadaveribus defectis cranium iusto crassius et valde solidum. E XXVI. epileptico-furiosis XIX. exhibuere crania valde crassa et IV. ex iis e contrario tenuiori cranio erant praediti.

E XVI. epileptico-fatuis XIV. valde crassa.

E XX. epilepticis XVI. valde crassa et ex iis I. cujus cranii dimidia pars valde crassa, altera dimidia valde tenuis reperta.

β) *Superficies.*

Act. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV. V. obs. 35. (Incurvatio diploes internae.)

Baader, v. Lieutaud l. c. p. 448. Obs. 480. a. (foveae cranii.)

Bonet Sepulchr. lib. I. Sect. 12. obs. 3. Tom. I. p. 273. (Interna diploe partis superioris ossis occipitis erosa.)

— — — obs. 32. Tom. I. p. 285. (Incurvatio diploes internae ossis frontis.)

Greding l. c. p. 291. (In nonnullis epilepticorum cadaveribus locus paululum elevatus valde tenuis in angulo anteriore superiore ossis bregmatis. In medio hujus loci foramen parvum.)

— — — (Cranium in regione suturae coronalis et sagittalis ab ampulla in caput delapsa valde depressum. Interne elevatio magnitudine nucis juglandis.)

— — — p. 292. (In plurimis epilepticorum cadaveribus multa in cranio reperta sunt foramina. Sic ex XXVI. epileptico-furiosis XVIII. ex XVI. epileptico-fatuis XI. et ex XX. epilepticis X. fecanti hoc testabantur. In cadavere epilepticae cujusdam VI. foramina permagna.)

Leveling (H. P.) D. de carie cranii militis quondam venerci, postea epileptici. c. icon. Ingolstadt. 1774.

Rii m.

Rümler (J. Udalr.) posthum. obs. med. obs. 100. (Calvaria passim ita erosa, ut dura cerebri membrana cum ipso cerebro per ea foramina emeretur.)

NB. *Processus clinoidens.*

Greding l. c. p. 330. (E XXVI. epileptico-furiosis in VIII. reperiuntur acuti et mucronati.

In I. ex iis media e parte basis cranii sese obtulit prominentia acudis instar. Idem in II. epilepticis observatum est.)

γ) *Suturæ.*

Morgagni, v. Lieutaud l. c. p. 443. obs. 469. (In cadavere hydropici, postea epileptici, suturæ cranii ad semi-digiti latitudinem pellucidae.)

c) *Meninges.*

Bonnet Sepulchr. Lib. I. Sect. 12. obs. 9. (Concrementum lapideum inter duram et piam.)

— — — obs. 27. (ossificatae.)

Bartholin, v. Lieutaud l. c. p. 381. obs. 236. (Inter meninges præter feri copiam portio effusi sanguinis.)

Fantoni, v. Lieutaud l. c. p. 309. obs. 3. (Meninges aridissimæ.)

Greding l. c. p. 294. (Aquæ copia inter duram et piam observata est e XXVI. Epileptico-furiosis in XIII., e XVI. epileptico-fatuis in VIII., e XX. epilepticis in XII.)

Lieutaud l. c. p. 377. obs. 224. (varia sarcomata involucris cerebri adnata.)

Morgagni l. c. Ep. IX. §. 2. (aquæ stagnationes inter meninges.)

Poupart, in Mémoir. de l'Acad. d. Scienc. 1707. p. 62. (pituita alba inter meninges.)

Rhoetus, in Philosoph. Transact. n. 315. p. 399. (aquæ stagnationes inter meninges.)

α) *Dura.*

Baumer diss. cit. p. 13. (ossificata et protuberantiis ossibus acutis versus cerebrum directis obsita.)

— — — p. 14. (Foraminulum in dura matre communicans cum cavea humore fusco plena.)

Bertram (A. G.) D. de spasma ab inanitione conjecturae. Halae 1781. (cranio firmiter adhaerens.)

Brien, in Journ. de Medecine. T. XIV. p. 319. (Septem concre-
tiones scirrhusae lapideae in dura meninge.)

Cappel D. de epilepsia e tumore nervo vago inhaerente. Helmstad. 1781. (concrementum magnitudine nucis avellanae durae matri et nervo vago annexum.)

Cloffy observations taken dissection of morbid bodies. Sect. I. obs. 9. p. 17. (ulcuscula in superficie interna dur. matris.)

Fantoni opuscula medica. Genevae 1738. 4. p. 37. (dura mater firmiter cum cranio concreta.)

Lieutaud l. c. p. 314. obs. 18. (crassior tuberculis exasperata et piaae firmiter agglutinata.)

— — — p. 444. obs. 470. (In cadavere epileptici, dein fa-
tui, postea hydropici dura meninx hinc inde hydatides ciceris
magnitudine exhibens. Glandulae Pachionianae solito majores et
numerosiores totum sinum longitudinalem comitantes. Lympha
mucosa, gelatinosa et copiosissima inter meninges et cerebri cor-
ticem stagnans.)

— — — p. 446. obs. 476. (In cadavere epileptico-cache-
ctici cum hebetudine materia copiosissima crassa, albicans et gela-
tinosa durae matri firmiter adhaerens.)

Mekel Recherches sur les causes de la folie. obs. 14. (prominentia
ossea in parte durae matris inferiore.)

la Motte Traité complet de chirurg. T. II. p. 397. (ossificationes.)

Pew (Rich.) Skizzen. p. 38. (solito crassior.)

Poupart, in Mémoir. de l'Academ. Roy. des Scienc. 1705. (Sub
dura meninge magna copia gelatinae duriusculae firmiter durae
matri agglutinatae.)

Rümler, v. Bonet Sepulchr. p. 280. (dura meninx pustulis obfita,
nonnullis locis erosa, cerebro passim per foramina erumpente.)

αα) *Processus falciformis.*

Baumer diss. cit. p. 13. (in osseam laminam mutatus.)

Boerhave prax. med. T. V. p. 36. (Protuberantiis ossibus obfitus.)

Lieu-

Lieutaud l. c. p. 323. et 324. obs. 45. 48. 50. 51. (ossificationes.)
de Pozzisi, in Eph. N. C. Dec. I. Ann. IV. V. obs. 34. (promi-
nentiae osseae.)

ββ) *Tentorium.*

Greding l. c. p. 295. et Th. II. p. 71. (In quibusdam epileptico-
fatuorum cadaveribus observavit sarcoma ad magnitudinem fructus
rubi idaci sinistrorsum prope cranium tentorio subsidens, hispi-
dum, membrana firma involutum, sine dubio a pia meninge
ortum trahens. Interior pars exhibet concrementum osseo-lapi-
deum aequalis figurae et magnitudinis, quod lobos cerebri poste-
riores facile potuit irritare, etsi exinde nullam detegerit laesio-
nem. Talia sarcomata minime antea in hominibus sunt observata.
In cane tamen epileptico observavit A. H. Fasch [v. Ej. et rsp.
Boeslii D. de epilepsia. Jenae 1686. p. 15.] officulum lamel-
latum, scutiforme, a pollicis magnitudine firmiter inter cerebrum
et cerebellum meningibus et vasis insitum.)

β) *Pia.*

Greding l. c. p. 297. (In X. e XXVI. epileptico-furiosis nimis con-
densata et pituitosa. In caeteris horum XXVI. ne quidem mini-
mum ejus vestigium apparebat.

In VI. e XVI. epileptico-fatuis modice condensata et pitui-
tosa. In caeteris nihil ejus restabat.

Omnibus XX. epilepticis plus minusve pituitosa ac mollis.)

— — — p. 298. (Concrementa ista mollia, alba, semiglobu-
laria, fungosa, de quibus jam Cel. Günz in Prolus. II. de cere-
bro tractat, plerumque solitoque in utroque latere regionis fron-
talis piae meningi subsidens, magnitudini dimidiae partis seminis
cannabini, interdum quoque dimidii ciceris aequantia in XV. e
XXVI. epileptico-furiosis in quantitate modicam superante appa-
rebant.

In VIII. e XVI. epileptico-fatuis in nimia quantitate. In VI.
ex iis rariora.

In omnibus XX. epilepticis et quidem in XII. in nimia quan-
titate, in VIII. autem in minore quantitate reperiiebantur.)

Greding l. c. p. 301. (In hisce concrementis observatae ossificationes in XXVI. epileptico-furiosis et XVI. epileptico-fatuis nunquam reperiuntur. In varia autem quantitate extiterunt in IX. ex XX. epilepticis, quorum unus erat somnambulus.)

— — — p. 34. (In V. e XXVI. epileptico-furiosis aquae copia inter piam meningem et substantiam corticalem. In III. e XVI. epileptico-fatuis. In nomine autem XX. epilepticorum.)

Johnstone, in Medical observat. and Inquiries. Vol. II. n. VI. p. 115. (Vasa piaae sanguine repleta et extensa.)

Lieutaud l. c. p. 359. obs. 167. (Inter substantiam corticalem et piam meningem maxima aquae copia.)

— — — p. 443. obs. 469. (Sub tenui meninge materia gelatinosa cum bullulis aëreis.)

— — — p. 445. obs. 473. (In cadavere epileptici cum sensuum hebetudine e capitis gravitate universus cerebri ambitus gelatina fulva erat obductus ad intimos ejus usque gyros, quae etiam anfractus cerebri complebat. Tota eminebat super cerebri corticem griseum digiti auricularis altitudine ad basin usque praedicti visceris et sic piam matrem a sede sua expulerat.)

Pew l. c. p. 38. (Particula piaae in regione laterali hemisphaerii dextri inflammata et opaca. In parte anteriore hemisphaerii dextri orbitae supersedente arteriae piaae meningis dilatatae et rubicundae.)

d) *Vasa cerebri.*

Drelincourt, vid. Bonet Sepulchr. anat. p. 294. addit. obs. 6. (Arteriae totius cerebri nigro spissoque cruore repletae.)

Greding l. c. p. 303. (Vasa cerebri sanguine turgida in IV. e XXVI. epileptico-furiosis, in nullo e XVI. epileptico-fatuis et XX. epilepticis.)

Johnstone l. c. p. 115. (sanguine turgida.)

Lieutaud l. c. p. 328. obs. 62. (summa vasorum turgescencia.)

— — — p. 376. obs. 221. (Vasa cerebri sanguine turgida.)

Mekel Recherches etc. obs. 10. (sanguine repleta.)

Morgagni l. c. Epist. IX. §. 12. et 14. (sanguine repleta.)

Mor-

Morgagni l. c. Epist. IX §. 18. (arteria basillaris paululum extensa.)
 Wepfer, in E. N. C. Dec. III. Ann. I. obs. 135. (sanguine turgida
 et circa occiput sanguinis $\frac{1}{2}$ j. effusa.)

α) *Sinus falciformis (longitudinalis).*

Greding l. c. p. 295. (E X. epileptico-fatuis in VII. et e XII.
 epilepticis in VIII. polypi in sinu falciformi.)

Lieutaud l. c. p. 324. obs. 48. (Circa sinum longitudinalem ossa
 echinata.)

— — — p. 375. obs. 217. (Septem farcomata circa sinum
 longitudinalem sita et pisi molem aequantia.)

Pozzisi (Ant. de), in E. N. C. Dec. I. Ann. IV. V. obs. 34. (La-
 mina ossea sinum falciformem premens.)

Wagner (F. A.) epist. gratulat. de morborum insanabilium cura-
 tione. Lipsiae 1792. 4. p. 8. (Polypus in sinu longitudinali, e
 rubro albescens, longitudine trium pollicum, crassitie vero cala-
 mum scriptorium superans. Caro polypi maximam quoad partem
 densa et compacta inprimis media parte, qua parvo cuidam cal-
 variae tuberculo aspero ita erat agglutinator, ut nonnisi cultro
 abscindi posset.)

β) *Plexus choroideus.*

Greding l. c. p. 315. (E XXIII. epilept. furiosis VI, quibus plexus
 choroid. tumescens et tendinis instar erat.

E XX. epilept. III. quibus tumescens et atropurpureus.

— — — V. quibus valde tumescens et durus.

— — — IV. modice tumescens caeterisque valde tu-
 mescentibus et hydatidibus refertus.)

Johnstone, in Medic. Observ. and Inquiries l. c. (Hydatis magni-
 tudine globuli sclopetarii in plexu choroideo.)

Lieutaud l. c. p. 359. obs. 167. (Plex. choroid. hydatidibus summe
 conspicuis refertus. — Acta Londinensia.)

— — — p. 361. obs. 172. (glandulis scirrhis exasperatus. —
 Miscellan. curiosa.)

— — — obs. 173. (a) (variis granulis duris et scirrhis re-
 pletus. — Dulac.)

Lieu-

Lientaud l. c. p. 381. obs. 236. (Glandulae turgidae in plexu choroideo. — Valsalva.)

Rhoetus, in Philosoph. Transact. n. 315 et n. 399. (Hydatidibus repletus.)

Sorbait Paul. de) universa medicina theoretica et practica. Norimb. 1672. fol. p. 117. (Scirrhi in plexu choroideo.)

Wepfer l. c. p. 303. (sanguine turgescens.)

e) *Massa cerebri.*

α) *dura.*

Baader (J.) observat. medic. incisionibus cadaverum anatomicis illustratae. Friburg. 1762 8. p. 107. (tam corticalis quam medullaris cerebri substantia in doloris, de quo in dextro capitis latere querebatur aegrotus, sede durior et scirrhusa.)

Baumer diss. cit. p. 15. (cerebrum duriusculum.)

Fantoni l. c. (in corpore calloso durum concrementum a magnitudine nucis.)

Greding l. c. p. 306. (contra Boneti, Meadii et aliorum sententiam in nemine e XXVI. epileptico-furiosis, XVI. epileptico-fatuis et XX. epilepticis durum aut friabile reperit cerebrum.)

Lientaud l. c. p. 335. obs. 84. (in dextra parte prope cristam galli dura et callosa cerebri massa. — Morgagni.)

— — — p. 395. obs. 282. (cerebrum subdura. — Sponius.)

— — — p. 399. obs. 301. (circa cristam galli durum et callosum.)

Morgagni l. c. §. 25. (pars cerebri anterior cartilaginea. — Gualthieri.)

— — — §. 26. (substantia corticalis indurata. — Kaaw Boerhave.)

Plater (Fel.) observat. medicinal. Basil. 1680. 8. Lib. I. p. 103. (in cerebri parte anteriore concrementum callosum consistentiae ovi diutius cocti et magnitudinis ovi gallinacei.)

β) *mollis.*

Greding l. c. p. 309. (Ex XXVI. epileptico-furiosis erant XVIII, quorum cerebrum iusto mollius et quidem in quibusdam molliissimum, aquosum atque axungiae instar erat.)

E XVI.

E XVI. epileptico-fatuis I. cujus cerebrum justo mollius, et V. quorum mollissimum, aquosum atque axungiae instar erat.

E XX. epilepticis VIII. quibus mollissima cerebri consistentia. In caeteris quoque mollities solitam valde superans consistentiam.)

Morgagni l. c. §. 16. (Collapsio partis anterioris hemisphaerii sinistri a mollitie nimia orta. Substantia corticalis jam justo mollior, medullaris autem plenarie gelatinam aemulans.)

— — — §. 18. (Mollities plenaria thalamorum nervorum opticorum gelatinae semicorruptae nigrescenti aequantium.)

Sauvages nosolog. meth. ed. Daniel. T. III. p. 107. (Cerebrum molle, pultaceum.)

Schmidt (E. G.) Observation. chirurg. obs. 3. (Hemisphaerium dextrum plenarie gelatinosum a levissimo quodam attactu liquefcens. Hemisphaerium sinistrum sparsim aequali modo sese exhibens. In alio cadavere dextrum hemisphaerium pituitosum cultelli ope in filis extensibile.)

γ) *putrida.*

Baader l. c. p. 107. (Abscessus ad ovi gallinacei magnitudinem accedens.)

Baumer Diff. cit. p. 14. (Cavea, ovi capax, humore fusco plena; partes vicinae semicorruptae fusco colore infectae.)

(Cavea in sinistro cerebri hemisphaerio a magnitudine nucis juglandis, lividis e medullari substantia parietibus comprehensa, e qua humor nigricans filamenta quaedam continens effluxit.)

Bonet Sepulchr. anat. Sect. XII. addit. obs. 5. p. 293. (Abscessus magnitudine ovi gallinacei in lobo dextro. — Borrichius.)

— — — Sect. XV. obs. 18. p. 371. (Abscessus in lobo dextro. — Bauhinus.)

Greding l. c. p. 306. (E quinque epileptico-suriosis in cadavere foeminae epilepticae phtili demortuae cerebrum sese obtulit foetidissimum.)

Lieutaud l. c. p. 346. obs. 118. (Cerebrum abscessum magnitudine ovi columbini recondens, cujus pus album et foetidum viam sibi cuderat versus medullam oblongatam. — Diaria eruditorum.)

Lieu-

- Lieutaud l. c. p. 350. obs. 137. (Abscessus in cerebro, ventriculis inculpatis. — Fernelius.)
- — — p. 352. obs. 144. (Dimidium fere cerebrum sphaeculatum. — Salmuth.)
- — — — obs. 149. (Cerebrum fideratum. — Glandorp.)
- — — p. 354. obs. 150. (Cavea magni ovi capax, plena sanguine concreto et fero subfusco, cujus latera substantiam cerebri semiputrem ostendebant. — Morgagni.)
- — — — obs. 152. (Pars hemisphaerii sinistri mollissima in sese confidens, in gelatinam ex cinereo subfuscam mutata, quod vitium ad partem anteriorem ventriculi sinistri protendebatur. — Morgagni.)
- — — p. 355. obs. 153. (In cadavere veneri epileptici, simul febre acutissima et affectu comatoso laborantis, pars sinistra ferme tota corrupta et gangraenosa et in media illa corruptione tria corpuscula tanquam gummata virentia. — Guarinoni.)
- — — p. 460. obs. 528. (Cultro anatomico subjecta corpora nonnullorum epilepticorum exhibent purulentiam, cerebrum et ejus involucra desoedantem. — Fernelius.)
- Mekel l. c. Obs. XII. p. 85.
- Morgagni l. c. Epist. LXII. §. 15. 17. 18.
- Vicrac (Joann.), in Verhandelingen vitgegeeven door de Maatschappye der Weetenschappen te Harlem. XIV. Deel. Harlem 1779. p. 49. (Abscessus cerebri.)
- d) *Sanguine aut stagnante aut effuso repleta.*
- Bonet l. c. p. 294. (Turgescencia vasorum cerebri et sanguinis effusio.)
- Johnstone l. c. p. 115. (idem.)
- Lieutaud l. c. p. 335. obs. 84. (In sinistro et anteriore cerebri latere aliqua sanguinis copia effusa. — Morgagni.)
- — — p. 392. obs. 272. (Hemisphaerium dextrum phlogoseos notam prae se ferebat.)
- — — p. 394. obs. 280. (Inflammationis notae in parte dextra cerebri. — Sponius.)

Lieu-

Lieutaud l. c. p. 395. obs. 282. (Cerebrum quasi inflammatum. — Sponius.)

— — — p. 448. obs. 481. (a) (Cortex cerebri sanguine infarctus cum valis varicosis et materia quadam viscida vel gypsea obductis. — Fournier.)

Mekel l. c. obs. 10. (Turgescientia vasorum cerebri et sanguinis effusio.)

Wepfer l. c. p. 303. (idem.)

e) *aquosa.*

Bartholin (Thom.) Histor. anat. Cent. III. hist. 80.

Bonet l. c. obs. 7. 8. 10. 12. 13. 15. 17.

Lieutaud l. c. p. 415. obs. 363. (E cerebri substantia transversim scissa effluxerunt aquae citrinae, majori copia stagnantes circa nervorum conjugationes. — Bonetus.)

— — — p. 430. obs. 414. (Omnes cerebri recessus intus et extus sero pleni. — Mangolt.)

— — — p. 440. obs. 454. (Cerebrum quinque libras pendens et copiosa aqua circumfusum; aderant quoque pustulae aqua plennae. — Bonetus.)

— — — p. 448. obs. 480. (a) (In hemisphaerio sinistro et ipsa substantia corticali et medullari copiosa lymphæ crassa et mucosa. — Baader.)

Morgagni l. c. Epist. IX. §. 2. — Valsalva.

— — — §. 3. — Gavassetti.

Rhoetus, in Philos. Transact. n. 315. et 399.

Riverii opera medica. Genevae 1737. fol. p. 473.

f) *Ventriculi cerebri.*

Baumer diss. cit. p. 15. (sero repleti.)

Blancardi anat. pract. Cent. II. obs. 63. (Compressi sine cavitate obvia.)

Bontii (Jac.) Observat. select. ex dissectione cadaverum et autopsia descriptae. Amstelod. 1694. 8. (Materia viscida repleti.)

Harder (J. J.) Apiarium etc. Basil. 1687. 4. p. 55. (In cadavere epileptici simul comatosi cerebri ventriculi aqua pleni.)

- Lientaud l. c. p. 375. obs. 217. (colluvie aquosa repleti. — *Diarium medicum.*)
- — — p. 381. obs. 235. (valde compressi sibi que invicem superjacentes sine ulla manifesta cavitate. — Bartholinus.)
- — — — obs. 236. (fero pleni. — Valsalva.)
- — — p. 394. obs. 280. (Sanguine coagulato. — Spohnius.)
- — — p. 395. obs. 282. — — — —
- — — p. 425. obs. 398. (humore aqueo limpidissimo scatentes. — Bonetus.)
- — — p. 430. obs. 414. (aqua pleni. — Mangold.)
- — — p. 439. obs. 448. (— — — Bonetus.)
- — — p. 440. obs. 459. (— — — — —)
- — — p. 443. obs. 469. (fero pleni. — Morgagni.)
- — — p. 444. obs. 470. (a) (— — — Baader.)
- — — p. 445. obs. 473. (lymphæ subflavæ pleni. — Drelincourt.)
- — — p. 448. obs. 480. (a) (paucæ aquæ. — Baader.)
- — — — obs. 481. (a) (aqua scatentes. — Fournier.)
- — — p. 450. obs. 491. (magna viscidæ materiæ et adipis quasi æmulæ copia. — Borellus.)
- Marquissius, in Zodiac. med. gall. 1682. (in cadavere epileptici apoplectice demortui sanguis in ventriculos cerebri effusus.)
- Rhodus obs. med. Cent. I. obs. 49. (fero pleni.)
- Rhoetus l. c. n. 315. (aqua pleni.)
- Riverii oper. omn. p. 473. (aqua pleni.)
- Sauvages l. c. p. 107. (fero repleti.)
- Schenk obs. med. Lib. I. obs. 122. (fero repleti.)

f. æ) *Ventriculi laterales.*

- Bang Auswahl aus d. Tageb. d. Friedr. Krankenh. zu Kopenhagen. Vol. I. p. 129. (parum feri in ventriculo dextro.)
- Greding l. c. p. 310. (E XXVI. epileptico-furiös IX., quibus ventriculi laterales nimis parvi, breves, angusti, nullam aquam continentés.)

E XX. epilepticis IV., quibus angusti parvi brevésque.

In IV. epileptico-furiosis dexter ventriculus major sinistro esse videtur.

E XVI. epileptico-furiosis XIII., quorum ventriculi turgescentes ab aqua pellucida, et V., quorum ventriculi modice hacce aqua erant repleti.

E XVI. epileptico-fatuis III., quorum ventriculi vacui reperiuntur; IV., quorum dexter vacuus et sinister aqua modice repletus. In alio quodam dexter modice plenus et sinister vacuus.

E XX. epilepticis IX., quorum ventriculi aquae copiam continebant. In II. modice pleni, in I. vacui. In IV. dexter vacuus, sinister modice hacce aqua repletus.)

Greding l. c. p. 315. (E XXIII. epileptico-furiosis XVII., quorum ventriculi permultas magnasque continebant hydatides.

E XIII. epileptico-fatuis VI., quorum ventriculi parciorem, II. permagnam et caeteri modicam hydatidum copiam ostendebant.)

Lieutaud l. c. p. 359. obs. 167. (Maxima aquae copia in lateralibus ventriculis. — Act. Londinensia.)

— — — p. 361. obs. 172. (Sinister aqua scatens. — Miscell. curios.)

— — — p. 376. obs. 221. (Corpus glandulosum fabae magnitudinem aequans in substantia corporis striati dextri. — Act. Paris.)

— — — p. 392. obs. 272. (Ventriculi laterales sanguine conrumato turgescentes. — Act. Lipsiensia.)

— — — p. 425. obs. 399. (Serosa, acri et flavesciente coluvie distenti. — Drelincourt.)

— — — p. 440. obs. 454. (Sinister nigricans laticem subviridem recondens. — Bonetus.)

Pew Skizzen aus d. Heilkunde. p. 39. (In dextro 3 iiij. fluidi pellucidi, in sinistro feri sanguinolenti 3 j.)

Rhodius Obs. med. Cent. I. obs. 55. (Tumor in ventriculis lateralibus.)

Schroek, in Comm. litt. noric. 1750. p. 165. (Polypi in sinistro.)

f. β) *Ventriculus tertius.*

Greding l. c. p. 316. (E XXVI. epileptico-furiosis VIII., quorum excedente modo brevis.

E XVI. epileptico-fatuis III., quorum nimis angustus; IV., quorum tali modo atque irregulariter triangularis, ut in regione infundibuli solito angustior et ad posteriorem partem nimis latus observaretur.

E XX. epilepticis in III. nimis latus; in nemine ex his solito angustior.

E XXVI. epileptico-furiosis in omnibus aqua copiosissima repletus. E XVI. epileptico-fatuis in IV. aqua plenarie scatens. In III. modice plenus et in caeteris perpauca aqua repletus. E XX. epilepticis in VI. abunde, in III. modice et in caeteris perpauca aqua repletus.)

g) *Glandula pituitaria.*

Boulet, in Pouppé Desportes Histoire des maladies de St. Domingue. à Paris 1770. Tom. II. p. 209. (ad ovi magnitudinem distenta, fungosa, ad tertiam partem pure repleta folliculoque inclusa.)

NB. Sic citat Greding l. c. p. 282. huncce locum de glandula pituitaria. In Commentar. Lipsiens. T. XVIII. autem hancce observationem de glandula pineali narratam invenies. Deficiente mihi ipsius auctoris libro gallico, hocce discrimen auferre non possum. Sed de pituitaria factam esse observationem verisimilius mihi videtur. Folliculo eam fuisse inclusam nihil praeternaturale est, quum secundum anatomicorum observationes continuatione durae matris involuta sit glandula pituitaria.

Greding. l. c. p. 328. (In XV. e XII. epileptico-furiosis solitae magnitudinis, in V. ex his justo major.

In XX. epilepticis solitae magnitudinis.

In IV. e XII. epileptico-fatuis solito minor; in caeteris solitae magnitudinis.

In IX. e XXII. epileptico-furiosis justo durior; in VIII. mollior; in caeteris solitae consistentiae.

In VI.

In VI. e XII. epileptico-fatuis justo durior; in caeteris mollior.

In V. e XX. epilepticis justo durior; in caeteris solitae consistentiae.)

h) *Glandula pinealis.*

Cfr. Günz Pr. de lapillis in glandula pineali inventis. Lipsiae 1753.

Sömmering D. de acervulo cerebri. Moguntiae 1785.

— — — Hirn- und Nervenlehre. p. 43.

(Acervulos in glandula pineali passim inventos ad consuetam cerebri structuram pertinere et quoque in homine aetatem XIV. annorum superante inveniri. Sic quoque G. J. Wolf in Diss. sist. quaestiones medicas varii argumenti. Harderovici, 1791.)

Mayer Beschreib. d. menschl. Körpers. B. VI. p. 169. (huic sententiae fere assentiens contendit, in statu corporis humani aegroto in majori tamen quantitate reperiri.)

* * *

Greding l. c. p. 318. squ. (In VIII. e XXVI. epileptico-furiosis circa ima erat collocata.

In VII. e XVI. epileptico-fatuis et in X. e XX. epilepticis ob aquae copiam non erat detegenda.

In VIII. e XXVI. epileptico-furiosis oblongam linearemque exhibuit figuram; in caeteris ex his solitam.

In II. e XVI. epileptico-fatuis solitam magnitudinem excedit; in IV. ex his nimis parva erat et in caeteris solitae magnitudinis.

In XX. epilepticis solitae magnitudinis erat.

In IV. e XVI. epileptico-fatuis molliem nimiam; in III. ex his duritiem excedentem et in V. e XX. epilepticis molliem nimiam ostendebat.

In III. e XXVI. epileptico-furiosis lapillus major; in V. lapillus modicae magnitudinis hispidusque; in IV. Acervuli.

In III. e XVI. epileptico-fatuis lapillus.

In IV. e XX. epilepticis lapillus; in III. ex his acervuli XX—XXX.)

i) *Cerc-*

i) *Cerebelli massa.*α) *Iusto durior.*

Lieutaud l. c. p. 443. obs. 469. — Morgagni.

β) *Iusto mollior et aquosa.*

Greding l. c. p. 325.

(In XIV. e XXVI. epileptico-furiosis.

In V. e XXIV. epileptico-fatuis.

In omnibus quoque XX. epilepticis.)

k) *Medulla oblongata.*

Lieutaud l. c. p. 357. obs. 160. (In parte anteriore medullae oblongatae color e flavo nigricans, cum mollitie praeternaturali, adeo ut semicorrupta apparuerit. — Morgagni.)

l) *Ventriculus quartus.*

Greding l. c. p. 326. (In permultis e XXVI. epileptico-furiosis turgescens ab aqua; in IV. modice plenus; in V. distentus quidem, sed vacuus.

In VI. e XVI. epileptico-fatuis nimia, in caeteris aut perpauca aut nulla aqua repletus.

In XI. e XX. epilepticis aqua turgescens; in IX. aut nullam aut perpaucam aquam continens.)

S E C T. 2.

Columna vertebralis et medulla spinalis.

Cfr. J. P. Frank Orat. acad. de vertebralis columnae in morbis dignitate. vid. Ej. Delect. opusc. med. Vol. XI. Ticini 1792.

*

*

*

Bonet Sepulchr. anat. T. I. p. 277. (aqua in sacra fistula.)

— — — p. 329. (caries vertebrarum medullam spinalem vellicans.)

Rhodius obs. med. Cent. I. obs. 49. (Cavitates medullae spinalis fero acri repletae.)

S E C T.

S E C T. 3.

Nervi.

Ant. de Haen ratio medend. P. V. ed. secunda. Vienn. 1763. p. 117.
(Nodus durus nervo phrenico in medio suo itinere arcte circumcretus, aliusque similis illi, ejus loco, ubi in diaphragma abiturus erat, cum thalamis nervorum opticorum emarcidis.)

S E C T. 4.

Vasa sanguifera.

Sauvages l. c. p. 107. (parum cruoris in vasis invenit.)

a) Arteriae.

Johnson Medical Observat. Vol. II. p. 115. (Sanguinem in defunctis epilepticis nonnisi in arteriis deprehendi.)

Musgrave Speculations and Conjectures on the qualities of the nerves. Sect. I. (idem observavit.)

β) Venae.

Lieutaud l. c. p. 392. obs. 272. (Ramuli jugularium internarum humore quodam crassiore obstructi et variis corporibus glandulosis compressi. — Act. Lipsienfis.)

— — — p. 394. obs. 280. (Rami jugularium internarum indurati et humore glutinoso exsiccatō obstructi. — Sponius.)

S E C T. 5.

Thorax.

a) Musculi et membrana adiposa.

Greding l. c. p. 333.

(In V. e XXVI. epileptico-furiosis } musculi emarcidi putrescentes.)
(In III. e XVI. epileptico-fatuis }

b) Costae.

Greding l. c. p. 334.

(In XIII. e XXVI. epileptico-furiosis }
(In VIII. e XVI. epileptico-fatuis } molles et flexibiles.)
(In XI. e XX. epilepticis }

c) Pleu-

c) *Pleura.*

Greting l. c. p. 335.

(In VII. ex XXVI. epil. furios. in latere sinistro	}	pulmonibus fir-
In XIV. — — — — dextro		
In III. ex XVI. epil. fat. in latere sinistro	}	modice.
In VI. — — — in utroque latere		
In IV. ex XX. epilept. in latere dextro	}	modice.
In V. — — — in utroque latere		
In IV. — — — — — — —		firmissime.)

d) *Cavitas thoracis.*

Greting l. c. p. 337.

(In IX. ex XXVI. epil. furiosis	}	aquae circiter ℥j. — ℥j℞.
In X. ex XVI. epil. fatuis		
In VIII. ex XX. epilepticis		

Lieutaud l. c. p. 430. obs. 414. (aquae copia thoracem replens. — Mangolt.)

e) *Pulmones.*

Bonet Sepulchr. anat. L. I. Sect. XII. obs. 34. (lobus dexter niger instar atramenti.)

E. N. C. Dec. II. ann. X. obs. 20. (Vesicae grandes in pulmonibus.)

Greting l. c. p. 339.

(In VI. ex XXVI. epil. furios. in utroque latere	}	pulmones scir-		
In V. ex XVI. epil. fat. — — —			rhosi indu-	
In XI. ex XX. epilepticis — — —			rati.)	
— — — p. 340.				
(In V. ex XXVI. epil. furios. in latere sinistro	}	purulenti lace-		
In III. ex XVI. epil. fatuis — — dextro			rati.)	
In VII. ex XX. epilepticis in utroque latere				
— — — p. 341.				
(In IX. ex XXVI. epilept. furios. in utroque latere	}	flaccidi		
In II. ex XVI. epil. fatuis in latere sinistro			membrana-	
In X. — — — in utroque latere				cei.)
In VII. ex XX. epilepticis — — —				

Gre-

Greding l. c. p. 342.

(In VI. e XXVI. epil. furios. in utroque latere magna copia sanguinis nigrescentis spumosi.

In VII. — — — in utroque latere magna copia sanguinis fluidi non spumosi.

In IV. e XVI. epilept. fatuis in utroque latere aquae feculentae et pituitae copia.

In III. — — — praesertim in lobulis inferioribus copia sanguinis nigri sebacei.

In VII. e XX. epilepticis in utroque latere copia sanguinis nigri sebacei.

In V. — — — in utroque latere fluidum tenue feculentum sanguinem aemulans.)

Lientaud l. c. p. 448. obs. 480. (Pulmones purulenti costis adhaerentes. — Baader.)

Vieussens (Raim. de) Histoire des maladies internes. Oeuvre posthume. à Toulouse 1714. 4. p. 113. (dura corpora in pulmonibus.)

f) *Pericardium.*

Cappel (G. F.) observat. anatom. Dec. I. Helmstad. 1783. 4. p. 15. (Pericardium cordi firmiter adhaerens. Nullus inter cor et pericardium humor.)

Greding l. c. p. 343.

(In II. epilepticis cum totius cordis et utriusque auriculae superficie plenarie concretum.

In XII. e XXVI. epilept. furios. modica.

In XIV. — — — nimia

In III. e XVI. epil. fatuis perpauca

In VI. — — — modica

In VII. — — — nimia et quidem in IV. ex his rubra cruenta

In IX. e XX. epilepticis perpauca

In III. — — — modica cruenta

In VIII. — — — nimia

} aqua in pericardio.)

Lieutaud l. c. p. 430. obs. 414. (aqua in pericardio. — Mangold.)
 — — — p. 448. obs. 480. (a) (— — — Baader.)

g) *Cor.*

Greding l. c. p. 345.

(In XII. e XXVI. epileptico - furiosis solitae magnitudinis

In IX. — — — justo majus.

In V. — — — justo minus.

In IX. e XVI. epil. fatuis solitae magnitudinis.

In V. — — — justo majus.

In III. — — — justo minus.

In XII. e XX. epilepticis solitae magnitudinis.

In III. — — — justo majus.

In V. — — — justo minus.)

— — — p. 346.

(In XII. e XXVI. epil. furiosis

In XI. e XVI. epil. fatuis

In nemine e XX. epilepticis

} flaccidum et relaxatum.)

— — — p. 348.

(In XIV. e XXVI. epilept. furiosis

In III. e XVI. epilept. fatuis

In X. e XX. epilepticis

} adipe obvolutum.)

Pew mediz. Skizzen. p. 38. (Cor dilatatum.)

W. G. M. B. in Philos. Transact. T. XIV. n. 157. (mirifice dilatatum.)

*) *Ventriculi cordis.*

Greding l. c. p. 348.

(In VI. epil. furiosis

In III. epilepticis

In IV. epil. furiosis

In II. epil. fatuis

} uterque vacuus.

} sinister vacuus.

In VI. e XXVI. epil. furiosis sanguis tenuis aquosus in utroque.

In VII. — — — polypi adiposi in utroque.

In VIII. — — — sanguis nigrescens sebaceus in
 dextro.

In III. e XVI. epil. fatuis nihil in utroque.

In IV.

In IV. e XVI. epil. fatuis sanguis tenuis aquosus in dextro, sinistro vacuo.

In V. — — — polypi adiposi in utroque.

In II. — — — — — in dextro.

In II. — — — sanguis tenuis aquosus in utroque.

In III. e XX. epilepticis uterque vacuus.

In IV. — — — in utroque polypi adiposi et in dextro sanguis spissus sebaceus.

In VII. — — — in utroque sanguis spissus sebaceus et in II. ex his polypi adiposi.

In VI. — — — in sinistro sanguis spissus nigrescens; in dextro polypi grandes adiposi.)

Medical observations and Inquiries. Vol. II. (Ventriculus cordis sinister ruptus.)

W. G. M. B. in Philos. Transact. T. XIV. n. 157. De polypo in corde viri epileptici, icterici, anhelosi, palpitationibus cordis infestati, reperto. (Polypus in dextri ventriculi apice, radicans, ramosus, in venam cavam protensus usque in jugulares, fibrosus, velamento obductus proprio.)

β) *Auriculae cordis.*

Greding l. c. p. 350.

(In X. epil. furiosis polypi veri in sinistra.

In VIII. epilepticis polypi adiposi in utraque.)

h) *Diaphragma.*

Bonet Sepulchr. anat. Lib. I. Sect. XII. obs. 24. (Ulcus diaphragma rodens.)

S E C T. 6.

Abdomen.

Cfr. P. II. Cap. IV. Sect. X.

a) *Omentum.*

Licutaud l. c. p. 430. obs. 414. (putridum. — Mangold.)

b) *Ventriculus.*

Bertram (A. G.) D. de spasmo ex inanitione conjecturae. Halae 1781. (vasorum infarctus in ventriculo.)

- Delii (H. F.) amoenit. med. Dec. V. in praefat. Lipsiae 1745. 8.
 (foramen magnitudine floreni orisque callosis prope pylorum.)
 Morgagni l. c. Epist. LXII. art. 2. (Ventriculus inflammatus.)
 Sauvages l. c. p. 105. (maculae exiguae rubrae in tunica villosa.)
 Sorbait (Paul. de) universa medicina. Norimberg. 1672. fol. p. 85.
 (Ventriculus erosus et perforatus.)

c) *Hepar.*

- Bertram (A. G.) diff. cit. (duris tuberculis oblitum.)
 Lieutaud l. c. p. 430. obs. 414. (duplo majus, quam naturâ esse
 debet. — Mangold.)

d) *Vesicula fellea.*

- E. N. C. Dec. II. Ann. VII. obs. 23. (Pori biliarii calcarea materia
 obducti.)

e) *Lien.*

- Bonnet Sepulchr. anat. Lib. I. Sect. XII. obs. 42. (scirrhum flavidi
 coloris.)
 Lieutaud l. c. p. 430. obs. 414. (ingens. — Mangold.)
 Miscell. Nat. Curios. Dec. I. Ann. VI. p. 177. (induratum.)

f) *Mesenterium.*

- Lieutaud l. c. p. 430. obs. 414. (putrescens. — Mangold.)
 Sauvages l. c. p. 107. (glandulae mesenterii tumidae.)

g) *Intestina.*

- Bertram, in diff. cit. (Ascaris lumbricoides vivens in duodeno.)
 Bresl. Samml. April, 1720. p. 445. (Ilei intus susceptio.)
 — — — 1721. p. 413. (nummus argenteus deglutitus
 in valvula coli haerens.)
 — — — 1725. p. 421. (carnosum concrementum in
 intestinis.)
 E. N. C. Dec. II. Ann. II. obs. 152. Schol. (Globuli pingues inte-
 stinis adhaerentes.)
 Harder Apiarium. Basil. 1687. 4. obs. 99. (Intestina tenuia erosa.)
 Lieutaud l. c. p. 430. obs. 414. (vermibus scatentia. — Mangold.)
 Pechlin Observ. med. L. II. obs. 29. (valde distenta.)

h) *Re-*

h) *Renes.*

Bartholin Histor. anat. Cent. V. hist. 61. (Calculi in renibus.)

Brendel Opusc. med. T. I. p. 59. (Calc. in renib.)

E. N. C. Dec. II. Ann. X. obs. 20. (Calc. in renib.)

La Motte Traité de chirurgie, T. II. p. 419. (Calc. in renib.)

i) *Urethres.*

Brendel l. c. p. 59. (Calculi in dextro.)

k) *Vesica urinaria.*

Zacut. Lusitan. prax. L. VII. obs. 6. (grummosus sanguis in collo vesicae retentus.)

l) *Genitalia.*

Zacut. Lusitan. l. c. l. II. obs. 119. (Semen corruptum in vasis deferentibus congestum.)

APPENDIX II.

De Aura sic dicta epileptica.

§. I.

Hocce nomine insignita est ista hic inde observata major minorve sensatio vaporis praesertim frigidi in omni quadam corporis praeter caput parte sese commoventis et sere semper ad caput ascendentis, unicuique paroxysmo epileptico praesagii instar antecedens. Hoc symptoma antesignanum epilepticae proprium singularemque attentionem demerens multifario modo sese offert observatori. Alii hanc sensationem quasi ab afflante aura frigida productam; alii vaporis frigido similem aut pruritum ceu formicarum reptationem sensum emergentem; alii frigidae undae versus caput fluctuationem imitantem; saepe etiam nonnisi sursum factam motitationem quamdam absque sensu peculiari observasse asserunt. Ipsae vero hae sensationes plerumque ex eo corporis loco, cui epilepticae causa materialis verisimiliter inhaeret, exsurgunt, et, quando ad caput devenerint, ipse morbus cum sensuum mentisque interceptione et membrorum convulsionibus aegros invadit. Plerumque, et quidem secundum plurimum scriptorum observata, nervorum ad cerebrum tendentium viam sequuntur, etsi Cl. Cullen (v. Ej.

An-

Anfangsgr. der Arzneiw. Th. III. p. 167.), eas hanc praecipue eligere viam, neget et plerumque nonnisi per cutem progredi contendat. Quam ob rem varii jam dudum bono interdum successu tentavere, vel instituta illius partis, unde ista antesignana ortum trahit aura, compressione, vel ligatura; vel applicatis causticis et ustionibus, aut adhibito fenticulo aut causae materialis plenaria exstirpatione, ipsius denique nervi discissione avertere paroxysmum, quin ipsi tandem malo imponere finem.

§. II.

Praemissa nunc hujus symptomatis descriptione secundum clarissimorum scriptorum observata, liceat mihi quaedam enarrare observata, quae mecum meus, dum inter vivos erat, Fautor atque Amicus pie colendus, beat. Rehfeldt, Sacr. Majest. Sueciae Archiater atque in Academia Gryphica artis medicae Professor experientissimus, ex sua sat satis vaga experientia benigne communicavit. Observavit nempe ille vir, animi ac eruditionis praestantia clarus: aegrotos taliter affectos tunc tantum hujus aerae ad caput usque ascensum sensu quasi prosequi posse et hujus sensationis usque ad aggressum ad caput sibi conscios fuisse, si aura illa e quodam superiorum extremitatum loco sit orta: Si autem ex quodam abdominis aut inferiorum extremitatum loco ortum duxerit, ejus ascensionem tantum usque ad diaphragmatis regionem aut sic dictum cordis serobiculum ab aegro esse perceptam.

Porro Cl. ille Vir mecum communicavit, a quibusdam hysterico-epilepticis, chloroticis, gracilisque structurae hancce auram plus minusve, ut aiebant. calidam esse perceptam et quidem ab una ex illis aspersioni gutta-ram aquae fervidae sursum currentium aequantem esse descriptam.

§. III.

Praelustranti mihi tantam copiam librorum, de epilepsia tractantium, mirum saepius videbatur, quod de hoc antiquitus jam cognito, saepius ventilato, non raro et certe memoratu ac contemplatione dignissimo sympto-mate tam pauca minusque accurata in iis relictis inveniantur observata. Plurimi eam quidem et ejus cursum ascensorium describunt, de ejus causa singularique natura autem nulla habentes. Ipse Cl. Tiffot (l. c. p. 167.) perpauca et Cl. Greding (certe omni laude memorandus epilepsiae obser-vator) nihil hac de re commemorarunt. Sed et mihi ex propria experientia quae-

quaedam asserere non licitum sit, ideoque sufficiat, quaedam veterum et recentiorum de hoc symptomate commenta, casus variis e scriptoribus collectos et illa denique ex therapeuticis adminiculis desumpta ad auram epilepticam respicientia in medium proferre.

§. IV.

Jam Pelops, Galeni praeceptor, de epilepsia docuit: ejus somitem saepius existere in alia praeter caput parte et morbum ipsum aut per continuationem partis aut flatuosam per substantiam (πνευματικὴν τινὰ ὥσπερ αἶθρα) transmitti.

Galen. de loc. affect. L. III.

Galenus (in loc. cit.) statuit humorem morbificum aliunde ad caput ascendentem. En! prima apud veteres vestigia sic dictae aurae epilepticae, quae autem saepius in epilepticis diversimode observata omnem veterum attentionem omnino excitavit, ideoque illos in falsam illam induxit opinionem, epilepsiam semper ab aura quadam trahere ortum. Et quum plurimi scriptores medii aevi, nec non seculi XVI. et XVII. Galenicis et veterum sententiis proprias superstruxerint, facile dijudicamus, unde veniat, quod tanta copia definitionum epilepsiae et ejus causae proximae contineat aurae aut vaporis ideam.

Vid. Part. II. Cap. I. et III. (Definitiones Donati, Foresti, Fuhrmanni, Heurnii, Horstii, Langelotti, Michaelis et Sennerti.)

Exinde quoque certius mihi evadit, Coelleri, Helmontii aliorumque sententias de archeo ut epilepsiae causa ortas esse.

§. V.

Erant autem alii, qui istae opinioni (auram aut vaporem semper esse epilepsiae causam) firmiter oppugnabant, omnem fere epilepsiae ortum ex extremitatibus negantes, ex quibus nominasse sufficiat:

Moor (Barthol. de) Patholog. cerebr. p. 423.

Piso (Carol.) de morb. a colluv. ferof. p. 140.

Thoneri (Augustin.) de admirandis convulsivis motibus. Lib. IV.

Ulm. 1651. 4. p. 90.

Willis (Thom.) de morb. convulsivis. passim.

§. VI.

§. VI.

Ex recentioribus praecipue Cel. Cullen et Cel. Rahn etfi per pauca, quaedam tamen de hac materia commemorarunt. Quae Cl. Cullen in medium profert. praecipue adminicula therapeutica, v. c. ligaturam et cauterisationem, respiciunt.

v. Cullen Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. p. 166. et 174.

Cel. Rahn sequentes vias. in quibus prodicitur aura epileptica, distinguit:

- 1) Causa occasionalis paroxysmi epileptici, ipsi loco, ubi praeviae istae sensationes percipiuntur, inhaeret.
- 2) Causa occasionalis in alio quidem loco subest; is vero, ubi sensationes istae praecedunt, ad reliquas systematis sentientis atque irritabilis partes (quibus nixitur consensus) ita sese habet, ut nonnisi ejus intercedente mutatione a causa ista occasionali (alibi latente) proxima epilepsiae causa enasci queat.

v. Rahn Briefwechsel mit seinen einmalig. Schülern. Samml. I. Zürich 1787. p. 524 — 527.

Cel. Junker tertium denique casum sequenti ratione constituendum esse putat:

Causa occasionalis loco, quem dictae sensationes tenent. neque inhaeret, neque, ut malum (proximam scilicet epilepsiae causam) inducat, intercedente istius loci mutatione (ligatura etc. alias praecavenda) eget.

v. J. C. G. Junker Conspect. rerum. quae in pathologia medicinali pertractantur. Vol. II. Halae 1790. p. 70.

§. VII.

Relatis nunc iis, quae mihi de hujus symptomatis descriptione et theoretica magis contemplatione extitere, superest, ut casus hocce symptoma respicientes hinc inde repertos lectoribus denotem.

Alexand. Trallian. L. I. cap. 15. (aura a planta pedis ascendens.)

A. N. C. Cent. I. obs. 80. (a pede assurgens.)

— — — obs. 85. (ex brachio.)

— — Vol. VIII. obs. 13. (e manu.)

Bang, in Act. Societ. med. Havn. T. I.

Bartholin L. c. Cent. VI. histor. 78. (ex pede.)

- Binninger obs. med. Cent. II. obs. 16. (e pollice pedis.)
- Bonet Sepulchr. anat. T. I. p. 291. (Pruritus reptantium formicarum instar in regione inguinali sinistra cum intumescencia in hacce regione ad plantam pedis descendens, tunc subito ad caput assurgens et paroxysmum producens.)
- Borelli Observat. med. Cent. II. obs. 95. (a pollice pedis.)
- Burnet Thesaurus medic. pract. Genevae 1676. 12. T. II. p. 463. (a crure.)
- Cardani (Hieron.) opp. omni. T. X. Tract. de epilepsia.
- Decker praxis Barbettiana. Lugdun. 1669. 12. p. 13. (a pollice pedis.)
- — — p. 15. (ex hypochondrio.)
- — — — (e pollice manus sinistrae.)
- Donati (Marcell.) de histor. med. mirab. L. II. p. 146 et 147. (plures veterum observationes compilavit.)
- Dovinetus, v. Schenk l. c. p. 118. (pruritus labii superioris ascendens.)
- E. N. C. Dec. I. Ann. I. obs. 85. (ex hypochondriis.)
- — — Ann. III. obs. 336. (e brachio.)
- — Dec. II. Ann. I. obs. 161. (e pollice pedis.)
- — — Ann. IX. p. 459.
- — — Ann. X. obs. 20.
- Epiphanii (Ferd.) Centum historiae. Venet. 1611. fol. histor. 24.
- Fernelii Patholog. L. V. cap. 3. (e summo vertice.)
- Galen. de loc. affect. L. III. cap. 11. (a femore.)
- Gilibert (J. E.) Samml. pract. Beob. und Krankengesch. aus d. Lat. von E. B. G. Hebenstreit. Leipzig 1792. p. 275. (a pede iniens.)
- Grübel (J. G.), in E. N. C. Dec. II. Ann. VIII. obs. 36. (a digito ascendens.)
- Hagendorn l. c. Cent. I. histor. 6. (a pollice pedis.)
- Heer (ab) observ. med. p. 275. (a pedis pollice.)
- Helwig (J.) observ. posth. med. physic. edit. a Luc. Schroekio. August. Vindelic. 1680. 4. p. 135. (a lumbis ascendens.)
- Herbert, vid. Comm. Lipsienf. Vol. IV. p. 233. (a pollice pedis.)
- Hoechstætter l. c. Dec. IV. cas. 7. (e sinistra manu.)

- Holleri (Jacob.) de morbis internis L. II. Paris. 1565. (a liene vapor, inde, quando praecordia attigerat, epilepsia.)
- Loeffler Beiträge zur Arzn. u. Wundarzneiwissenschaft. Th. I. Leipz. u. Altona 1791. v. Richter chir. Bibl. B. XII. p. 327. (a planta pedis ad caput ascendens.)
- Mangor (C. E.), in Act. Soc. med. Havn. Vol. II. Havniae 1791. 3. pag. 452.
- Merklin (G. A.), in E. N. C. Dec. I. Ann. VI. VII. obs. 77. (In exigua quadam operatione in hallucine peracta ortus paroxysmus epilepticus saepe recurrens cum sensu aurae a loco operationis ascendens, quae labi cogebat aegrum, quam primum frontem attigerat.)
- Pelargi medic. Jahrgänge. Th. III. p. 671.
- Pew l. c. p. 44. (a pede ad caput ascendens.)
- Pfündel, in Hufeland Journal. B. II. St. II. p. 279. (a pede orta ad abdomen ascendens, deinde concomitante cordis palpitatione instar aquae fervidae ad caput assurgens. Ligatura supra genu applicata semper impedivit paroxysmum. Observavit autem aeger, se exinde majorem debilitatem percepisse, quam si ipsum perperius fuit paroxysmum.)
- Plater (Fel.) Observat. select. p. 470. (a pede cum tremore pedis sensum ascendens.)
- Raulin Traité des affections vaporeuses. p. 43. (a planta pedis.)
- Rhodius l. c. Cent. I. obs. 57. (ex pollice dextr. manus.)
- Salmuth Observat. Cent. I. obs. 90. (a crure.)
- Schellhammer, in E. N. C. Dec. II. Ann. VII. obs. 197. (aura ante paroxysmum a cerebro ad brachium descendens.)
- Schenk l. c. p. 119. (a dorso pedis usque ad praecordia.)
- Schulz de Cinnabari. p. 136. (a pollice pedis.)
- Short (Thom.), in Edinb. Versuch. B. IV. p. 334. (a loco quodam pedis, in quo deinde concrementum detegebatur cartilagineum pisiforme, quo exciso aegrota ab epilepsia liberata est.)
- Tiffot l. c. p. 89—100.
- Tulpil Observat. med. Lib. I. cas. 9. (a sinistra regione abdominis.)
- — — cas. 10. (a vulva.)

Tul-

Tulp.ii Observat. med. L. IV. cas. 2. (a pollice pedis.)

Zacut. Lusitan. Prax. admirand. L. I. obs. 22. (ex pollice manus.)

§. VIII.

Quae ex therapeutica cultri chirurgici, cauterii, ligaturae et ustionis administratione ad illustrandam hancce materiam nobis extant, sequentia praecipue exhibent momenta, quorum documenta sub quovis congruo articulo in catalogo medicamentorum invenies.

- 1) Epilepsia sic dicta pedisympomatica saepius per destructionem ejus partis, ex qua ea aura ascendit, excisionis, ustionis aut cauterii ope est sanata.
- 2) Partium vicinarum situ aut aliis circumstantiis, hujus loci plenariam destructionem impedientibus, saepius jam vesicatorii aut fonticuli ad hunc locum applicatio morbum aut plane sustulit aut imminuit.
- 3) Aura ista ascensorium nervi cujusdam cursum comitante, transcisio hujus nervi optimum interdum praebuit effectum.
- 4) Ligatura sat satis firma, non procul supra originem aerae applicata repetitaque, saepius epilepsiam plenarie sustulit, saepissime hujus morbi paroxysmos magnopere debilitavit.
- 5) Impedito quidem per hancce ligaturam epilepsiae paroxysmo saepius tamen in parte infra ligaturam tantae excitatae sunt convulsionis partiales dolorificae, ut istas ne vix quidem tolerare posset aegrotus, sed ligaturae potius desideraret solutionem.
- 6) Quod omnium medicamentorum fors est, et haec therapeutica adminicula a quibusdam artis medicae peritis incassum sunt tentata.

APPENDIX III.

Veterum et recentiorum sententiae de lunae astrorumque influxu in epilepsiam.

§. I.

Cuivis medico de artis nostrae historia bene versato laud aliena erunt astrologica veterum commenta, quibus deinde saeculum nostrum esse expurgatum merito gaudemus. Sana experientia nullo modo illa probante, pertinent nunc ista ad haeresees litterarias, quorum affectum hodie se profitetur facile nemo. A veteribus autem tanti momenti in epilepsiam habebatur astrorum influxus, ut hancece ob causam epilepsiam nuncuparent morbum astralem aut fideratum.

v. Paracelsus de morbo caduco. L. III. §. 3.

Storch von den Kinderkrankh. B. II. p. 68.

Putabatur enim omnino morbus ab astrorum conjunctione dependens.

v. Benedicti (Alexandr.) de omnium a capite ad calcem morborum causis Libr. XXX. Venetiis 1533. fol. p. 113.

Fludd (Rob.) de Astrologia L. VII. de Macrocosmo Tr. II. Part. X. Francofurt. 1624. p. 79.

Forest. (Petr.) Observation. Lib. X. obs. 60.

Gabuccini (Hieron.) Lib. III. de morbo comitiali. Venetiis 1561. passim.

Hartmann Introd. in philos. vitalem. p. 19. et 32.

Juvellina (B. C. a) Tract. astrolog. ad medicinam pertinens. Venetiis 1666. 4. p. 133.

Sic et Mercurio praecipuam tribuit vim huic morbo regnandi auctor quidam, scientiam nobis plane tradens astrologicam, scil.

Ganivetus, in libro, cui titulus est: Amicus Medicorum. Francof. 1614. p. 266.

§. II.

In morbi hujus medela non negligendam esse astrorum contemplationem, veteres putarunt, e. g.

Camerarii Memorab. Cent. VIII. part. 64. (Antiepileptica rectius postero

postero die, quam hora conjunctionum luminarium esse propinanda.)

Theophrast. Paracelsus de morbo caduco. p. 602. (Viscum adhibendum esse ascendente astro.)

§. III.

Relictis vero hisce, quae in pathologica et therapeutica hujus morbi consideratione nullius momenti hodie habebantur, transeam ad illa, quae de lunae in epilepsiam influxu apud varios extant auctores. Veteres quoque et lunae nimiam tribuisse vim et perpauca vera innumeris falsis fabulosisque mixta, nobis tradidisse, minime est negandum. Interea quoque ad hunc usque diem hisce observatis aliquid veri inesse omnino videtur, nec plane negligendam esse justam in lunae phases morborumque quorundam periodos attentionem.

Cfr. Treatise on sol-lunar influence in fevers etc. by Fr. Balfour. Second Edition. London 1795. 8.

Tota haecce doctrina ad solam experientiam est reducenda, quum nudum ratiocinium hic fere nihil efficiat. Sola analogiae via ingredientibus pauxillum lucis nobis detegere licet. Luna nempe, quae maris fluxum et refluxum certe efficere habebatur, aequali vi paribusque viis agere potest, uti in reliquam terrae superficiem ejusque atmosphaeram ac tempestatis mutationes, ita quoque in ea, quae in terra crescunt, nec non in animantia, quae iis strictissimo vinculo sunt conjuncta.

De actione lunae in maris fluxum et refluxum

cfr. Gehler (J. S. T.) physical. Wörterb. Th. I. Leipzig 1787. 8.
Artikel: Ebbe.

De imperio lunae in tempestatum mutationes conferas, quae indefesso studio ex propria et fida observatione per L. annos collecta dedit Cel. Toaldo in libro, cui titulus:

Della vera influenza degli astri nelle stagioni et mutazioni del tempo.
Saggio meteorologico di Giuseppe Toaldo, in Padova
1770. 4.

§. IV.

§. IV.

Nec raro quidem epilepsiae paroxysmi periodice circa novilunium et plenilunium redeunt observantur et quidem in ea praecipue epilepsiae specie, quae aut ex verminosa quadam corporis constitutione et mensium anomalia est derivanda, aut quae iis quodam modo juncta sese nobis offert. Hocce phaenomenon jam antiquitus sat satis observatum veterum attentionem omnino excitavit, ideoque eorum scripta de epilepsia tractantia lunae in huncce morbum influxum minime omittunt. Tantopere autem astrologicis commentis, nec non fabulosis assueti hypothesebus non possunt non, quin et de hac materia tractantes vera fabulosis commisceant. Quosdam ex iis et recentioribus nominasse sufficiat. e. g.

Alexand. Trallian. l. c. L. l. cap. 15. (Tempore interlunii natos epilepsiae magis obnoxios esse.)

Aretaeus de caus. et sign. morbor. Lib. I. cap. 4. (epilepsiam circa certas lunae phases commoveri.)

Arnoldus a Villanova, in Breviario. p. 1076. (edit. opp. Taur. Basil. 1585. fol.) (epilepsiam tempore lunae dividuae a phlegmate corporis humani, tempore novilunii et plenilunii a sanguine, et tempore lunae decrescantis a melancholia ortum ducere.)

Bartholomaeus Anglicus de proprietatibus rerum. Lib. VII. cap. 9. (Si epilepsia fuerit ex melancholia, in defectu lunae maxime laedere et infestare; si vero ex sanguine et phlegmate, magis in plenilunio sese ostendere.)

Burmester (J. J.) D. de morbo spastico etc. Gotting. 1791. p. 20.

Camerarius (Jo.) Memorab. Cent. II. partic. 38. (epilepsiae novilunii tempore exasperationem declarare studet.)

Galen. de dieb. critic. L. III. (lunam dirigere periodos in epilepticis.)

Helmont (J. B.) oper. omnia. Venet. 1651. fol. (passim.)

Hofmann (Fr.) Institut. L. III. cap. 88. (tempore interlunii natos epilepsiae magis obnoxios esse.)

Jafon a Pratis de cerebri morbis. Basil. 1549. 8. p. 349. (epilepsiam humidam recurrere crescente luna; siccam decresciente luna.)

Mead (R.) de imperio solis et lunae in corpora humana. Londini 1704. 8. (novilunii et plenilunii tempore frequentiores esse epilepsiae paroxysmos.)

Para-

- Paracelsi (Theophr.) oper. omn. T. I. Argentor. 1616. (passim.)
 Riverii (Laz.) Arcana. Venet. 1675. 4. p. 97. (epilepsiam oriri e
 coitu solis et lunae.)
 Rumpelt (C. A. F.) D. f. pathologiam epilepsiae. Lipsiae 1793. 4.
 pag. 39.

§. V.

Gratiores utilioresque sese nobis praebent illi scriptores, qui nuda
 observata de periodicis epilepsiae paroxysmis lunae phasibus congruis nobis
 tradiderunt, ex quibus sequentes denotare mihi licuit:

- A. N. C. Cent. I. p. 137. (periodica lunaris.)
 — — Dec. I. Ann. II. obs. 95. (period. lunar.)
 — — Dec. II. Ann. II. obs. 148. (— — —)
 — — — Ann. III. obs. 40. (— — —)

Bartholin (Thom.) l. jam saepius citat. (puella epileptica maculis
 nonnullis in facie notata, quae secundum mutationes lunae re-
 spectu coloris et ambitus mutatae sunt.)

Burmester (J. J.) Diss. cit. p. 20. (in virgine octodecim annorum
 bis quovis mense in primo nempe et ultimo lunae quadrante par-
 oxysmus.)

Hörnung (Jo.) cista medica. Norimb. 1625. 4. p. 404.

Mead (Rich.) l. c. (plures observationes tradens, puellae mentio-
 nem facit quotidie fere epilepticae, cujus pater, filiae clamore epi-
 leptico noctu expergefactus, in vicino fluvio Thamesi maris sem-
 per observavit refluxum.)

Pitcairn (Archib.) opuscul. med. Roterod. 1714. 4. p. 74.

Plater (Fel.) Observ. Lib. I. p. 19. (diuturna lunatica cum men-
 sium suppressione.)

Stahl (G. E.) Theor. med. pathol. P. II. S. III. p. 683. (periodica
 tempore lunae decrefcentis.)

— — — D. de haereditaria dispositione in varios morbos. Halae
 1706. §. 76. p. 48. (omnia ejusdem familiae membra pubertatis
 tempore paroxysmis epilepticis obnoxia secundum lunae phases
 sese mutantibus.)

§. VI.

§. VI.

Et ad morbi hujus medelam necessaria olim putabatur lunae phaſum accurata confideratio; nec plane omnino ejus influxus interdum tamen, affirmante experientia, in curatione prophylactica et medicamentis adhibendis negligendus nobis quoque videtur.

Borell (Jo.) l. c. Cent. III. obf. 15. (☾. ſtercor. pavon. luna filente.)

Boyle (Rob.) de utilitate natural. philof. P. II. Sect. V. cap. 7. (viſcum quernum circa plenilunium eſſe adhibendum.)

Fuller (Thom.) Pharmacop. extemporan. p. 78. (Electuarium antepil. hoc loco deſcriptum, quotidiano ejus per tres vel quatuor meſes uſu jam finito, tamen per triduum aut quatrimum ante novilunium eſſe repetendum.)

Mead (Rich.) Monita et praecepta Cap. II. Sect. III. p. 37. (eodem modo electuarium ſuum ante novam plenamque lunam propinare jubet.)

Riverius (Laz.) l. c. Cap. III. obf. 15. (☾. ſtercoris pavonis luna filente.)

P A R S III.
M E D I C A M E N T A R I A

EXHIBENS

CATALOGUM ADMINICULORUM TAM PHARMACEU-
TICORUM QUAM CHIRURGICORUM, EPILEPSIAE ME-
DELAM SPECTANTIUM, OLIM HODIEQUE
USITATORUM.

*Libri et Dissertationes, medicamenta adversus epilepsiam
singulatim tractantes.*

- A** Collection of english Medecines experienced against the jaundice, dropfy, stone, falling sickness and pestilence. London 1615.
Henr. a Bra Catalogus medicamentorum simplicium et facile parabilium adversus epilepsiam et quomodo iis utendum sit, brevis institutio. Leuwardiae 1616. 8. Arnheimiae 1693. 8.
Joann. Nicol. Pechlin D. de epilepsia et contra eam remediis. Kilon. 1678.
Aug. Quir. Rivinus D. de remediis antepilepticiis terreis etc. in Ej. Collect. Differt. Lipsiae 1710.
Sam. Teucher D. de remediis antepilepticiis aliis fossilibus, in Ej. Disput. med. collect. Lipsiae 1710.
Abrah. Vater D. de specificorum antepilepticorum, sigillatim olei animalis virtutibus. Vitebergae 1725.
Petr. Samson D. de epilepsia et praecipuis ejusdem sic dictis specificis. Helmstad. 1756.

Jo. Guil. Werner D. list. observationes circa nonnulla remedia antepileptica usitata. Regiomont. 1759.

Franc. Xaver. Millar D. de medicamentis antepil. Argentor. 1787. 4.

Fr. Guil. Maurer D. de medicamentis antepilepticis. Marburg. 1792. 8.

D. Buxtorf Bemerkungen über die Anwendung einiger gegen die Fallsucht etc. gerühmter Mittel; im Museum der Heilkunde. B. I. Zürich 1792. no. 44.

Franc. Berger D. de remediis specificis in Epilepsia usitatis. Francofurt ad Viadr. 1795. 8.

De Specificis antepilepticis obsoletis et formulis compositorum antepilepticorum apud veteres et recentiores usitatorum vid.

Jantkii Select. mater. medic. Tab. 2.

Jüngkenii (Jo. Henr.) Lexicon chymico-pharmaceuticum. edit. tertia. Norimberg. 1729. 8.

Junkeri Conspect. mater. medic. p. 647.

Kovacs Tatai Hercules vere cognitus etc. p. 124 — 147.

Macasii Promptuarium mater. medic. p. 6 — 38.

Reuffii (U. F.) Dispensator. universal. P. II. p. 98 — 105.

Schroederi (Joh.) Pharmacopoea universalis. edit. IVta. Norimberg. 1746. fol.

Sebitz (Melch.) Manuale s. speculum medico-practicum. T. I. Argentor. 1661. p. 276. squ.

Smetii (Henr.) Miscellan. medic. L. II. cap. 33.

Spina (Dav. de) Lexicon pharmaceutico-chymicum. Francof. ad Moen. 1702. 8.

Wedel Syllab. mater. medic. select. p. 24. squ.

A.

Acaroides resinifera. (Resina.)

Kite (Ch.), in Memoirs of the medical Society of London. Vol. IV. London 1795. (Resinam hujus ab Anglis in regione Botanybay repertae plantae non absque facultate morbosam irritabilitatem atque debilitatem sine evacuatione tollente ideoque epilepticis congruam haberi. In debilitate ex apoplecticis et epilepticis paroxysmis remanente efficacem sese praebuisse.)

Accipitris Cineres.

Macasii (Jo. Georg.) promptuar. mater. med. Lips. 1677. 8. p. 7.

Acetum Antimonii, v. Antimonium.

Achillea (an atrata Linn.?). (Herba.)

Gesner (Conr.) Epistol. p. 66. (ad epilepsiam puerorum usurpari.)

Achillea Millefolium. (Flores. Herba. Summitates. Decoctum. Extractum. Infusum.)

Arnold. de Villanova Breviar. practico. Lib. I. cap. 22.

Crato a Craftsheim Consil. et epistol. medicinal. Francos. 1595.

Lib. I. conf. 41.

Hennlincer D. de Millefolio. Argentor. 1718.

Lange D. de Millefolio. Altdorf. 1714.

Normand, in Roux Journ. de Medecine. T. XXXV. à Paris 1775. p. 520.

Aconitum Napellus. (Herba. Extractum.)

Dürande, in Gardane Gazette de Santé. à Paris 1774. p. 143.

Greding l. c. T. I. p. 241. (semel tantum ab eo tentatum paroxysmos mitigavit.)

Saur, in Kengl. Svensk. Acad. Handl. Vol. XXXIV. Stockholm 1773. p. 92. (paroxysmos exasperare videbatur.)

Aëris dephlogisticatæ inhalatio.

Gittanner, in C. W. Hufeland Journ. der practisch. Arzn. B. I. St. 2. p. 254.

Aerugo, v. Cuprum nativum.

Asculus Hippocastani. (Cortex. — Pulvis, decoctum, infusum, extractum.)

Gualdo (Ferd. Comes de), in Anton. Turra osservazione me-

diche e chirurgiche intorno alla faccolta febrisughe e antisettiche della corteccia dell' Ippocastano. Vicenza 1788. p. 33. (In epilepsia cum febre tertiana felici cum successu adhibuit.)

Sabarot de la Varniere, in Journ. de Medec. T. XLVII. p. 327. (ter quaterve paroxysmos retardasse observavit.)

Semina.

Parmentier Recherches sur les vegetaux nourrissantes. p. 176. et 218. (iis comestis paroxysmos esse retardatos.)

Alces ustum, v. Cuprum nativum.

Aethiops mineralis.

Rahn Briefwechsel. B. I. p. 427. (Epilepsia salivationi per aethiopem mineralem cedens.)

Schulze, in Fr. Schrommii D. de aethiope minerali. Altdorf. 1725. 4. p. 21. 24. (epil. verminosam aliamque a retrogressis achoribus sanans.)

Agaricus muscarius. (Radicis ficcati pulvis.)

Anonymus quidam in Allg. Litt. Zeit. 1793. n. 246. (per triginta et quae supersunt experimenta efficaciam ejus specificam in epilepsia a terrore esse expertum. Intrare quoque remedium antepil. Ragolo putat.)

Bernhard (Jo. Christ.) chym. Versuche und Erfahr. aus Vitriol etc. und Fliegenschwämmen kräftige Arzneien zu verfertigen. Leipz. 1755. obs. 5. p. 324. (3j. semel in die cum aceto data.)

Whistling (Christ. Gothofr.), praef. Gruner, D. de virtutibus agarici muscarii. Jenae 1778. p. 13. (3ß — 3j. ter de die cum v. alvum graviter movet sudoremque ciet.)

Agarbi oleum.

Medicina experimentalis Dygbaeana ins Teutsche übersezt und vermehrt. Frankfurt u. Offenbach 1687. 8. p. 330.

Alchemilla vulgaris. (Herbae Succus.)

Kovacs Tatai l. c. p. 139. (Succum a Matthiolo et Tabernacmontano tribus diebus ab 3ij — iij. propinatum esse refert.)

Schröder (Jo.) Pharmacop. universal. p. 1105.

Alces ungula, v. Cervus Alces.

Allium

Allium sativum. (Radix.)

Plinii Historiae natural. Lib. XX. cap. VI. lin. 41. edit. Hagenvae. 1518. fol. (combusta e melle data.)

Ambra maritima.

Hofmann (Fr.) medic. ration. consult. T. IV. p. 294. (vel pulveris forma gr. iij — iv. pondere saccharo permista vel essentia cum Spiritu Vini ex ea parata ad gtt. X — XX. propinata insultus epilepticos mitigavit.)

Carbones sic dictae ambrosiacaе.

Welfch (Georg. Hieron.) propr. observat. med. physic. August. Vindelic. 1675. 4. Hecatost. II. obs. 40. p. 23.

Sal volatile ambræ.

Boyle (Rob.) de philosoph. experim. p. 418.

Amuleta.

Alexand. Trallianus. Lib. I. cap. 15. (animalia, quae nares ovium et caprarum incolunt, a Deo Delphico pro epilepsia qua amuleta esse indicata.)

Baldinger (E. G.) neues Magaz. für Aerzte, B. XII. St. 6. p. 494. (Joh. Hornschuh, pseudomedicus prope Isenacum, epileptici varia amuleta exhibens.)

Bartholin (Thom.) Epistol. Lib. III. p. 341.

— — — Histor. anat. Cent. IV. hist. 69. (radix sambuci super falicem crescentis.)

Boodt (Anselm. Boet. de) gemmarum et lapidum historia. edit. a Wolfg. Gabelchover. Francofurt. 1603. 8. Lib. II. cap. 53. (Smaragdus.)

Caesaris Longini Trinum magicum, p. 225. (Versiculi certi collo gestati.)

Camerarii (El.) Syllog. memorab. medic. Cent. III. partic. 30. (paeoniae radix.)

— — — — Cent. XVI. partic. 45. (radix sambuci super falicem crescentis.)

— — — — — partic. 46. (pilum chartarum lusforiarum.)

E. N. C. Dec. I. ann. IV. et V. obs. 42. (rad. Imperatoriaе.)

E. N.

- E. N. C. Dec. II. ann. II. obs. 152. Schol. p. 346.
- — — — — ann. IX. obs. 39. (arinulus appensus.)
- Fehr (J. M.) de Absynthio. Lipsiae 1668. 8. p. 84.
- Forest (P.) Observation. L. X. obs. 59. (paeonia.)
- Galenus de simpl. medicam. facultatib. L. VI. (paeonia.)
- Gottsched flora prusica. p. 155. (radix Lysimachiae purpureae,
sole ultimum canceri-gradum accedente, collecta colloque appensa.)
- Grube de arcanis medicis non arcanis. Cap. III. p. 52. squ.
- Hartmann prax. chymiatr. p. 67. (Sambucus salici insita.)
- Hartung D. de superstitios. Cap. II. p. 5. (Sequentes versiculi gestati:
„Haec tria qui secum portabit nomina regum;
„Caspar fecit myrrham, thus Melchior, Balthasar aurum,
„Solvitur a morbo Christi pietate caduco.“)
- Krause D. sist. de amuletis medicis cogitata nonnulla. Lipsiae 1758.
§. 25. p. 26.
- Mayerne prax. medica. p. 50.
- Monconys (de) Journal des Voyages. T. II. à Paris 1677. 4.
p. 335. (mercuriale.)
- Paullini (C. F.) de talpa. Francof. et Lipsiae 1689. 12. p. 128.
- Petri Hispani Summa experimentorum et thesaurus pauperum.
Lugdun. 1525. 4. fol. 253. a. (eos, qui nomina Casparis, Bal-
thasaris et Melchioris collo suspenso gestant, epilepsiae expertes
manere.)
- Plinii Histor. natur. L. XXIX. cap. 4. (ossa viperina purpurea sin-
done collo suspenso.)
- Rolfink (Guern.) Medicin. consult. L. II. p. 209.
- Rosenstein (N.) von d. Kinderkrankh. p. 62. (Radicis Verbenae
qua amuleti etsi inutilis remedii mentionem facit.)
- Spindler (Paul.) Observation. n. 7. Schol. (Testiculi cati.)
- Storch von d. Kinderkrankh. Th. II. Eisenach 1750. p. 115. (Linea
coralliorum a sacerdote quodam benedicta.)
- Willis de morb. convulsivis. p. 464.
- Wolf (Jacob.) Scrutinium amuletorum. Cap. II. Sect. I. p. 98. squ.
- Wunderbare Kräfte der Natur durch die Sym- und Antipathie. Frank-
furt u. Leipzig 1772. p. 59. (tradit nobis sequens e manuscripto
quo-

quodam cabalístico desumptum amuletum contra epilepsiam: Lamellae aureae aut argenteae inscribas sequentia verba in certas lineas congesta:

A N A N I S A P T A
N i r i t u m a i T
A r a e p i n i m a P
N i p a n a e c i m A
I t i n e t e n u S
S u n e t e n i t I
A m i c a e n a p i N
P a m i n i p a e r A
T i a m u t i r i N
A T P A S I N A N A.

Ulterior hujus expositio:

Antidonium Nazarenū auferat necem, intoxicat, sanctificat alimenta, pocula, Trinitas alma.

Nazarenus Jhesus rex Judaeorum, titulus victorialis, morte ab improvise tueatur.

Alui regis aeterni patris incomprehensibile nomen Jekova morbum auferat pestifer.

Nostri inimicum perimat antiquum nomen aetherici conditoris illud magnum Agla

Jekova trinitatis immensae nomen et Tau esto nostrae victoriae signum Signum victoriae nostrae esto Tau etc. (a tergo legenda.)

De hoc amuleto sequentes versiculi:

*Est mala mors capta, dum dicitur Ananisapta,
Ananisapta mortem ferit, qui laedere quærit.)*

Amygdalus amara. (Nuclei.)

Plinii Histor. natural. L. XXIII. cap. VIII. lin. 10. (cum melle et mentha.)

Ana-

Anagallis arvensis. (Herba.)

Dioscorid. mater. med. Lib. II. cap. 209.

Gasseri (Achill.) observ. med. obs. 57.

Plinii Histor. natur. L. XXV. cap. 13.

Ambusa officinalis. (Flores.) — Vinum buglossatum.

Baldinger Magaz. für Aerzte. St. VII. p. 604.

Brutz (Ladisl.) D. de gramine mannae s. festuca fluitante. Viennae

1775. 8. p. 33. squ. recus. in Wafferberg Collect. Dissertat.

Tom. III. (Sequentem dat. vini buglossati formulam:

R. Fl. Buglossi recent. collect. m℥. iij.

Infunde c. St. de faece Vini parati ℥j.

Vitro probe clauso macerentur per triduum. Sumat aeger vase inclinato cochlearj. magnum omni mane.

Duos aegrotos hocce remedio feliciter sanavit, quorum alter jam a prima juventute epilepsia laboravit, alterque ab ea ex terrore orta erat infestatus.)

Martii (Galeotti) L. de promiscua doctrina. Francofurt. 1602. 12.

obs. 42. (jam vinum buglossatum contra epilepsiam ori illinendum suadet.)

Radix:

Schröderi Pharmacop. univers. p. 1158. (radicis $\bar{\text{O}}$ risat. 3℔.)

Anethum Foeniculum. (O e feminibus.)

Medicina experiment. Dygbaeana. p. 315. (gtt. ij. pro dosi.)

Anemone pratensis.

Störk (Anton.) L. de pulsatillae nigricantis usu medico. Vindobon.

1771. (frustra tentata.)

Antepilepticum Bachiene, v. *Bachiene*.

— — — *Beccario*, v. *Beccario*.

— — — *Ernesti Principis*, v. *Ernest*.

— — — *Ferdinandi I. Imperatoris*, v. *Ferdinand*.

— — — *Helvetii*, v. *Helvet*.

— — — *Leopoldgrünensis Theologi cujusdam*.

Appel (J. J.) Discursus de epilepsia. Altenb. 1713. p. 38.

— — — *Oreilly*, v. *Oreilly*.

— — — *Puerorum*, v. *Vitriol. caerule*.

Antepi-

Antepilepticum Ragolo, v. *Ragolo*.

— — — *Schachtii*, v. *Schacht*.

— — — *Willichii*, v. *Willich*.

Antihelminthica.

Beaumes von d. Convuls. d. Kinder, p. 203. squ.

Gordaek Geschichte u. Kur eines epil. Frauenz. Königsb. 1770.

Hamburg. Magaz. Hamburg 1755. B. XV. p. 313.

Heister (Laur.) med. chir. und anat. Wahrnehm. Rostock 1757. 8. pag. 133.

Ranoe (A. B.), in Act. Soc. med. Havn. Vol. II. Havniae 1791. 8. p. 342.

Rougeres (de), in Journal de Med. par Mfr. Roux. T. XXX. à Paris 1769. p. 51.

Thomafius (Gothofr.), in E. N. C. Dec. III. Ann. III. obs. 191.

Tiffot l. c. p. 230.

Antimonium.

Bovius Flagello contro de Medici rationali. Venet. 1538. v. Haller. Bibl. pract. T. II. p. 246.

Herrmann (P.) Cynosur. mater. med. cur. J. Boecleri. Argentorat. 1726. P. III. p. 98.

Junker D. de antim. crud. usu interno. Halae 1750. 4.

Reiseiffen D. sist. antimon. crudum in medicina. Argentor. 1721. 4. pag. 39.

Acetum. § nii.

Agricola (Jo.) Comm. in Jo. Poppium de acetis. Lipsiae 1638. 4. p. 769.

Antimonium calcinatum.

Riverii (Lazar.) Prax. Lib. I. cap. 8.

Butyrum. § nii Lemery.

Spina (de) l. c. p. 199.

Cerussa. § nii.

Mayerne (Theod.) Prax. p. 48.

Cinnabaris. § nii.

Dower, in Medical essays of Society of Edinburg. T. II. p. 310.

P

Croci

Croci metallorum aqua.

Schroeder Pharmacopoea universal. p. 890.

Sinibaldi (Jac.) parva method. medendi. Romae 1707. 8.

Kermes minerale.

Tiffot l. c. p. 335.

Oleum ꝯnii.

Valentini (Bail.) Triumphwagen des Antimonii d. J. Thölden.
Nürnberg 1676. 8. p. 102.

Pilulae et Pulvis alter. Plumeri.

Ackermann, in not. ad Tiffot. l. c. p. 335.

Kinneir new Essay on the nerves. p. 117.

Sulphur antimonii.

Dolaei encyclop. medic. p. 133.

Sulphur auratum ꝯnii.

Delius (Fr.), in Nov. Act. Nat. Cur. T. II. Norimberg. 1761. p. 81
pag. 364.

Tiffot l. c. p. 335.

Unzer, in Hamburg. Magaz. B. VIII. p. 369.

— — — — — B. IX. p. 613.

Tartarus emeticus

1) *qua emeticum.*

Brouzet sur l'education des enfans et leurs maladies. à Paris 1754
12. Vol. II. p. 10.

Hofmann (Fr.) Medic. rat. system. T. IV. P. III. p. 68.

2) *qua nauseosum et resolvens.*

Beaumes l. c. p. 90.

Hirschel (Leonh. El.) Gedanken, die Heilart der fall. Sucht betref-
fend. Berlin 1770. p. 42.

— — — medic. Nebenstunden. Berlin 1772. p. 30.

Lentilii (Rosin.) Eteodrom. medicopract. anni 1709. Stuttgart.
1711. p. 33.

Mellin (Chr. Jac.) Mater. med. p. 16.

Werlhof (P. G.) opera omn. ed. Wichmann. Tom. III. p. 726

Wichmann (J. E.) annot. ad Werlhofii l. c.

Wil-

Willich (M. v.), in Balding. N. M. f. A. B. VII. p. 118. (in con-
nubio Valerianae, Squillae etc.)

Vitrum gñii ceratum.

Steel, v. Beaumes l. c. p. 353.

Strandberg Tal om de Fel etc. p. 16.

Anwaldina Panacea.

Magnopere olim medicorum attentionem excitasse videtur. Pulvis fusco-
rubescens. Inventor, qui antea jurisprudentiae studiosus, postea
medicus, erat Georgius an et vom Wald. Andreas Libavius, qui
hocce medicamentum chemice exploravit, partes ejus constitutivas,
matrem perlarum, cinnabarim, mercurium pluries sublimatum et
crocum esse contendit. Formulam a Volkamero emendatam inve-
nies in

Jüngken. Corp. pharmaceut. p. 276.

Ad arcani hujus historiam conferas:

Crollii (Oswald.) basilica chymic. p. 115. (potissimum cinnabari
constare, cui crocus et conchae pptae. accedunt.)

Georg an und vom Wald auf Durrnhof, J. et M. D. Physici
Donauwerthienfis, Bericht, wie die von ihm erfundene Terra
figillata und Universalarzney wider die Pestilenz etc. hinfallende
Sucht etc. zu gebrauchen. St. Gallen 1581. 4.

— — — Kurzer Bericht, wie, was Gestalt und warum die
Panacea Anwaldina als eine einige Medicin wider den Ausatz etc.
Frankfurt 1592. 4.

— — — Zum andernmal Gedanken und Bericht etc. Wesel
1594. 4.

— — — Vortrab auf Andr. Libavii Spott- und Schmach-
worten, daß die Panacea Anwaldina eine Universalmedicin sey.
Hanau 1595.

— — — Glossarium in epistolam Libavianam. Roschach.
1596. 4.

— — — Gemehrter Bericht von der Terra figillata Anwal-
dina, wie und was Gestalt sie wider Pestilenz etc. — fallende
Sucht etc. zu gebrauchen sey. Stuttgart 1601.

Weilseh (G. H.) Observat. Hecatost. II. August. Vindelic. 1675. 4.
pag. 175.

Contra eam:

Libavii (Andr.) Examen Panaceae Anwaldinae. 1594. 8.

— — — Neoparacelsica, in quibus vetus medicina defenditur
adversus repetita Georgii Anwaldi. Francof. 1594. 8.

— — — Gegenbericht von der Panacea Anwaldina, auf An-
walds ausgegangenen Bericht gestellt. Frankfurt 1595. 4.

— — — Panacea Anwaldina victa et prostrata, oder wieder-
hohlter Gegenbericht etc. Frankfurt 1596.

— — — Singularium P. IV. Francof. 1601. 8. (continet sub
n. 3. Historiae Panaceariae Sectiones II. in Amstardam, Baldui-
num, sive Amwald.)

— — — — sub n. 4. Asclepiadem, etiam contra Anwaldum.

Scherbii (Phil.) Theses medic. collect. et edit. a Casp. Hofmann. n.
Lips. 1614. (Examen Panaceae Anwaldinae.)

Aper, v. Sus scrofa.

Apium Petroselinum.

Camerarii Syllog. memorab. med. Cent. XVI. partic. 21—23.
(an epilepticis conducatur, ventilatur et fere negatur.)

Aqua antepileptica Amstelodamensis.

Marggrafii (Chr.) Materia medic. contracta. Amstelod. 1682. 4.

Spina (de) l. c. p. 65. (Sequentem ejus formulam tradit:

R. Radic. Paeoniae maris siccatae. ℞. Angelicae. Fraxinell. Fol.
Origani cretici, Rutae, Salviae, āā ℥j. Flor. Paeoniae maris,
Betonicae, Liliorum convall. Rorismarini, Tillae, siccatorum.
Sem. Ammii orient. Nigellae āā ℥℥. Paeoniae ℥ij. Cassiae
lignae, Caryophyll. Cardom. minor. Nuc. mosch. Olei Vi-
triol. āā ℥ij. — Pulverisatis pulverisandis affund. St. Vini ℞ x.
macer. per octiduum bene clauso, dein colat. per setaceum den-
sissimum et colatura fervetur in vitro probe obturato.)

Aqua antepileptica D. R.

Spina (de) l. c. p. 59. (Formula:

R. Flor. Lilior. convall. ℥viij. Paralyf. ℥iij. inf. in Vin. Rhen. qu.
f. ft. in inf. per integr. sept. in vase strict. orif. loco calido, de-
inde

inde lento igne destilla per vesicam; recipe huj. dest. qu. s. adde
 ▽ rosar. fr. Ceraf. nigr. fragar. meliss. c. Vino destill. āā ℥j.
 Vin. malvat. Spirit. Vin. āā ℥j℥. M. Infund. et s. a. destilla,
 huic destillato adde Cinnamom. elect. Nucis mosch. āā ℥j. Pi-
 per. long. Cardam. Cubeb. Caryophyll. āā ℥vj. Sem. Foenic.
 ℥j℥. Rad. Paeon. rec. ℥j. Flor. Lavend. Rorism. Paeon.
 Stoechad. arab. āā ℥j. Herb. Paralyf. ℥ij. ℥ij. St. in infus.
 per d. et noct. postea dest. per serpentem et pro usu reponc. —
 Dos. cochl. j — ij.)

Aqua antepileptica Dorncrellii, v. Dorncrell.

— — — *Ettmüllerii, v. Ettmüller.*

— — — *Hartmanni, v. Hartmann.*

— — — *Hirundinum Ph. August.*

— — — — — *Fischeri,*

— — — — — *le Mort,*

— — — — — *Rolsincii,*

— — — — — *de Spina,*

— — — — — *Zwölferi,*

— — — — — *Jüngkenii, v. Jüngken.*

— — — — — *Langii, v. Langii.*

— — — — — *Londinensis.*

v. *Hirundo urbana.*

Spina (de) l. c. p. 64. (Formulas:

R. Fl. Lilior. convall. rec. ℥j. Inf. in Vin. hispan. conchiis iv.
 quamdiu haberi possunt flores recentes, tum R. Flor. prae-
 dict. ℥℥. Paeoniae ℥iiij℥. Macer. simul p. dies XIV. dein
 destilla ad siccitatem in B. M. In destillato liquore iterum ma-
 cerentur: Rad. Dictamni alb. Aristoloch. long. āā ℥℥. Flor.
 Visci querc. Rutae āā mpl. ij. Sem. Paeon. decort. ℥x. Ru-
 tae ℥iiij℥. Castorei. Cubeb. Macis āā ℥ij. Cinnamom. ℥i℥.
 Scillae ppt. ℥iiij. Flor. Rorismarin. pgl. vj. Stoechad. arab.
 Lavendul. āā pgl. iv. Bëtonicae, Tunicae; Paralyf. āā ℥viij.
 Succ. Ceraforum nigr. ℥iv. destill. omnia in organis vitreis
 ad siccitatem.)

Aqua antepileptica mineralis Zwölferi, v. Zwölferi.

— — — — — *Mynsichti, v. Mynsicht.*

Aqua

Aqua antepileptica ex Ossibus destillata, v. Ossa.

— — — *Puerorum. P. A. R.*

Spina (de) l. c. p. 58. (Formula:

R̄. Aqu. ceras. nigr. flor. tiliae, paeoniae, squammariae. āā ʒ viij.
Sacchar. perlat. ʒ iv. M. Datur ad epilepsiam puerorum denti-
tionis tempore vel per se, vel cum aqua cinnamomi.)

Aqua antepileptica Reginae Danicae, v. Daniae.

— — — *Regis Danicae, v. Daniae.*

— — — *Zwölferi, v. Zwölfer.*

Aqua aurea veneta.

Hamburg. Correspond. 1793. n. 184. (ad restringendum paroxysmum aegris in ipso paroxysmo propinandum commendatur. In lagenis vitreis pro moneta aurea sic dicta Carolina venditur Coloniae a Dn. Kaa, chori musici praefecto ad ecclesiam cathedralem.)

Aqua catarrhalis Hofmanni, v. Hofmann.

Aqua cephalica et epileptica Francofurtensium.

Spina (D. de) l. c. p. 45. (Formula:

R̄. Flor. Lilior. convall. ʒ jß. Paeon. Lavend. Beton. āā ʒ j. Tiliae, Primulae veris āā ʒ iij. Herb. Botryos c. florib. impl. j. Rad. Paeon. ʒ ijß. Aristoloch. ʒ jß. Dietamn. alb. ʒ j. Sem. Paeon. ʒ ijß. Cubeb. ʒ j. Piper. nigr. ʒ jß. Visc. quern. ʒ j. ʒ ij. Corylini ʒ iij. — Macer. in Vin. Malvat. ʒ viij. per octiduum, dein destill. e B. M.

Aqua Ciconiae, v. Ardea Ciconia.

Aqua Cinnamomi contra epilepsiam Disp. Norimb., v. Laurus Cinnamomum.

Aqua Cordialis temperans. Pharm. Augustan.

Spina (D. de) l. c. p. 49.

Aqua Croci Metallorum, v. Antimonium.

Aqua mineralis Borboniensis.

Guenault (Petr.) et J. Forestier, Ergo epilepsiae per consensum vae borbon. archimbaldicae. Parisiis 1643. 4.

— — — *Brückenavica.*

Alix (M. C.) observat. chirurg. Fascic. III. Francofurt. 1777. 8. vid. Richter chir. Bibl. T. IV. p. 445.

Aqua

Aqua mineralis Embesensis.

Brückmann (C. Ph.) enarratio choreae Sti. Viti et epileptiae per fontes medicatos Embesenses curatae. Francofurt. 1786.

— — — *Freyenwaldina.*

Heydecker (Fr. Willh.) Beschreib. des Gesundbrunn. und Bades zu Freyenwalde. Berlin 1795. 8. Abfchn. III.

— — — *Horubusana.*

E. N. C. Dec. II. Ann. X. obs. 166.

— — — *martialis.*

Tiffot l. c. p. 321. (in epilepsia a primarum viarum atonia cum fructu esse adhibendam, non autem absque praecautione ob spirituosam ejus indolem humores ad caput pellentem.)

— — — *Nennendorfsensis.*

Schroeter, in Balding. N. Mag. f. A. B. XI. St. 3.

*Aqua Picarum, v. Corpus Pica.**Aqua Tetruccina.*

Sylvatici (Bened.) Consil. et respons. med. Cent. IV. Patavii 1656. fol. p. 173.

*Aqua Wismuthi, v. Wismuthum.**Aquilae Sanguis.*

Camerarii l. c. Cent. XVI. partic. 36. (laudat.)

Aquilegia vulgaris. (Herba.)

Gasserii Observat. med. obs. 55. (Herbae expressum succum cum succo lumbricorum terrestrium laudat.)

Arcana et occulta varia.

Acta Erud. Lipsiens. Ann. 1724. May, p. 189.

Bresl. Samml. Versuch XVI. p. 562.

— — — Vers. XXIII. p. 324.

Smetii (Henr.) Miscell. med. L. II. c. 33.

Welfch Hecatost. II. obs. 74. p. 45.

Arcanum Bachiene, v. Bachiene.— — — *Beccario, v. Beccario.*— — — *Fioravanti, v. Fioravanti.*

Ardea

Ardea Ciconia.

Aqua ex ea destillata.

E. N. C. Dec. II. Ann. IX. obs. 142.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1779.

Cox.

Macasii Prompt. mater. med. p. 9.

Stercus.

Crato, v. Schroeder Pharmacop. univers. p. 1778.

Macasii l. c. p. 9.

Argentum.

Bezoardicum lunare Zwölferi.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 740. (9j — 3℔.)

Spina (D. de) l. c. p. 194.

Catharticum lunare.

Angel. Sala septem planet. terrest. spagyr. recens. v. Ej. Oper. omn. p. 195. (gr. iv. — viij. bis terve tertio semper die cum vini malvatici aliquot uncüs.)

Lapis divinus.

Sims (J.), in Memoirs of the Medical Society of London. Vol. IV. London 1795. n. 24. (in ∇ aut alio quodam congruo vehiculo solutus et ad $\frac{1}{8}$ gr. pro dosi propinatus laudatur. Interdum ex ejus usu breviter ante plenariam fugam paroxysmi exasperati sunt.)

Rhümelii Extractum e scoriis argenti.

Rhümelii (Jo. Pharam.) Medic. spagyr. tripart. p. 166.

Tinctura Lunae.

Stahlii Theor. medic. p. 1019.

Unzeri Liquor viridis.

Unzeri *исповоголоула*. p. 10.

Aristolochia serpentaria. (Radix.)

Gruelmann D. sist. observationes de usu Cicutae. Gotting. 1732. p. 30. (cum nitro in epileps. ex terrore.)

Intrat quoque Electuarium Fullerii, v. Fullerii Electuar.

Arnica montana. (Extractum.)

Störk (Ant. v.) Medizin. pract. Unterricht für die Feld- und Landwundärzte der Oesterreich. Staaten. Wien 1776.

Arnol-

Arnoldi a Villanova Electuarium.

Ejus oper. omn. Venetiis 1505. fol., fol. 97.

Aromatica.

Deckers (Fr.) praxis Barbettiana. Leidæ 1669. 12.

Reusneri (Hieron.) experimenta et observationes. Ulm. 1676. 4.

Artemisia vulgaris.

Ackermann Annot. ad Tissot. l. c. p. 362. (Carbo quaedam sub radice artemisiae reperienda et in nocte ante festum divi Joannis effodenda a quibusdam olim commendabatur.)

Arteriarum compressio.

Parry, in Memoirs of the Medical Society of London. Vol. III. London 1792. 8. p. 7.

Arteriotomia.

Severini (Marc. Aurel.) de efficaci medicina. L. III. Francofurt. 1671. fol. p. 42. (arter. temporal.)

Arsenicum album.

Cullen (W.) Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. Leipz. 1784. p. 185. (Arsenici efficaciam in febribus intermittentibus consideraui, in epilepsia quoque non exiguum de eo sperat emolumentum.)

Liquor arsenicalis s. solutio mineralis Fowleri.

(v. Gmelin App. T. I. p. 266.)

Alexander (Edward), in Duncan medical Commentar. for the Year 1790. Dec. II. Vol. II. Edinb. 1791. n. 6.

(Hujus liquoris gtt. vj — xij., aquae fontanae ʒj. St. nucis moschatae ʒij. et Syrup. Caryophyllor. ʒß. temperatâs in epilepsia et convulsionibus a vermibus felici successu exhibuisse.)

Potassa arsenicata. (Gmelin l. c. p. 267.)

Brugnatelli Bibliothec. fisica. T. XIV.

Pearson, in Duncan Med. Comm. for 1788. Dec. II. Vol. III. Edinburg. 1789. v. Auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIII. p. 572. (gr. $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{20}$.)

Asa foetida, v. *Ferula Asa foetida*.

Asinus, v. *Equus Asinus*.

Atriplex hortensis. (Semina intrant pulverem de Gutteta Riverii, v. Pharm. Wirtemb. p. 151.)

Atropa Belladonna. (Folia. Extractum.)

Böttcher (J. Fr.) vermischte mediz. chirurg. Schriften. Heft I. Königsb. 1791. 8. n. 4.

Greding (J. E.), in Ludwig. Adversar. med. pract. Vol. I. P. IV. Lipsiae 1770. p. 637. sq.

— — — sammtl. Schrift. T. II. p. 168. (ad sublevandos paroxysmos parva dosi tuto dari posse.)

Käufer, in Journ. d. Erfind. etc. in d. Arzneik. St. VI. p. 129. (in mentis alienatione post epilepsiam pulveris herbae gr. x. ter in XXXVI horarum spatio multo cum fructu dedisse.)

Münch (J. H.), (pater) Hannöv. Magazin, 1770. St. 14. (Syrupum e succo a ʒj — ʒlj.)

— — — Beobachtung. bei angewendet. Bellad. St. II. Stendal 1790. 8. p. 66 — 104. (Multos plenarie hujus remedii ope sanasse contendit. Insigne levamen fere omnes inde experti sunt tam in morbo ipso, ita ut paroxysmi decreverint et in tremorem aut spasmos particulares tranfierint, quam in mentis alienatione hoc morbo juncta. Pulveris foliorum gr. β — j β. cum saccharo tritum vel Extractum cum pulvere in unam massam redactum ad gr. iij — iv. pro dosi.)

Münch (J. H.), (filius) Observat. pract. circa usum belladonnae in melancholia et epilepsia. Gotting. 1783.

Richter (A. G.), v. Feurstein Diss. cit. p. 78. (rheo jungere jubet.)

Stoll (Max.) Rat. medend. Vol. III. p. 406. (Extractum ad ʒj. usque per nychthem. dedit; Pulverem extracto praefert.)

Aurum. (Intrat ♂ epil. de Gutteta, holfaticum, nigrum marchionis, Vienne. panonicum rubr. etc.

Aurum mercuriale.

Hellwig (Chr.) philos. Briefe. Leipzig 1712. 8. p. 73. (praeparandi formula et laus contra epilepsiam.)

Aurum potable.

Angel Sala Oper. med. chym. Francof. 1647. 4. p. 263.

Medicina experim. Dygbaean. T. II. p. 427. (dos. gtt. viij.)

Sorbait (P. de) univers. medicina. Norimberg. 1672. fol. v. Haller. Bibl. pr. T. III. p. 306.

Magi-

Magisterium Auri. (Gimélin. App. I. p. 446.)

Angel. Sala l. c. p. 263. (a gr. iij — viij.)

Tinctura Auri.

Schroeder Pharmac. univers. p. 733. (gtt. vij — viij. in St. appropriato.)

B.

Bachione (*Theologi cujusdam Ultrajectensis*) *Arcanum antepilepticum.*

Genees- Heel- Arzney- en Vroedkondige Magazin, uitgegeven door

Martinus Pruys en Lambert. Noeft. te Rotterdam.

Deel. II. 1784. p. 106. v. Samml. auserl. Abh. für pract. Aerzte.

Th. X. p. 15.

(*Formula:* R. Succ. Semperviv. tector. recent. expreff.

St. Frument. āā ʒ ij.

M. D. vespere pro dōsi.

laudatur a Cornelio Pereboom, qui quinquies insultus epilepticos aliis remediis minime cedentes eo sanavit.)

Balnea frigida. Eorum laudes habent:

Beunie (Joh. B. de), in Verhandelingen te Vliſſingen, Tom. VI.

p. 587. v. Samml. f. pract. Aerzte, B. VIII. p. 577.

Cael. Aurelian. tardar. passion. Lib. I. cap. 4.

Celsus Lib. III. cap. 5.

Floyer Psychrolusia, aus d. Engl. v. J. C. Sommer. Breslau und Leipzig 1749. 8. p. 160.

Rhases Contin. Lib. ult. cap. 70.

Tiffot l. c. p. 235. 371.

Exasperati a balneo frigido paroxysmi exempla habent:

Tode medic. chirurg. Bibl. B. I. p. 117.

Weikard (M. A.) Observat. medic. Francof. 1775.

Balnea tepida. Laudantur a

Lieutaud Precis de la Médecine pratique. p. 231.

Marcard (H. M.) über die Natur u. den Gebrauch der Bäder. Hannover 1793. p. 410.

Marteau über die Bäder; Übers. v. Dr. C. E. Held. Leipz. 1773. 8.
pag. 127.

Mayerne praxis. p. 48.

Tiffot l. c. p. 377.

Balsamum epilepticum Fr. Hofmanni, v. Hofmann.

— — — Jüngkenii, v. Jüngken.

Balsamum polychrestum Mynsichti, v. Mynsicht.

Bartholini Pulvis antepilepticus.

Kovacs Tatai l. c. p. 132. (laudans sequentem formulam tradit:

R. Cranii human. combust.

Ossium human. combust. aa ʒß.

♂ off. Lacertar. magn. virid. ʒij.

Visc. quern.

Paeoniae maris, rad. et sem. decort. luna decrefcente col-
lect. aa ʒj.

Mercur. ppt.

Ungul. Alces aa ʒß.

Sacch. albiss. ʒiv.

Pulverizanda pulveris. subtilissime et fiat Pulvis. Dos. ʒj. c. ∇ de-
still. e C. C. recenti cum primo nascitur, et mixta c. ∇ fl. Tiliae et
Lilior. convall. dupla quantitate. Bibatur c. ∇ picarum vel hi-
rundinum.)

Spina (D. de) l. c. p. 759.

Basilii Spiritus antepilepticus.

Spina l. c. p. 894.

(Formula: R. Virid. aeris qu. v. superfufo aceto destillato calido
extrahe et decanta, Liquorem per alembicum abstrahe, reli-
quum in ∇ pluviali solve, filtra, coagula ad tertiae partis rema-
nentiam: repone in loco frigido ad crystallisandum; Crystallos
toties collige, quoties ∇ ulterius coagulata ac reposita illos da-
bit. Hos crystallos destilla ex retorta fortiter, et prodibit ∇
subviridis; quando incipit subnigra apparere, cessa, ∇ quamque
illam subviridem dein per alembicum destilla et extillabit cla-
rissima.

Dosis ʒj in ∇ appropriata, e. g. Paeoniae etc.)

Batei

Batei Decoctum antepilept. vomitivum.

Schroederi Pharmacop. universal. p. 260.

Batei Electuarium antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 316.

(Formula: R. Stercor. albiss. Pavon. sicc. ʒij.

Rad. Paeon. maris aa ʒij.

Valerianae ʒj.

Sem. Paeon. excort. ʒiij.

Carvi ʒss.

Pulveris. adde Mell. anthos. qu. s. ut fiat Electuarium.)

Beccario Arcanum antepilepticum.

Salzburg. medicin. chirurg. Zeitung 1791. B. IV. p. 288.

n. 94. (Pietro Beccario, Medicus Cassalensis in Ducatu Monteferratensi, in diario quodam italico sese inventorem remedii specifici declaravit, quod epilepsiam plenarie tollit, haereditariam tamen mere imminuit.)

Bedagorae s. Badigorii Medicamenta contra epilepsiam.

Rhazes Contin. Lib. I.

Benzoës Flores, v. Styrax Benzoin.

Beuceri Pulvis antepilepticus.

Bierling (Casp. Th.) Adversar. curios. Jenae 1679. 4. app. p. 107.

Bezoardicum lunare, v. Argentum.

Boletus suaveolens.

Enslin (Jo. Chr.) D. de boleto suaveolente. Erlang. 1784. p. 77.

(laudat eum Cl. Schmidt, in litteris ad Cl. Wendt. Exhibebatur electuarii ex pulvere ejus et melle cochl. j. parvum quater de die vel et pulveris ejus et sacchari lactis aa ʒj. aequè frequenter, continuatione per plures menses facta.)

Borax Gemma nobilis Smaragdus. (intrat varias veterum compositiones antepilepticas.)

Boetii de Boodt Gemmar. et lapid. historia, L. II. cap. 53. (externe qua amuletum.)

Kovacs Tatai l. c. p. 115. (quo viridior eo efficacior.)

Peuceri (C.) Comm. de praecipuis divinationum generibus. Francofurt. 1607. p. 637. (Sequenti modo de eo judicat: „Smaragdus

„ragdus epilepsiae tota natura contrarius est admotusque corpori
„illae obnoxio aut vincit aut profligavit morbum retinetque vim
„suam et nitorem: aut morbo superatur moxque vim omnem
„amittit et rumpitur.“)

Schroeder Pharmacop. universal. p. 654.

Zechii (Jo.) Consultat. medicin. Francof. 1650. 8. consult. 44.

Borax Gemma nobilis Topasius.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 649. (Hieron. Cardanum ejus
pulvere epilepsiam sanasse.)

Bos Taurus.

Cornu raspatum.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 1697.

Fel ad extracti consistentiam inspissatum.

Cullen Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. p. 185. (nihil ex eo sperat.)
Hoffberg (Carol.), in Kongl. Svensk. Vet. Acad. Handl. Stock-
holm 1765. p. 308. (3j. in 3j. Vin. Gall. propinare jubet. Eva-
cuationes exinde per alvum et salivam. In excrementis pueri
cujusdam hoc remedio sanati repertae sunt membranae vacuae
planae velut pisorum compressae, forte quia morbus a vermibus
natus erat medicamenti vi consumptis, in mucum resolutis, mem-
branis eorum post ejectis.)

Quarin (Jof.) Animadvers. in divers. morb. chron. Viennae 1786.
p. 24. (per plures septimanas continuatum nonnullos epilepticos
habitus pallescentis ac tumiduli penitus sanavit.)

Officula auditus vituli.

Feurstein (J. H.) Diss. cit. p. 91. (eorum olim contra epilepsiam
usurpatorum mentionem facit.)

Stercus vaccae nigrae.

Hartmann (Jo.) prax. chymiatr. v. Ej. oper. omn. medico-chymica.
Francof. 1684. fol. p. 19.

Macasii (J. G.) Prompt. Mater. med. p. 23.

Urina vaccae.

Macasii l. c.

Royle

Boyle Tinctura viridis aeris.

Medicin. experim. Dygbaean. p. 147. (formula praeparandi. Dos. pro adulto gtt. x—xx.)

Bryonia alba.

Arnold. de Villanova Breviar. pract. Lib. I. cap. 22. (epilepticum intra tres hebdomades sola purgatione cum succo sacchari edulcorato sanavit.)

Reusner (Hieron.), in G. Welfschii curat. et observat. Cent. VI. obs. 158. (aliquot pueros epilepticos, eadem simplici medicina bis quavis hebdomade purgatos, sanavit.)

*Bruzii Antepilepticum, v. Anchusa officinalis.**Bubon Galbanum. (Gummi.)*

Plinii Histor. natur. Lib. XXIV. cap. 5. lin. 28. (galbani odorem epilepticis prodesse.)

*Buglossi flores, v. Anchusa officinalis.**Butyrum Antimonii, v. Antimonium.**Buxus Sempervirens. (Oleum.)*

Fonseca (Roder. a) Consult. med. Venet. 1628. fol. conf. 15.

Heredia (Petr. Mich. de) Oper. med. Antwerp. 1690. fol. obs. 14.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1159.

Vogel (R. A.) Vorlesung. über die Kenntn. u. Heilung etc. p. 482.

C.

Calculus Bezoar.

Kovacs Tatai l. c. p. 115.

Calculus Margarita intrat varias veterum compositiones contra epilepsiam usitatas.

*Calx Saturni, v. Plumbum.**Calx Zinci, v. Zincum.**Camelus.**Cerebrum.*

Plinii Histor. natur. L. XXVIII. cap. 8. (ex aceto potum.)

Stercoris cinis.

ibid. l. c.

Canis.

Campbora, v. *Laurus Campbora*.

Cancer Aflacus. (Chelae.)

Kaempfer Enchirid. medic. p. 290. (chelarum margo externus cum pulvere cochlearum mixtus.)

Canis Familiaris.

Axungia.

Plinii Histor. natur. l. c.

Unzeri *ιστρονομολογία*. p. 49.

Canis adbuendum fugiens.

Plinius l. c. (e vino et myrrha propinandus.)

Crines.

Plinius l. c.

Fel.

Bartholin Acta Havniens. Vol. III. obs. 20.

Camerar. Sylloge memorab. Cent. XVI. partic. 40. (canis nigri.)

Hannemann D. de usu et abusu inebriantium. Norimb. 1679. p. 44.

Kovacs Tatai l. c. p. 119. („Singularre remedium refertur fel catelli nigri lactantis (pro foemella epileptica substitue catellam) „strangulati cum liquore conveniente exhibitum; nempe totus „succus cysti fellea exsumptus patienti cum pauxillo aquae florum Tiliae propinatur. Hujus beneficio Ducis Buckinghami „filius est sanatus. Porro solent empirici pueris majoribus, post „fel epotum etiam catelli hepar assatum comedendum tradere. „In Anglia hoc est usitatissimum testante D. Sklegio.“)

Lentilii (Rosin.) Eteodrom. medic. pract. p. 960.

Martii (Galeotti) L. de promiscua doctrina. obs. 45.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 1704.

Hepar.

Kovacs Tatai l. c. p. 119. (assatum. v. Fel.)

Canis Lupus.

Caro.

Act. Erud. Lips. Ann. 1727. September, p. 404. (in pulverem redacta.)

Riverii (Lazar.) Obs. med. Cap. II. obs. 31.

Cin-

Cingulum e corio lupino.

Craton. a Craftsheim Consil. et epist. medicin. Francof. 1595. 8.
obs. 38.

Cor.

Macasii Prompt. mater. med. p. 10.

Paullini (Chr. Fr.) Observ. med. phys. Lipsiae 1706. 8. Cent. II.
obs. 65.

Hepar.

Borell (Petr.) Observat. med. Cent. II. obs. 95.

Fabri (Petr. Joann.) Panchymic. Lib. V. Sect. I. cap. 20. in Opp.
omn. Vol. I. Francof. 1652. 4.

Tissot l. c. p. 351. (Cl. Sauvages ex ejus usu noxium vidisse
effectum.)

Sanguis.

Fabri (P. J.) Panchymic. l. c.

Cantharides, v. Meloe Vesicatorius.

Capra Hircus.

Fel Hirci.

Gazette de Santé. 1774. p. 134. (cum melle datum.)

Stercus caprarum.

Quercetan (Jof.) Pharmacop. dogmaticorum restituta Lips. 1603.
8: (helleboro pastarum.)

Stercus Hirci.

Macasii (J. G.) Prompt. mater. med. p. 35.

Carbo sub radice Artemisiae reperta, v. Artemisia vulgaris.

Cardamine pratensis. (Flores. Herba.)

Baker, in Medical Transact. T. I. p. 443. (in duobus vel tribus ex-
emplis non suffecit ad tollendam epilepsiam.)

Berger D. de remed. specif. in epilepsia usitatis. Francof. ad Viadr.
1795. p. II. (recentem epilepsiam subito absque manifesta causa
ortam infuso herbae et florum saturato per aliquot septimanas
continuato sublatam vidit. Sudores fere colliquativos inaleque
olentes movebat. In morbo paulo adultiori nil praestitit.)

Greding, in Ludwig, adversar. med. pract. Vol. III. P. III. p. 564.

R.

(unico)

(unico epilepsia laboranti levamen flores praestiterunt. In omnibus reliquis autem iisque numerosis, etsi diu et large fatis exhibitis, spem fefellerunt.)

Lysons practical Essays. p. 173. (non sufficit ei hocce medicamen ad sanandam epilepsiam. Sudorem quaelibet dosis movebat.)

Nagel (Leop. Ant.) D. sist. Cardamine pratensis characterem botanicum et usum medicum. Francof. ad Viadr. 1793. 4. p. 13. (agit. vi resolvente, anthelmintico. Exhibetur in forma pulveris ad ʒj. per diem aut qua infusum. [ʒ℥ cum ∇ ℥j. paratum] quotidie datum.)

Caro Lupi, v. Canis Lupus.

Caro Viperæ, v. Vipera.

Caroli V. Pulvis antepilepticus.

Spina (Dav. de) l. c. p. 760.

(Formula: R. Salviae ʒij. Flor. Lavend. Hyssop. Menth. aa ʒj. Caryoph. Nuc. mosch. Cinnam. Zingib. Gran. parad. Zedoar. Galang. aa ʒ℥. Calam. aromat. ʒij. Gran. jun. ʒiij. Paeon. ʒj. M. f. P.

Castor Fiber. (Castoreum.)

E. N. C. Dec. II. Ann. II. obs. 150.

Fothergill, in Medical Observat. and Inquiries. Vol. VI. London. 1784. p. 596. (Castorei similiumque medicamentorum salutarem effectum ab aegrotorum appetitu iis imminuto derivat.)

Hofmann (Casp.) de medicam. officin. Jenae 1686. 4. p. 283.

Junker's Conspect. Medic. theor. pract. Tab. XXXVII. caut. 35. Tab. LV. caut. 5. (ab ejus usu abstinendum esse. Ex eo nempe momentaneum modo levamen, dein deliria et pectoris oppressio.)

Loof (J. A.) Histor. epileps. fol. Aurant. persanat. Groningae 1771. (quotidie ad gr. xl. datum epilepticam sanavit. Epileptico frustra ad ʒij. quotidie exhibitum.)

Moor (Barthol. de) pathol. Cerebri. Amsterd. 1704. 4. p. 211.

Paulli (Sim.) Quadripartit. botanic. de simplicium medicam. facultatibus. Argentor. 1674. 4. p. 107.

Petri Hispani Summa experimentorum s. thesaurus pauperum. Ant.

Antwerp. 1497. (Epilepsiam medicamento ex castoreo, opopanace, antimonio et sanguine draconis sanatam esse.)

Plinii Histor. natur. L. XXXII. Cap. III. lin. 14.

Riedlin lin. med. Ann. I. Mart. obs. 7. p. 67.

Serapion, v. Cael. Aurelian. Chronic. L. I. c. 4. (jam castoreum contra epilepsiam aliis medicamentis mixtum propinavit.)

Thouvenel Mém. sur les principes et les vertus des substances animales medicamenteuses. à Bourdeaux 1779. 4. p. 357. (Juvenis quidam castorei usu per XII dies a 5 ℞. — 3 ℞. continuato liberatus est ab epilepsia. In duobus aliis non aequalem ostendit efficaciam, tamen mitigavit paroxysmos. v. Samml. auserl. Abhandl. für practische Aerzte. B. X. p. 138. 352.)

Oleum Castorei.

Medicina experiment. Dygbaeana, p. 332.

Catbarticum lunare, v. *Argentum*.

Caustica. (externe.)

Heers (Henr. ab) Observat. p. 210. obs. 24.

Locher (Max.) Observ. pract. circa luen veneream etc. Vindobon. 1762. 8. p. 40.

Martius (Galeott.) de promisc. doctrina. obs. 71.

Quarin (Jof.) animadvers. p. 21. (saepius incassum tentata.)

Rochard, in Roux Journ. de Medecine. T. XXV. à Paris 1766. p. 46. (Puerum epilepticum simul scabiosum ope causticorum ad nucliam et brachium applicatorum, conjuncto internorum apto usu, sanavit.)

Zacut. Lusitan. Prax. admir. Lib. I. obs. 22. (epilepsiam a pollice orientem caustico pollicis imposito sanavit.)

Cellarii Pulvis antepilepticus cum Castoreo.

Pharmacop. Wirtemberg. Stuttgart. 1741. fol. p. 260.

(Formula: R. Rad. Paeon. Sem. Paeon. aa 3 ℞.

Unicorn. marin. Margarit. aa 3 ij.

Lapid. V. pretios. aa gr. xlv.

Castor. Visc. quern. Ungul. Alc.

Corall. rubr. aa 3 ij. Cran. hum. ppt. 3 j ℞.

Pulv. Viperar. 3 j. M. f. ♂. — Dos. 3 ℞. — 3 ℞.

R 2.

Cen-

Centaurea benedicta. (Herba.)

Scholz Consil. et Epistol. L. IV. (decoctum.)

Spiritus e Herba destillatus.

Untzer ιερονοσολογ. L. II. cap. 7.

Cerebrum Cameli, v. *Camelus.*

Cerebrum Corvi, v. *Corvus Corax.*

Cerebrum Coturnicis, v. *Tetrao Coturnix.*

Cerebrum humanum, v. *Homo.*

Cerebrum Leonis, v. *Felis Leo.*

Ceribia. (an *familiaris* L.?)

Jahn (Fr.), in Balding. N. Mag. f. Aerzte. B. XII. p. 502. (Miraculosam atque veterum superstitiosis opinionibus valde similem historiam sanationis ope sanguinis et carnis ejus factae enarrat pater cujusdam filii epileptici in litteris ad Cl. Jahn datis.)

Cerussa Antimonii, v. *Antimonium.*

Cervus Alces.

Cornu. (Θ volatile. Spiritus.)

Kovacs Tatai l. c. p. 117.

Ungula. (intrat plurima veterum compositiones antepilepticas.)

Crato a Craftsheim. l. c. Epist. VI. p. 67. (inertem esse.)

Kovacs Tatai l. c. p. 116. (laudat.)

Lemnii (Levin.) de miraculis occultis naturae Lib. IV. Francofurt. 1590. 12. p. 149. (ab interno ejus usu multa sperat nec externe eam annuli instar gestatam, aut mere manu comprehensam spernit.)

Menabeni (Apollon.) Tr. de Alce. Colon. 1581. 8. cap. 8. 9.

Moor (Barthol. de) l. c. p. 211.

Schenk (Jo.) Observat. Lib. I. obs. 229.

Scholz Epistolar. philosoph. medic. Volumen. Francof. 1598. fol. Epist. 60. (parum virtutis tribuit.)

Cervus Elaphus. (Cornu, Sanguis.)

Graboe (Jo. Andr.) Elaphographia. Jenae 1667. Sect. III. c. 2.

Kovacs Tatai l. c. p. 118. (Cornu Cervi a d. 15. Augusti, usque ad 8. Septemb. collectum omnibus fere remediis palmam praeripere

pere five crudum five vaporatum, vel in forma St. Elis volat. nec minores obtinere vires medicamina e sanguine cervi parata.)

Essentia cornu Cervi.

Medicina experim. Dygbaean. Th. II. p. 127. (Dof. 3j.)

Chirurgia infusoria.

Elsholz (J. Sigism.) Chymiatr. nova. Coloniae ad Spream. 1667. 8.
(ab ea in epilepsia auxilium vidit.)

Hermann (J. A.) med. chirurg. Aufsätze. Berlin 1778. 8. p. 208.
(epilepsiam cum suppressione mensium sanavit liquoris moscho impraegnati ʒj. infusione in venam medianam, post sanguinis ʒiv. detractionem. Moschi 3℞. cum ∇ destillatae ʒvj. per VIII horas in mortario vitreo terebatur ac dein filtrabatur. Colatura per dies II. loco quieto commorans iterum iterumque filtrabatur. Hic Liquor est immixtus brevi ante novilunium, apparente solito tunc temporis paroxysmo. Prorsus cessante paroxysmo rite quoque fluebant catamenia.)

Purmann (Matth. Gothofr.) Chirurgia infusoria. Francof. 1694. 4.
(Feminae epilepticae spiritum paeoniae in venas injecit eamque sanavit. Alterae aquam hirundinum cum sale volatili succini injecit.)

Schmidt (J.), in Philos. Transact. 1667. n. 30. 34. (trahit experimenta circa chirurg. infusoriam facta, qua epilepsiam quoque superavit.)

Cinchona Caribaea. (Cortex.)

Aufmkolk (Fr. Willh.) D. de cortice caribaeo cortici peruviano substituendo. Gotting. 1793. 8. p. 33. (ejus usum in epilepsia commendat.)

Cinchona officinalis. (Cortex.)

Bang (Fr. L.) Ausw. aus dem Tageb. d. Krankenh. zu Kopenhagen. Th. I. p. 129. (levamen ab ejus usu vidit.)

Beaumes l. c. p. 204.

Buchhave (Rud.), in Act. Soc. med. Havn. T. I. p. 213. (in epilepsia a terrore cum fructu data.)

Comparetti (Andr.) occurfus medici de vaga aegritudine infirmitatis

- tatis nervorum. Venetiis 1780. p. 305. (laudat in connubio Valerianae et foliorum Aurantiorum.)
- Cullen (W.) Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. (e tonicis vegetabilibus ab ea plurimum et quidem in epilepsia periodica sine organo et plethora sperat. Brevi ante paroxysmorum periodum in larga quantitate propinanda.)
- Cullen (W.) Treatise of Mater. med. Vol. II. Edinburgh 1789. p. 111. (in epilepsia a mobilitate nervorum orta proficuum esse.)
- Frank (Jo. Pet.), in Salz. med. chirurg. Ztg. 1792. T. I. p. 427. (in periodica.)
- Fulleri (Thom.) Pharmacop. extempor. pag. 89. (vid. Fuller. Electuar.)
- Grainger (Jac.) Historia febris anomala batavae. Edinburg. 1753. 8. p. 112. (in periodica epilepsia ab ea cum ferri limatura et mercurio dulci data vidit auxilium.)
- Groffin Duhaume Traité de la petite verole, augmentée d'un traité sur les remèdes domestiques. à Paris 1779. 8. p. 506. (laudat Electuarium e cortice peruviano paratum contra epilepsiam.)
- Heister (Laur.) pract. mediz. Handbuch. Leipzig 1744. 8. (epilepsiam verminosam sanavit cortice chinae hydrargyro juncto.)
- Hirschel (L. E.) Gedanken d. Heilart der fallend. Sucht betreffend. §. 26.
- Lettson, in Memoirs of the Medical Society of London. Vol. III. London 1792. n. 18. (epilepsiam cortice peruv. sanavit, adjuncto usu vitrioli albi et limaturae martis.)
- Mead (Rich.) Monit. et Praecept. p. 37. (magni fecit sub connubio rad. Valerianae. v. Mead. Electuar.)
- Medicin. Wochenblatt. 1781. n. 21.
- Medicus Geschichte period. Krankh. Carlsruhe 1754. (in periodica cum limatura martis et mercurio dulci.)
- Neue Sammlung medicin. Wahrnehm. B. III. p. 217.
- Ritter, in A. N. C. Vol. X. App. p. 153.
- Ruer (Herz. Israel) D. de cortice peruviani vi antispasmodica. Argentorat. 1787.

Ruhland über Epilepsie; in Aesculap, einer Medic. Zeitschr. von Dr. Weber und Dr. Ruhland. B. I. Leipzig 1790.

Tiffot l.c. p. 320. (egregium ab ea in periodica vidit fructum; etiam Tozzi Locherique laudes habet.)

Tode (J. Cl.) medic. chirurg. Bibl. B. II. St. I. p. 160. (cum sale ammoniaco.)

Werlhof (P. G.) de Febris. edit. Wichmann. Hannov. 1775. p. 64. not. (cuiuslibet 3 [l. corticis peruv. addidit olei Cajeput gtt.]. Repudiat eum [l. c. p. 53.] in paroxysmo, in remissione vel intermissione concedens.)

Cinis crinium e regione pubis, v. Homo.

Cinis vexilli militaris.

Abel (Henr. Casp.) reformirter und ganz vollkommener Leibmedicus der Studenten. Leipzig 1720. 8. p. 375.

Cinnabaris. (intrat Pulverem antepilept. Moebii, Cratonis, Dolaei, Hartmanni, Mynsichti etc.)

Barbette (P.) Prax. medic. p. 8.

Craton. a Craftsheim Epistol. med. ep. VI. (epilepsiae magnetem appellat.)

E. N. C. Dec. I. Ann. IV. et V. obs. 42.

— — — Ann. VI. obs. 41. (nil prodesse.)

— — — Ann. VII. obs. 78.

Hofmann. (Fr.) Medic. ration. syst. T. III.

Schulze (Godofr.) Scrutinium cinnabarinum. Halae 1680. 12. (Saepius in epilepsia incassum dedisse.)

Waldfchmidt (Jo. Jer.) Prax. medic. ration. p. 310.

Citrus Aurantium. (Folia.) Hocce a 37 circiter annis contra morbos convulsivos et speciatim contra epilepsiam laudatum remedium arcani instar primum Hagae Comitum ab idiota quodam Chocolatae forma usitatum celato nomine ab Cl. Westerhoef (ejus urbis tunc temporis physico) ad Ill. de Haen mittebatur, ut ipse experimenta subiret. Certiorem tum eum reddidit Cl. Wenzel (Ophthalmiater), Vindobonae tum versatus, hocce arcanum nil nisi Aurantium folia esse. Prima in aegris experimenta instituta erant foliorum decocto,
vel

vel cum Vini rubri connubio vel et decocto per se dato: Optime propinatur in pulveris forma a ʒ℞. — ʒj. bis, ter, quaterve in die, etsi aliis forma decocti (impl. j. c. ʒ font. ℥j. ad dimidia consumptionem coquendi et pro unico praebio ingerendi aut foliorum ʒ℞. c. ʒ font. ʒxx. per horae quadrantem coquendae et spatio unius diei fumendae) magis placeat.

Bonafos, in Rich. de Hauteferk Recueil d'Observations de Medecine. T. II. à Paris 1772. p. 450. (inertia esse.)

Büchhoz und Marquet neueste Heilkunde; aus dem Franz. Nürnberg 1777. 8. n. 10.

Comparetti (Andr.) Occursus medici de vaga aegritudine infirmitatis nervorum. Venetiis 1780. 8. p. 304. (corticem Aurantium in morbis nervosis iis prodesse, quibus fibrae sunt crassae et laxae.)

Cullen Anfangsgr. der Arzneiw. Th. III. p. 183. (folia amaritiei ope agere. Non semper fructum praebere.)

Gesner (J. A. P.) Schwäb. Samml. und Beob. B. I. p. 193. (epilepsia a terrore iis sanata.)

Haen (Ant. de) Rat. medend. T. VI. p. 305. squ. (Cl. Westerhoefii, Welfii, qui praecipue decoctum in connubio vini rubri propinavit, et Ill. Haenii propria de hocce remedio facta experimenta. Profuit iis in variis convulsionibus, nunquam autem in vera epilepsia.)

Hannes (C. R.) Epistol. ad Büchnerum de puero epileptico foliis aurantium recentibus servato. Vefaliae 1766. (Epilepsia a terrore iis sanata.)

— — — in Nov. Act. Nat. Cur. T. V. p. 245. (alia haud felici successus experimenta.)

Home (Fr.) Clinical experiments p. 211. (inertiam eorum testatur.)

Kaempf (Jo.), in Act. Societ. Scient. Hassiac. T. I. Giesiae 1771. p. 152. (felici cum successu propinavit. Decoctum in machina papiniana praeparatum pulveri longe praefert.)

Locher (Max.) Observat. pract. p. 44. (felici eventu in ipsa epilepsia tentavit. Paroxyfmi eorum ex usu vel mitiores vel rariores evadunt, vel plane dispulsi. Interdum quidem frustra adhibitum,

con-

constantior tamen reliquis omnibus praestitit effectum. Inter dicta felici successus exempla quaedam epilepsiae chronicae habitualis et varia ex terrore ortae.)

Loof (A. J.) D. sist. historiam epilepsiae foliis aurantiorum sanatae. Groningae 1771. (epilepsia a terrore.)

Marx (M. J.) Observat. quaed. medicae. Berolin. 1772. 8. p. 33.

— — bestätigte Kräfte der Eicheln. Hannov. 1781. p. 25. 29. (felici eventu in epilepsia a terrore data.)

Pfündel, in Hufeland Journ. d. pract. Arzn. B. II. St. 2. p. 256. (cum fructu dedit infusum theiforme in connubio Valerianae et visci querni.)

Pharmacop. Helvetica. Basil. 1771. (saepius fuisse inefficacia.)

Quarin (Jos.) animadv. pract. p. 23. (semel tantum ab iis felicem vidit effectum, saepius autem incassum propinavit.)

Strandberg, v. Rosenstein in Halleri Epistol. Vol. V. p. 174. (efficaciam testatur.)

Thilenius mediz. chirurg. Bemerkungen. Frankf. am M. 1789. 8. p. 129. (Quibusdam proficua fuisse, quibus jam laudatiora medicamenta incassum data erant.)

Tiffot l. c. p. 335. (longe inferiora radice Valerianae habet.)

Claretum epilepticum laxativum Mynsichti, v. Mynsicht.

Clossaei Pilulae antepilepticae.

Spina (D. de) l. c. p. 687.

(Formula: R. Praecipitati solaris, per se in matracio ∇ febrili continuo parati ℥j. † n. mineral. ℥ iv. Ol. † n. febrifugi gtt. xx. Extract. Castor. per spirit. Vin. evaporando facti, Succin. aa ℥j. de Paeon. mar. c. Spir. Vin. fact. Paeon. femin. Bryon. aa ℥ij β. Fol. Hellebor. nigr. subtiliss. triturat. ℥ ij. Fiat pulvis et c. succo Porri massa pilularum, cui admisce Ol. Angelic. sativ. Spirit. Vitriol. aa gtt. x. — Harum pilularum cape ante paroxysmos aut post lunae quadram duas ℥j. ponderantes, sumendo postea jusculum carniū acido vitrioli conditum.)

Clysmata.

Düpan (J.), in Journ. de Medecine. Septbr. 1789. (Epilepsiam verminosam clysmate ex decocto herbae Nicotianae sanavit.)

S.

Hahne-

Hahnemann (J. L.); in E. N. C. D. II. Ann. III. obs. 51. (idem.)

Kaempfer (J.) Abhandl. von einer neuen Methode die Krankh. des Unterleibs etc. p. 427. 445. (Epilepsiam ab infarct. bilios. pituit. feliciter clysmatibus visceralibus sanavit.)

Kovaes Tatai l. c. p. 75. sequ. (varias clysmatum formulas huic morbo congruas tradit. Commendat nempe clysmata e Decoct. Rad. Paeon. Visci quern. ex oleo Rutae etc. Vitanda liquoris injiciendi nimia quantitas. Riverium et alios Chymicos clysteribus infusa ex croco metallorum aut vitro antimonii in epilepsia addidisse.)

Rosenstein (Ros. v.) Anweis. zur Kenntniss u. Kur der Kinderkr. p. 61. (ad profligandum paroxysmum in infantili aetate laudat.)

Tiffot l. c. p. 275. (saepius applicanda.)

Tralles de usu opii. P. III. Cap. 1. p. 23. (commendat ea adjuncto methodo antiphlogistica.)

Verzaseha L. de affect. thorac. fol. 260. (liquoris injiciendi haud magna sit copia.)

Zacut. Lusitan. Prax. adm. Lib. I. obs. 21. (clysmatibus et venae-sectione epilepsiam sanavit.)

Cochlearia officinalis. (Spiritus cochleariae.)

Dolaei (J.) encyclop. medic. p. 133.

Cochlearum Pulvis, v. *Helix Pomatia*.

Cocos Nucifera. (*Maldivica*.) (Belgic. *Zeekalappen*.)

Nuclei.

Thunberg (C. P.) Reise d. ein. Theil v. Europa, Asia und Africa; aus d. Schwed. überf. v. Chr. H. Groskurd. B. II. Th. I. Berlin 1794. p. 203. (nuclei pulverisati a 3i. — 3j. contra epilepsiam a Ceylonicis propinantur.)

Coffea arabica. (Semina ustulata.)

Meza (Sal. Theoph.), in Collect. Societ. med. Havn. Vol. I. p. 154. (epilepsiae e saturatissimo decocto sanatae exemplum.)

Coitus et Matrimonium.

Act. Erud. Lips. Ann. 1712. August. p. 346. (epilepsiae ejus ope sanatae exemplum.)

Am.

Ammann (P.) *Medicin. critic.* Stad. 1677. 4. p. 539. (ventilatur
quaestio: an epilepticis conducatur?)

Asclepiades, v. Cael. Aurelian. *Chronic.* Lib. I. cap. 4. p. 322.
(commendat.)

Bierling (Casp. Theod.) *Medic. theor. pract.* Jenae 1679. 4. p. 935.

Cumme (A. H.), in E. N. C. Dec. I. Ann. III. obs. 86. (Sanatae
epilepsiae exemplum.)

E. N. C. Cent. I. obs. 23. p. 80.

— — Dec. II. Ann. X. obs. 127.

— — Dec. III. Ann. II. obs. 75.

} (epilepsiae matrimonio sana-
tae exempla.)

Krünitz (J. G.), de Matrimonio multorum morborum remedio.
Francof. ad Viadr. 1749.

Plinii *Histor. natur.* L. XXVIII. cap. 5. (multa morborum genera
primo solvi coitu; aut, nisi id contingat, longinqua fieri maxime-
que comitiales morbum.)

Pyl (J. Th.) *Aufsätze u. Beobacht. a. d. gerichtl. Arzneiw. Samml.* I.
Berlin 1783. (concedi posse matrimonium, sana parte consen-
tiente, raro tamen epil. sanari matrimonio.)

Schurig (Mart.) *Spermatolog.* Francof. 1720. 4. p. 292.

Stahl (G. E.) *D. de disposit. haeredit. ad varios morbos.* Halae 1706.
p. 48. §. 76. (exemplum epil. haereditariae, omnia ejusdem fa-
miliae membra tempore pubertatis infestantis, matrimonio sa-
natae.)

Sinibaldi *Geneanthrop.* Lib. IX. Tr. I. cap. 2. p. 716. (ventilatur
quaestio: An epilepticis conducatur?)

Stegmann (Ambros.), in E. N. C. Dec. III. Ann. V. VI. obs. 12.
(Venere largita epilepsia suppressa; redeuns cum ea negaretur.)

Tiffot l. c. Th. II. Abschn. 2. Th. V. p. 73. 206. (anceps reme-
dium esse.)

Colocynthis, v. *Cucumis Colocynthis*.

Columba Turtur.

Sanguis.

Camerarii (J.) *Syllog. memor.* Cent. XVI. part. 35.

Sympathetica Applicatio,

* * *

Kovacs Tatai l. c. p. 74. (D. Brunner [Archiater Halensis] turturem foemellam deplumatam epilepticae umbilico in paroxysmo imposuit atque felicissime paroxysmum profligavit.)

Sennert Prax. Lib. I. P. II. cap. 31. p. 478. (hancce applicationem in foeminis, et si epilepsia sit ex consensu uteri, putat consentaneam.)

* * *

Gyfzer (Medicus Pforzheim.), in Reichsanzeiger, 1796. n. 54. p. 566. (Sequentis applicationis efficaciam e propria experientia testatur.)

Thueffink von den Convuls. der Kinder; in Museum d. Heilkunde. B. III. p. 140. (Columbam adhuc juniorem et sanam viventemque epileptici orificio ani antea bene abluto tempore paroxysmi ita imponas, ut orificium ani columbae accurate attingat aegri orificium ani. Hoc facto columba aut motu convulsivo infestatur aut saltem ad vehementem frequentemque cogitur respirationem et aeger mox liberatur paroxysmo. Columba autem vel breve post temporis intervallum moritur vel paulatim tantum ab illo symptomate liberatur. Etsi hocce haecenus infallax remedium veram morbi causam minime tollat, id tamen ex eo obtinetur emolumenti, quod tamen paroxysmi inde imminuantur et opprimantur ideoque congruorum remediorum applicationi et agendi facultati sat satis temporis paretur.)

Conium maculatum. (Herba. Extractum.)

Stoerk (A.) Libell. quo continuantur experimenta etc. Vindobonae 1765. p. 91.

Percival (Thom.) Essays medical. London. 1767. p. 44.

Convallaria majalis.

Baccae.

Senkenberg D. de Lili convallii ejusque inprimis baccae viribus. Gotting. 1737. p. 29. (laudatur in epilepsia idiopathica periodica et nonnunquam ad lunae phases recurrente baccarum pulvis a ʒj. — ʒj. cum aqua Lilior. convall. simplici aut vinoso.)

Flo.

Flores. (♂ Decoctum. ♀) (cfr. Fulleri Tinctura antepileptica.)

Kovacs Tatai l. c. p. 142. etc.

Senkenberg l. c. (♀)

Waenerberg. in K. Svensk. Vet. Acad. Handl. f. År. 1765. p. 324.
(in comitiis remedium antepilepticum obtulit e felle urfi et floribus Lilior. convall.)

Cor Ciconiae, v. *Ardea Ciconia*.

Cor Hirundinum, v. *Hirundo urbica*.

Cor Hominis, v. *Homo*.

Cor Leporis, v. *Lepus timidus*.

Cor Lupi, v. *Canis Lupus*.

Cor Ranarum, v. *Rana*.

Cor Talpae, v. *Talpa*.

Cor Vulturis, v. *Vultur*.

Corallia rubra, v. *Isis nobilis*.

Coriandrum sativum. (Semina.)

Cardani (Hier.) Contradic. medic. L. II. Marburg. 1607. 8. p. 168.
(laudari ab Avicenna. A Cardano vituperantur.)

Cornu Alces, v. *Cervus Alces*.

Cornu Cervi, v. *Cervus Elaphus*.

Cornu Tauri, v. *Bos Taurus*.

Corvus Corax.

Cerebrum.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1780.

Combusti Cinis.

Reusner (Hieron.) experim. et observat. Ulm. 1676. obs. 13.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1780.

Ova.

Bartholom. Anglic. de proprietat. rerum. L. VII. cap. 9. (cum sanguine humano.)

Platearii (Joann.) Practic. brev. Venet. 1497. (eodem modo.)

Sanguis.

Camerarii (Jo.) Syllog. memorab. Cent. XVI. partic. 37.

Cor.

Corvus Pica.

Aqua destillata.

Quercetan (Jof.) de praeorum philosophorum verae medicinae praeparationis methodo. Genève 1603. 8. p. 67.

Spina (D. de) l. c. p. 100. (formula.)

Tinctura.

Sylvatici (Bened.) Consil. et respons. med. Cent. IV. Patav. 1656. fol. p. 113.

Corylus Avellana. (Pollen.)

Crufo (J.) Thesaur. medicam. euporist. London. 1701. 12. p. 45.

E. N. C. Dec. I. Ann. I. obs. 97. (in epil. ab acido.)

Ettmüller (M.), resp. G. Heintke, D. f. Valetudinarium infantile.

Lipsiae 1675. 4. (egregium esse antepilepticum.)

Hünerwolf (J. A.), in E. N. C. Dec. III. Ann. I. obs. 120.

Cranium humanum, v. Homo.

Cratonis Electuarium antepilepticum.

Craton. a Craftsheim Consil. et epistol. medic. L. VII. Francof. 1595. 8. conf. 420.

(Formula: R. Succ. Millefol. Rutae. Melissae. Majoran. Hyssop. ad spissitud. cum Saccharo cocti aa \mathfrak{z} ℞. C. C. ppt. \mathfrak{z} v. Mithridat. \mathfrak{z} j. Conserv. flor. Rorismar. \mathfrak{z} j℞.

M. lent. igne. Dos. mane \mathfrak{z} j. et ante somnum post coenam moderatam \mathfrak{z} ℞.)

Cratonis Elixir antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 360.

(Formula: R. Ciner. cornic. ex nido extract. Turtur. Cranii human. calcin. aa \mathfrak{z} ij. Gran. Tiliae autumn. collect. \mathfrak{z} ij. Stercor. Leon. \mathfrak{z} ℞. Affunde Spirit. Vin. ad eminent. digit. iij. extrahe s. a. ex faecib. calcinat. elixivia sal. addeque extractionibus: postea adde Vini Malvatici et Sacchar. cand. \mathfrak{z} iv. Dos. cochl. ℞. ad j.)

Cratonis Emplastrum epilepticum.

Jüngkenii (J. H.) Lexic. chym. pharm. P. II. p. 179.

(Formula: R. Succin. alb. Thuris, Mastych. aa \mathfrak{z} j℞. Galban. Opopanac. aa \mathfrak{z} j. Visc. quercin. \mathfrak{z} ij. Sem. Paeon. \mathfrak{z} ℞.

Lada-

Ladani ℥℥. Olei Nucis Moschatae ℥℥. Ambrac gr. vj.
Moschi gr. iij. Ol. rosacei qu. s. ut fiat Exempl. cui
in aluta extenso aspergatur pulvis Cubebarum et Su-
turae coronali applicetur.)

Cratonis Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 759.

(Formula: R. Cinnab. nativ. ℥j. torrefiat leviter super ignem in ta-
bula, dein terat. in pulv. subtil. Margarit. ppt. Corall.
rubr. ppt. aa ℥j℥. Cranii human. C.C. ust. aa ℥j.
Croc. ℥ij. Fol. Auri. n. xxv. M. f. ♂.)

Crocus Metallorum, v. Antimonium.

Crollii Elixir antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 360.

(Formula: R. Vitriol. ad flavedinem calcinatum imbebe Spirit. Vin.
F. Massa. R. Hujus Massae ℥j℥. Rasurae Cran.
human. Visc. quern. Ungul. Alces. Granor. Paeon.
aa ℥j. Omnia scind. et contund. postea mixta destill.
per retort. gradatim. Hujus egressi liquoris ℥j. re-
ctificetur in B. M. supra Castorei, Diamosc. dulc.
aa ℥℥. Anacardin. fruct. ℥vij. Postea adde Spirit.
Vin. ℥iv. ⊖ paeon. ℥j. Liquor. sal. perlar. Sal.
corall. aa ℥j. Ol. Anis. Succin. aa ℥ij. M. et diger.
in M. B. per mensem. Dos. cochlear ℥. — j. in ∇
paeon. et simili, continuando per dies IX.)

Cryalli praeparati, v. Quarzum Crystallus.

Cucumis Colocynthis. (Tinctura.)

Burser. a Kanisfeld Institution. medic. pract. Vol III. Lips. 1787.
p. 249. (Tincturam Colocynthis intrare arcanum antepilepti-
cum mulieris cujusdam Bononiensis putat.)

Cucurbitulae.

Ackermann annot. ad Tissot. l. c. p. 271. n. 55.

Celsus de medicina. L. III. c. 23.

Cuprum ammoniacum, v. Vitriolum caeruleum.

Cuprum

*Cuprum nativum.*α) *Formae Cupri nativae.**Lapis armenus.*

Alexand. Trallian. Lib. I. cap. 15. 17.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 680.

Malachites.

Gmelin Appar. Medicam. T. I. p. 342. (in cordis formam exsculptum et amuleti instar de collo suspensum contra epilepsiam infantum praesertim ex terrore in usu olim fuisse.)

β) *Formae factitiae.**Aerugo.*

Lieb, in Balding. N. Magaz. f. Aerzte. B. VII. p. 552.

Aes usum.

Aretaeus de acutor. curat. Lib. I. cap. 5.

Dioscorides de Mater. medic. Lib. V. cap. 42. (cardamo junctum et cum mulso propinandum epilepticis proficuum, qui inde aut vomunt aut laxantur.)

Sulphur cupri f. venereum.

Greding, in Adversar. medic. pract. Vol. I. p. 530.

— — sammtl. Schrift. Th. I. p. 104. (in VII. epilepticis nullum ex eo vidit fructum. Exhibuit nempe illis gr. j. cum gumm. arab. et Syrup. Paeon. in forma pilularum.)

Pasquallati (J. B.) D. de epilepsia. Vindobon. 1766. append. (primus in epilepsia habituali a gr. j — ij. per diem datis adhibuit.)

Quarin (Jof.) animadvers. in divers. morb. chronic. p. 25. (incaesum tentavit.)

Tinctura Cupri alcalina.

Gmelin Appar. Medicam. T. I. p. 349.

Lieb, in Balding. N. Magaz. f. Aerzte. B. VII. p. 552. (per longum temporis spatium a gtt. iv — xxiy. per diem cum mulso alioque potu continuanda. In pertinacissima epilepsia fructum praestitit.)

Cynanchum Ipecacuanba. (Radix.)

Act. Erudit. Lipsiens. Ann. 1717. Jul. p. 309. (efficaciae exemplum.)

E. N. C. Cent. VI. obs. 58. p. 315. (efficaciae exemplum.)

Plenk (J. J.) Beobacht. über die krampfkill. Eigensch. d. Ipec. bei Convuls. der Schwang. u. Gebähr., in Abhandl. d. Chirurg. Acad. zu Wien. B. I. Wien 1787. 4.

Cyprinus Carpio. (ossa ōrifata.)

Baricelli a Santo Marco (Jul. Caes.) hortulus genialis. p. 312. (ossiculum e vertice.)

Finkii Medicin. dogmat. hermetica. p. 39.

Fränkisch. Samml. Th. VII. Nürnberg 1765. p. 90. (pulvis ossis femilunaris carpcionis remedium specificum contra epilepsiam infantum pulmento infantum admiscendum.)

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1794.

D.

Dactyli Fructus, v. *Phoenix dactylifera*.

Daniae Reginae Aqua antepileptica.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 138.

Daniae Regis Aqua antepileptica.

Schroeder l. et p. c.

Daniae Regis Pulvis antepilepticus.

Bierling (C. Th.) adversar. curios. app. p. 107.

Daphne Gnidium,
Daphne Mezereum, } v. *Exutorium*.

Datura Stramonium. (Extractum.)

Arnemann (Just.) pract. Arzneimittellehre. Th. I. p. 279. (optime Camphora et extractis amaris jungi, ita ut pilularum formam accipiat.)

Dürande, in Gardane Gazette de Santé. 1773 et 1774. p. 143. (Satisfecit ejus voto in curanda epilepsia: ter quoque tamen fellit.)

Greding, in Ludwig. Adversar. med. pract. Vol. I. p. 259. 345.

— — sammtl. Schrift. Th. I. p. 102. (Ex XXVIII. epilepticis duos plane sanasse; IV. constans levamen, XI. temporarium modus

T de

dedisse: in reliquis frustra adhibitum esse. In parva repetitaque dosi salutarem interdum praebere effectum. Non semper autem absque aliorum indicatorum remediorum, e. g. lenientium, roborantium aut antispasticorum, connubio et ope tuto dari posse, sed interdum sub levaminis specie noxam inferre. Initium fecit gr. j. dosim sensim augendo ad 3 ℥. usque per nycthemerum.)

Ohdélius, in Svensk. Vetensk. Acad. Handl. 1766. p. 277. (In nosocomio Holmiensi e XIV. aegris, epilepsia et convulsionibus detentis, VIII. ejus ope sanati, V. levamen perceperunt; unus nihil inde auxilii expertus.)

Razoux Diss. épitol. de Cicuta, Stramonio etc. Nemausi 1780. 8. (laudat gr. ℥. ter in die.)

Schlereith Dispensat. Euldense. p. 24. (contrarii effectus observata.)

Sidrén (Jon.), resp. A. F. Wedenberg, D. de usu Stramonii in convulsionibus. Upsaliae 1772. (laudat.)

Spalowsky (Joach.) D. de Cicuta, Flammula Jovis, Stramonio etc. p. 30. (laudat.)

Stoerk (A.) Libellus. quo demonstratur: Stramonium etc. Vindobonae 1762. (Primus tentavit in duobus epilepticis, quibus fuit auxilio. Propinavit iis gr. ℥. — j. et quidem bis, ter, imo sexies de die, continuato per plures septimanas, imo menses, pro re nata usu.)

Wahlén, in Svensk. Vet. Acad. Handl. 1771. Vol. XXXII. (paululum profuisse.)

Decoctum Antepilepticum Batci, v. *Batè*.

— — — — *Michæelis*, v. *Michael*.

— — — — *Pressavini*, v. *Pressavin*.

— — — — *de Spina*, v. *Spina*.

Dentariae Radix, v. *Plumbago europaea*.

Dictamnus albus. Radix. (⚭. Essentia.)

Feurstein (J. H.) D. de epilepsia. p. 76. (nullum e hujus remedii usu observavit effectum.)

Schroeder Pharmacop. universal. p. 1253. (pulveris laudes.)

Stoerk Abhandl. vom Nutzen des Brennkrauts und des weissen Dictams. Frankfurt und Leipzig 1769. 8. (non plane inefficax fuit

con-

contra epilepsiam radix in pulverem redacta. Dos. gr. iij — xx. augendo sensim numero. Usus vero per VI. hebdomades continuari debet. Profuit et Essentia [v. Pharmac. Edinb. edit. nov. p. 75.] e. radice recentis et concisae $\frac{3}{4}$ ij. et Spir. Vin. $\frac{3}{4}$ xiv. digestionem bene saturata, binis epilepticis a gtt. xx — l. ter de die, etsi in uno non sufficeret redeunti malo.)

Digitalis purpurea. (Herba.)

Currie (W.), in Mem. of the medic. Societ. of London. for 1773. Vol. IV. London. 1795. n. II. (tribus epilepticis frustra data.)

Parkinson Theater of Plants. p. 654. (Epilepsiae, per XXVI. annos quolibet mense duobus vel tribus paroxysmis redeuntis, foliorum Digit. purp. manipulis ij. et Polypodii $\frac{3}{4}$ iv. cum cerevisia decoctis, sanatae exemplum.)

Wichering (W.) vom rothen Fingerhut; a. d. Engl. Leipz. 1786. p. 58. (laudat.)

Dippelii Oleum animale.

Ackermann, in annot. ad Tissot. l. c. p. 74. (haud exiguum ei tribuit efficaciam praesertim in epilepsia ab atonia, systematis nervorum languore ac labe, debilitate et anaemia orta aut concomitata. Nocere autem irritabilibus et plethoricis.)

Bang (Fr.), in Act. Societ. med. Havn. Vol. I. p. 500. (laudat.)

Beaumes von d. Convuls. der Kinder. p. 204. (Krammeri aliorumque laudes habet.)

Berrieh. (Ol.) Hermetis, Aegyptiorum et Chemicorum sapientia a H. Conringio vindicata. Havniae 1674. (jam contendit, olea ex animalibus parata penetrabiliora esse et epilepsiae melius resistere.)

Bosch (v. den) Histor. constitut. verminos. Lugd. Batav. 1769. 8. (laudat.)

Bresl. Samml. Verf. XVI. p. 166. (laudat.)

Cullen (W.) Anfangsgr. der Arzneiw. Th. III. p. 188. (saepius utile esse.)

Dippel Disquis. de vitae animal. morbo et medicina. p. 89.

Feurstein (J. H.) Diss. cit. p. 76. (Eventum discrepantem experimentorum, circa hocce remedium in epilepsia institutorum, aut

terius meliorum iustae puritati aut ejus ex aeris aggressu corruptioni forsan esse tribuendum.)

Hartmann (P. J.) D. sist. quaestiones medicas super Zinci florum usu interno. Francof. ad Viadr. 1778. (Cataleptis post florum Zinci usum in epilepsiam transiens Olei anim. Dipp. gtt. x. ter de die datis sanata.)

Hirschel (L. E.) l. c. p. 35. (non multum auxilii ex ejus usu sperat.)

Hofmann (Fr.) Observation. physico-chemicae selectae. Lib. I. obs. 14. p. 53. 54. (laudat.)

Juch, resp. Hannimann, D. sist. facillimam ac certissimam methodum epileps. curandi. Erford. 1741. (laudat.)

Korthum D. de epilepsia. Duisburg. 1766. (laudat.)

Ludolf, resp. Tresfelt, D. de olei animalis praeparatione et modo agendi. Erford. 1748.

Mauchart (B. D.), resp. Reinhardt, D. de oleo animale Dippel. Tubing. 1745.

Model Recreations physiques, oeconomiques et chymiques; avec des observations et des additions par M^r. Parmentier, à Paris 1774. (Parmentier ex ejus usu optimum hinc inde vidit effectum: interdum tamen quoque nullum.)

Quarin (Jof.) Animadv. ad divers. morb. chron. p. 25. (profuit ei interdum in epilepsia a mensuris retentis aut suppressis.)

Thouvenel Mémoires sur les principes et les vertus des substances animales medicamenteuses. à Bourdeaux 1779. (quotidie ad ʒij. sumtum liberavit juvenem ab epilepsia, absque manifesta causa orta et per X. annos jam durante. Interdum paroxysmos mitigavit. Saepius nullum praebuit effectum. v. Samml. für pract. Aerzte. Th. X. p. 138.)

Tiffot l. c. p. 341. (non magnum ex eo sperat fructum.)

Vater (A.) de specificorum antepilepticorum, sigillatim olei animalis virtutibus hujusque virtute et efficacia in curanda epilepsia rationibus et experimentis confirmata. Viteberg. 1725.

Docreri Pulvis antepilepticus.

Bierling (C. Th.) Adversar. curios. Jenae 1679. 4. app. p. 121.

Do-

Dolaei Draco fixans.

Dolaei (J.) Encyclop. medic. p. 156. (vaga compositio e $\bar{\sigma}$. nuc. mosch. Herb. Cardoben. Visc. quern. Sem. Paeon. Ciner. Talp. Ungul. Alcis. etc. Dos. $\text{ʒ} \beta$. — $\text{ʒ} \text{iv}$. Rarissime eum fefellisse contendit.)

Dolaei Pulvis antepilepticus.

Dolaei (J.) Encyclop. medic. p. 139. (ejus laudes.)

Paullini (C. F.) de Talpa. Francof. et Lips. 1689. 12. p. 178. squ. (laudat.)

Spina (D. de) l. c. p. 761.

(Formula: R. Cinnab. nativ. Mercur. dulc. aa $\text{ʒ} \text{ij}$. Margarit. Corall. ppt. aa $\text{ʒ} \text{j}$. Croc. Orient. gr. v. M. f. Pulv. cujus dos. gr. x—xv.)

Dolaei Spiritus antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 874.

(Formula: R. Rad. Paeon. $\text{ʒ} \text{j}$. Granor. Paeoniae Flor. Lil. conv. Tiliae aa $\text{ʒ} \beta$. Visc. quern. Corylini aa $\text{ʒ} \text{vj}$. Rasur. Cran. human. Corn. Alcis aa $\text{ʒ} \text{j}$. Affunde Spir. flor. Tiliae ad supereminentiam digitor. iv. Destill. ad reman. $\text{ʒ} \text{j} \beta$.)

Dolaei Tinctura antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 974.

(Formula: R. Sal. volat. Succin. Cranii human. aa $\text{ʒ} \text{j}$. Castor. $\text{ʒ} \text{ij}$. Infund. in Spir. Vin. qu. f. Digere et fiat Tinctura. Dos. gtt. xx.)

Dornerellii Aqua antepileptica.

Schroeder Pharmac. univers. p. 140. (formulam tradit.)

Dornerellii Pulvis antepilepticus.

Paullini (C. F.) Lagographia. p. 351.

Doronicum Pardalianches. (Radix.)

Alston Mater. medic. p. 437. (Albinum pro potu consueto per aliquot menses virgini epilepticae decoctum radicis hujus dedisse.)

Gesner (Conr.) Epistöl. medicin. L. III. edid. Casp. Wolf. Tiguri 1577. p. 18. 66. 74. (vel per se vel gentiana et astrantia mixtum saepius auxilio fuisse in epilepsia.)

Dresdensis Pulvis niger.

Schreger (B. N.) Kritisch. Dispens. d. specif. Mittel. p. 103.

Dre-

Dresserus Spiritus antepilepticus, v. *Felis* Leo.

Drosera rotundifera. (Herba.)

Kovacs Tatai l. c. p. 124. (annumerat specificis antepilepticis.)

Dulcamariae Stipites, v. *Solanum Dulcamara*.

Duriati Elixir uterinum.

Beaumes l. c. p. 205. (in hysterica laudat.)

Meyer D. sist. cautelas in paroxysm. verminosis etc. Gotting. 1783.

pag. 8.

Schreger (B. G. N.) kritisch. Dispensat. p. 251.

(Formula: R. Aiae foetid. \mathfrak{z} ij. Opii \mathfrak{z} β . Sal. volatil. Succin. \mathfrak{z} β .

Essenti. Castor. \mathfrak{z} iij. M. digere. Cola. Dos. gtt. xxx—xl. pro adulto.)

E.

Egfi Pulvis antepilepticus.

Jüngken (Jo. Helfr.) Chymia experimental. curiosa. Francof. 1681.

8. p. 498.

Eisennengeri Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 759.

(Formula: R. Ungul. Alc. Corn. Cerv. ppt. Margarit. ppt. Visc.

quern. Rad. Paeon. Sem. Cydon. ex cort. aa \mathfrak{z} j β . Tabell.

epil. Lang. \mathfrak{z} β . Fol. Aur. no. vj. F. Pulv.)

Electricitas.

Albanus et Boese, in Material. für Electriker. Liefer. II. Halle

1790. p. 174. (effectus salutaris exempla.)

Barneveld (W. von) mediz. Electricit. a. d. Holl. Leipzig 1787. 8.

p. 156. (Epilepsia aut a plethora aut vermibus orta ejus ope sanata.)

Beaumes l. c. p. 41. (efficacem saepius esse.)

Bertholon de St. Lazare Anwendung u. Wirksamkeit der Ele-

ctricität zu Erhalt. u. Wiederherstell. der Gesundheit; übers. und

mit neuen Erfahr. bereich. v. K. G. Kühn. Weissenfels u. Leipzig

1789. B. II. 8. p. 307. (Ab initio paroxysmi ex ejus usu ve-

hemen-

lementiores evadere solent. Tamen quiete nec non absque metu continuanda est electricitatis applicatio, deinde mox evanescentibus paroxysmis.)

Camoy, in Nouveaux Mémoires de l'Academ. de Dijon. Premier Semestre 1784. à Dijon 1784. p. 70. (cum levamine aegrorum tentata.)

Deimann (J. R.) von den guten Wirkungen der Electricit. in verschied. Krankh. Mit Anmerk. und Zusatz. von K. G. Kühn. Kopenhagen. 1793. Th. I. p. 187 — 193.

— — Th. II. (Kühnii additamenta continens.) p. 160 - 168. (Collectio experimentorum circa electricitatis vim in epilepsia institutorum.)

Deshais D. de hemiplegia per electricitatem curata. Mospeliæ 1749. recuf. in Halleri Collect. Dissert. pract. T. I. p. 19. squ. (Duorum epilepticorum simul hemiplegia laborantium paroxysmi electricitate mitigati et imminuti.)

Feller (C. G.) D. de therapia per electrum. Lipsiæ 1785. p. 23. (in epilepsia a mensibus retentis nullum vidit fructum ab electrica concussione. Paroxysmi e contrario exinde vehementiores.)

Feurstein Diff. cit. p. 81. (inter paroxysmos in auxilium esse vocandam et ita adhibitæ saluberrimos bina vice vidit effectus. Nonnumquam epilepsiam excitasse. Utile esse plerumque, quando debilitas et lentor adsunt, causæ morbi in obstructis aut suppressis excretionibus latere videtur. In spasmodis a nimia irritabilitate ortis negativam esse adhibendam.)

Franklin, in London Magazine. May, 1757. p. 211. (Virgo, a re-
gula ratione menstruationis tempore epileptica, succussionibus electricis sanata. Primo paroxysmi vehementiores.)

Kitz (F. C.) D. sist. Electricitatis in medicina usum et abusum. Gotting. 1787. 8. (passim.)

Kühn (K. G.) Geschichte der mediz. und physikal. Electric. Th. II. Leipzig 1785. 8. p. 239 311. (experimentorum circa electricitatem in epilepticis institutorum collectio.)

(p. 318. Ex LXXXIX. Epilepticis XLII. Parisiis a patre et filio Comus per Electricitatem esse sanatos.)

Kühn

Kühn Additament. ad Deimann. I. c. Th. II. p. 161. (Indicata est Electricitas in epilepsia a haemorrhagiarum exanthematumque suppressione et retentione, in epilepsia ab anaemia et systematis nervorum praeternaturali dispositione orta. Forſan et in epilepsia a vermibus. Fruſtra adhibetur in E. a venenis, bile acri, primarum viarum impuritatibus, plethora, irritamento peculiari nervo cuiſdam inhaerente et in haereditaria.)

(p. 165. Tria ſalutaris effectus exempla.)

Lindhuld, in Abhandl. der Schwed. Acad. d. Wiſſ. B. XV. p. 152.

Linnée (C. a), reſp. Petr. Zetzel, Conſectaria electrico-medica. Upſaliae 1754. (Ep. a terrore et haereditaria per electricitatem nec ſanata nec aucta.)

Lovet electricity rendered uſeful in medical intentions. Lond. 1760. (paſſim laudat.)

Mangin Histoire de l'electricité. P. III. à Paris 1752. p. 85. 87. (laudat.)

Mauduyt, in Mémoires de la Societ. Roy. de Medecine à Paris. Ann. 1777. 1778. (rejicit ejus uſum in epilepsia.)

Morris (W.), in Gentlemans Magaz. for the Year 1753. Auguſt. London. p. 379. (Ep. per ſuccuſſiones electricas ſanata.)

Poma et Arnaud, in Journal de Medecine. Vol. LXXII. 1787. p. 214. (non abſque fructu adhibita.)

Quarin (Joſ.) Animadverſion. p. 30. (in noſocomio Vindobonenſ. epilepticis non proſuiſſe.)

Rapport de M. M. Coſnier, Maloet, Darcet, Philipp, le Preux, Deſſelärz, et Paulet ſur les avantages reconnus de la nouvelle methode d'adminiſtrer l'electricité dans les maladies nerveuſes, particulièrement dans l'épilepsie et catalepsie pr. Mſr. le Dru, connu ſur le nom Comuſ. à Paris 1783. 8.

Extract. huj. libr. v. in Lichtenberg Magazin für d. Neueſte aus d. Phyſik u. Naturgeſch. B. II. St. II. p. 155. ſqu.

(Ex hiſce experimentis redundat:

1) Paroxyſmi primo frequentiores mox rariores evadunt, uſque dum plane effugiant.

2) Ele-

2) Electricitas, durante paroxysmo adhibita, paroxysmos ratione temporis et vehementiae mitigat.

3) Omnes secretiones et excretiones (praesertim menstrua) auget.

4) Motum muscularem excitat et roborat.

5) Nunquam secundum Cl. Comus methodum (scintillas educendo et balneum electricum adhibendo) nocet, sed aegroti vires inprimis digestionis roborat.)

Recueil sur l'électricité médicale. sec. Edit. T. II. à Paris 1763. 12. p. 389. 393. squ. (laudat.)

Sauvages Suite des expériences. p. 139. 142. (Duobus epilepticis simul hemiplegia laborantibus profuisse.)

Spengler (Lor.) Briefe und Erfahrungen über die Wirkungen der Electric. in Krankheiten. B. IV. Kopenhag. 1754. p. 39. (efficax in epilepsia a mensium suppressione.)

Stoll (Max.) Rat. medend. P. III. p. 410. (epil. inveterata, extracti Belladonnae usu mitigata, per electricitatem plane sanata.)

Symes essay on Electricity. p. 79.—81. (epilepsiae per electricitatem aut sanatae aut mitigatae observationes.)

The description and use of Nairne's patent electrical machine, with the addition of some philosophical experiments and medical observations. London 1787. 8. p. 80. (in ipso paroxysmo adhibita mitigat quoad vim et tempus. Brevi ante paroxysmum adhibita, unica concussio praeccludere potest paroxysmo aggressum.)

Wilhelm (H. M.) Observat. electr. med. Wirceburg. 1774. p. 148. (in epil. a terrore cum fructu adhibuit electricitatem.)

Electuarium anacardinum Zwölferi, v. Zwölfer.

Electuarium antepilepticum Anonymi cujusdam.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 303. (formula.)

Electuar. antepilept. Batci, v. Bate.

— — — *Cratonis, v. Crato.*

— — — *Fulleri, v. Fuller.*

— — — *M. D. Hettrur.*

Schroeder l. c. p. 303. (formula.)

Electuar. antepilept. Meadii, v. Mead.

Electuar. antepilept. Nicolai Florentini, v. Nicol.

— — — *Regii*, v. Reg.

— — — *de Spina*, v. Spina.

— — — *Terentii*, v. Terent.

— — — *Timaei*, v. Tim.

Electuar. fernatum Renodaci, v. Renod.

Elephas maximus. (Hepar.)

Plinii Histor. natur. L. XXVIII. cap. 8.

Elixir acidum Halleri, v. Haller.

Elixir antepilepticum Cratonis, v. Crato.

— — — *Crollii*, v. Croll.

— — — *et hyssericum*.

Schroeder l. c. p. 357. (formula.)

— — — *Freyeni*, v. Freyen.

— — — *Timaei*, v. Tim.

Elixir uterinum Durietii, v. Duriet.

Elixir vitae majus Quercetani, v. Quercetan.

Embrocha calida.

Kovacs Tatai l. c. p. 103.

Nardii (Joh.) Noctium genialium Ann. I. Bonon. 1656. 4. (epilepticos in regione Senensi iis levatos esse.)

Embrocha frigida.

Celsus de Medicina L. VIII. edit. Almelov. p. 172.

Marteau Abhandl. von den Bädern. p. 299.

Emeticum.

Brieu, in Journal de Medecine. T. XVI. à Paris 1762. p. 512. (exemplum eo sanatae epilepsiae.)

Chalmers (Lion.) Account of the Weather and Diseases of South-carolina. London 1776. (tempore paroxysmi datum proficuum.)

Diocles Carystius, v. Cael. Aurel. tardar. passion. L. II. c. 4. (jam emetin commendat in epilepsia.)

E. N. C. Cent. VI. obs. 58.

Ettmüller (M), rsp. Weinlich, D. de epilepsia. Lipsiae 1676. (laudat.)

Fasch (J.), rsp. Fuhrmann, D. de epilepsia. Jenae 1679. (laudat.)
Haen

- Haen (Ant. de) Rat. med. P. V. edit. altera. Vienn. 1763. p. 117.
(in gravida epileptica cum fructu adhibitum.)
- Marryat (Thom.) Handbuch d. pract. Arzneiw. f. denkende Aerzte;
a. d. Engl. Leipzig 1793. 8. p. 110. (commendat quoque in epi-
lepsia vomitorium siccum ab eo laudatum e vitriol. caerul. et
Tartar. emet. aa. gr. ijß. constans. Sumitur e dimidio aquae coch-
leari mane jejuno stomacho nec aliquid superbibitur, donec ma-
teria flava vel viridis evomatur. Tunc demum concedit spiritum
vini ad nauseam sedandam.)
- Maurer (F. Gu.) Comm. de medicam. antepil. Marburg. 1792. 8.
pag. 33.
- Meibom (B.), resp. S. Bucholz, D. de epilepsia stomachica. Helm-
stad. 1740.
- Müller, in Frankf. mediz. Wochenbl. Jahrg. I. Quartal 4. (laudat.)
- Praxagoras, v. Cael. Aurel. tard. pass. L. II. cap. 4. (jam eme-
sin commendat in epilepsia.)
- Richter chirurg. mediz. Bemerk. B. I. Götting. 1793. p. 142. (in
epilepsia habituali ultra materiam aut causam primam perdurante
nil melius vomitorio horae spatio ante paroxysmum dato ad aver-
tendum aut refringendum paroxysmum.)
- Satler (D. G.) D. de epilepsia. Traject. ad Rhen. 1697.
- Swieten (G. v.) Comment. in Boerh. aphor. T. III. p. 439.
- Tiffot l. c. p. 219. squ. p. 223.
- Unzer der Arzt. B. V. VI. (passim.)
- Wedel (G. W.), resp. J. Roefer, D. de epilepsia. Jenae 1673.
- Werlhof oper. omn. Vol. III. p. 726.
- Willis (Th.) pathol. cerebr. Oxoniae 1667. 4. (passim.) (vomitus
antimonialibus in epil. movere suadet.)
- Woodward (J.) Select Cases and observations in Physick. ed.
P. Templemann. London 1737. 8. (vomitus saepius avertere
epilepsiam.)
- Wucherer, resp. Welfsch, D. de epilepsia. Jenae 1719.
- Zacut. Lusitan. Prax. admir. Lib. I. obs. 24. 31. (Sanationis vo-
mitorio peractae exempla.)

Emplastrum Antepilepticum Cratonis, v. *Crato*.

— — — — *Michaelis*, v. *Michael*.

— — — — *Mynsichti*, v. *Mynsicht*.

— — *Aromaticum ad caput*.

Panaroli (Dominic.) Jatrologism. pentecost. V. Romae 1652. 4.
obf. 35.

Emulsio antepileptica Michaelis, v. *Michael*.

Enema antepilepticum Michaelis, v. *Michael*.

— — — — *Mynsichti*, v. *Mynsicht*.

Engelbardi Pulvis antepilepticus.

Jüngken (J. H.) Lexic. chym. pharmac. p. 310.

(Formula: R. Rad. Paeon. legitimo tempore effossae ʒij℞. Vale-
rian. ʒ℞. Visc. coryl. ʒj. Specif. cephal. ʒiij. Pulv. Mar-
chion. ʒj. Cinnab. nativ. praepar. ʒij. Chrysolit. alcoh-
ol. ʒ℞. Magist. Smaragd. ʒj. Corn. Rhinocerot. ʒj. Lapid.
specul. praepar. ʒ℞. Succin. alb. praep. ʒ℞.

M. F. P. Dos. ʒ℞. — ʒ℞.

Eus Veneris, v. *Cuprum*.

Equus Asinus.

Lac.

Burferii a Canilfeld Institut. medic. pract. Vol. III. Lipsiae 1787.
p. 258. (cum sapone mixtum, diutius et largiore dosi propinatum
laudari a Beccario, Professore olim Bononiensi.)

Tiffot l. c. p. 370. (valde laudat. Non tamen propinandum, dige-
stione vitiata, abdomine obstructo, alvo stipata aut mensibus
suppressis.)

Sanguis (gravidarum).

Normey (Ludw.) Versuch einer medic. Topographie von Berlin.
Berlin 1796. p. 193. sq. (hujus remedii empirici, a nonnullis me-
dicis Berolinensibus, nec non ab ipso auctore in epilepsia et con-
vulsionibus non absque fructu tentati, mentionem faciens hisce
verbis tradit adhibendi modum: „Es wird Leinwand mit dem
„Blute einer trächtigen frisch geschlachteten Eselin durch und
„durch getränkt und nachher getrocknet. Einige Stücke dieser
„Leinwand werden nachher zerschnitten und mit weißem Franz-
„wein

„wein infundirt, und von diesem Weine bekommen die Kranken
„täglich ein Spitzglas voll.“)

Stercus.

Macasii (Jo.) Prompt. Mater. med. p. 37.

Testes.

Gesner (Conr.) Histor. animal. T. I. Tiguri 1551. fol. p. 9.

Paullin (Chr. Fr.) Onographia f. de asino. Francof. ad Moen. 1695.
8. p. 222.

Equus Caballus.

Imperigines.

Diocles Carystius, v. Cael. Aurel. tard. pass. L. II. cap. 4.

Mammæ.

Macasii l. c. p. 17.

Materia a pullo equino neonato per vomitum ejecta, siccata, pulverisata.

Camerarii (Jo.) Memorab. Syllog. Gent. VIII. partic. 61.

Donzelius (Hieron.), in Consil. ad Scholz. Lib. XV. conf. 1. et 8.

Macasii l. c. p. 17.

Ernesii Principis Antepilepticum.

Heers (Henr. ab) Observat. medicin. Lugd. Bat. 1685. 12. p. 176.
(forfan ex oleo heraclino constare.)

Efox Lucius.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 1799. (os cruciforme in ca-
pite ejus.)

Essentia Cervi, v. Cervus Elaphus.

Essentia Dictamni albi, v. Dictamnus albus.

Essentia dulcis.

Kleinfeld Tractat von d. Essent. dulc. in Balding. N. Mag. f. A.
B. II. St. 5.

Schreger (N. B. G.) kritisch. Dispensat. p. 234. squ.

Woellner (Petr. Mich.) D. de epilepsia ejusque curatione medica-
mento specifico essentia dulcis nominato. Leidaë 1706. 4.

Essentia Hirundinum, v. Hirundo urbica.

Essentia Vitæ Kiesowii, v. Kiesow.

Err.

Ettmülleri Aqua antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 58.

(Formula: R. Fol. et Flor. Salviae \tilde{z} vj. Flor. Lil. convall. \tilde{z} iiij.
Lavend. \tilde{z} ij. Rad. Paeon. \tilde{z} iiij. Fol. et Flor. Majoran. \tilde{z} j.
Cinnam. \tilde{z} vj. Caryoph. \tilde{z} iiij. Macis. \tilde{z} ij. Infund. Vin. Rhen.
℞ xiv. Macer. p. XIV. dies et destill. F. Aqua.)

Ettmülleri Pulvis antepilepticus.

Spina l. c. p. 758.

(Formula: R. Pulv. Secundin. rite praep. \tilde{z} j. Rasur. cranii hu-
man. \tilde{z} vj. Castor. \tilde{z} j. Sal. Succin. \tilde{z} ij. Corn. Cerv. \tilde{z} j.
Elaeofacch. Macis. qu. f. F. Pulv.)

Evacuantia. cfr. Emetica, Purgantia etc.

Aetius Tetrab. III. Sect. I. cap. 18. (jam evacuantia in epilepsia a
fordibus suadet.)

Unzer der Arzt. B. V. VI. (passim.)

Extractum epilepticum Dispensf. Brandenburg.

Dispensator. Brandenburg. edit. ab Ernest. Fagino. Erford. 1734.
fol. p. 102.

(Formula: R. Rad. Angelic. Paeon. Pyrethr. āā \tilde{z} j. Fol. Majoran.
cum summit. impl. j. Fol. Rutae. Scord. āā impl. ℞. Flor. La-
vendul. Lilior. convall. Paeon. Rorismar. Stoech. arab. Lign.
Sanct. Visc. Corylin. Tiliacei aut Quern. Rasur. C. Alcis. Cervi.
Cranii human. non humat. Specier. diamosch. dulc. āā \tilde{z} j℞.
Castor. recent. \tilde{z} j℞. Conc. Cont. affunde Spiritus Vini Rhe-
nani aut saltem Gallici ad eminentiam digitorum jv. digere vase
probe obturato et munito, loco calido. Tinctum spiritum effun-
de, residuum exprime, per emporeticum filtra et in balneo,
juncturis exacte clausis, spiritum evoca, [qui epileptici vices
subire aptus, seorsim fervetur] residuum a Spiritu, ad mellis
spissiore consistentiam revocatum pro extracto epileptico
serva.)

Extractum epilepticum Junkeri, v. Junker.

— — — Offium, v. Offa.

— — — Zwölferi, v. Zwölfer.

Exul-

Exulcerantia. cfr. Cauteria. Exutoria. Fonticul. Mox. Setacea. Veficator.
Uft. Ulcer. arte fact.)

Alexand. Trallian. Lib. I. cap. 15. (jam in Ep. pedisympomat.
exulcerantium ad partem affectam applicationem commendat.)

Exutoria. (e cort. Daphn. Gnid. et Mezer. desumpta.)

Roy (le) Versuch üb. d. Gebrauch u. die Wirk. der Seidelbastrinde;
überf. von Junker. Strasburg 1773. (passim.)

Rumpel, in Act. Moguntin. ad Ann. 1778 et 1779. p. 10.

F.

Fausii Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 759.

(Formula: R. Pulv. Marchion. epilept. Angel. Sal. Magist. perlar.
orient. Corall. rubr. praep. aa gr. xv. Sal. Paeon. Cran. hu-
man. aa gr. vj. Hyper. gr. iv. M. F. P.)

Fel caninum, v. *Canis familiaris*.

Fel Haedi, v. *Capra Hircus*.

Fel Leonis, v. *Felis Leo*.

Fel Tauri inspissatum, v. *Bos Taurus*.

Fel Testudinis, v. *Testudo*.

Fel Ursi, v. *Ursus Arctos*.

Felis Catus. (Sanguis.)

Graaander, in Weckoskrift for Läkaren och Naturforskaren. B. X.
Stockholm 1791. (Sanguinem ex aure felis desumptum esse do-
mesticam medicinam contra epilepsiam in Bothnia australi.)

Macasii (J. G.) l. c. p. 31. (Sanguis felis nigrae laudatur.)

Felis Leo.

Cerebrum (— et oo).

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1745.

Fel.

Plin. Histor. natur. L. XXVIII. c. 8.

Sanguis.

Schroeder l. c.

Wir.

Wirdig (Sebast.) Nova medicina spirituum curiosa. Hamburg. 1688.
12. p. 151. (Leonem esse generosum, ejusque sanguini et spiritibus impressam esse generositatem; hinc epilepsiae mederi.)

Stercus.

Kovacs Tatai l. c. p. 120. (Siccatum et pulverisatum laudat. Adhuc praestantiorum esse spiritum ex eo destillatum, ex quo conficitur spiritus antepil. Dreisteus.)

Macasii (J. G.) l. c. p. 31.

Schroeder l. c. p. 1745.

Ferdinandi I. Imperatoris Antepilepticum.

Camerar. (Jo.) Syllog. Memor. Cent. VIII. part. 62. (constare e CrySTALL praep. Corall. rubr. praep. Margarit. orient. et Smaragd. orient.)

Ferrum.

Limatura Martis.

Cullen Anfangsgr. der pract. Arzneiw. Th. III. p. 185. (nil ex ejus usu sperat.)

Haller (Alb. ab) Oper. anatom. minor. argum. T. III. Lausann. 1768. 4. p. 378. (epilepsiae per eam, cum extract. Valerian. et cort. peruv. propinatam, sanatae exemplum.)

Lettfom, in Memoirs of the medic. Societ. of London. Vol. III. 1792. 8. n. 18. (Valerianae addita ejus efficaciam auget.)

Weikard (M. A.) Observat. medic. Francof. 1775. (ejus ope in connubio vitriol. alb. et cort. peruv. sanavit epilepsiam.)

Tinctura Martis belleborata.

Quarin (Jof.) Animadvers. p. 26. (gtt. xx — l. de die egregium in epilepsia praestare effectum, ubi corpus gelatinosis humoribus abundat.)

Ferula Aşa foetida. (Gummi.) (cfr. Durieta Elixir uterin. et Langii Tinctura antepil.)

Beaumes l. c. p. 205. (Musgravii et Wankersii laudes habet.)

Berger. (Fr.) D. de remediis specificis in Epil. usitatis. Francof. ad Viadr. 1795. p. 13. (Hysterico-epilepticis optimo cum fructu cum Valeriana dari.)

Gent.

Gentlemans Magazine, v. Comment. Lipsiens. T. IV. p. 72.

Kaempfer (Jo.) Enchirid. medic. p. 30. (laudat pilulas e Mercurio gummoso Plenckii, extracto Valerianae spirituofo, Asa foetida et Camphora, quarum usu plures epileptici a malo quoque inveterato liberati sunt.)

Tiffot l. c. p. 326. (efficacem esse in Epilepsia a pituita et vermibus.)

Ficus Carica. (Fructus.)

Plinii Histor. natural. L. XXIII. cap. 7.

Fioravanti Arcana antepileptica.

Fioravanti (Leonard.) Tesoro della vita umana. Venezia 1570. 8. Lib. II.

Fischeri Tinctura antepileptica Vitrioli.

Spina (D. de) l. c. p. 992.

(Formula: R. Camphor. Spodii. Rasur. Cran. hum. Unicorn. vel C. C. Sant. omn. aa ʒij. Corall. Visc. quern. Gran. Paeon. Rad. Paeon. aa ʒj. Pulv. et M. Ind. vitro strict. orific. superfund. Spirit. Vitriol. rectif. Stet in digest. calid. p. septim. iij—iv. Dein Spirit. tinctus a pulvere effundatur in aliud vitrum et bene claudatur.)

Flores Benzoes, v. Styrax Benzoin.

Flores Sulphuris, v. Sulphur.

Flores Zinci, v. Zincum.

Fonticuli.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. obs. 13. (Epil. in manu exordiens, fonticulo ibi applicato sanata.)

Anecdotes de Medecine. p. 124. (felici effectus observationum biga.)

Jacquinnelle, in Journ. de Medecine. T. LXXIV. (Epil. post nimis cito occlusum vulnus per amputationem factum, fonticulo ad brachium posito, sanata.)

Journal de Medecine. T. XXV. p. 47. (efficaciae exemplum.)

Malvicini (Jul.) utiles collectiones medico-physicae. Venetiis 1682. 4. (epil. fonticulo in futura coronali sublata.)

Merenti (Lud.) Consultat. medic. Conf. III.

Pisonis (Carol.) observat. med. pract. de morb. e colluvie serosa.
obs. 31. p. 173. (epil. fonticulo in futura coronali sanata.)

Pujati Decas observat. medic. p. 95. (efficaciae exemplum.)

Saillant, in Mémoires de l'Acad. roy. des Scienc. à Paris. T. III.
(epileps. ab abundantia humorum fonticulo ad brachium posito
sanata.)

Tiffot l. c. p. 244. (epil. pedisymptomatica fonticulo ad locum pri-
marie affectum et Valerianae usu interno profligata.)

— — — p. 379. squ. (ulterius de fonticulorum in epil. usu agit.
Suadet eorum applicationem:

1) in humorum praesertim depravatorum abundantia.

2) Acrimonia quadam in corpore circumvagante, hinc illinc parti
cuidam obsidente, a qua metastases metuendae sunt periculosae.)

3) Humoribus acerbis pertinacem jam ad hanc illamve partem ex-
ferentibus affluxum.)

(Cratonis Montanique quoque laudes fonticulorum habet.)

Willis (Thom.) Pathol. Cerebri. p. 27. (fluente epilepsia siluit, re-
diens occluso.)

Zacut. Lusitani Prax. admir. Lib. I. obs. 32. (Epil. ab occluso vul-
nere in lepore nasi per fonticulum ad tibiam sanata.)

Forlaffii Medicamentum contra Epilepsiam.

Des Dr. J. F. Forlaffe unschätzbare Arznei wider die Epilepsie, von
31 Personen bewährt gefunden; von D. L. L. B. 1711.

Formicarum thus.

Reusneri Observat. et experimenta. Ulm. 1676. 4. obs. 95.

Fowleri Solutio mineralis s. Liquor arsenicalis, v. Arsenicum.

Freycii Elixir antepilepticum.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 341.

Spina (D. de) l. c. p. 361.

(Formula: R. Spirit. Corall. Tartar. aa \tilde{z} jß. \tilde{z} ij. Sal. Cran. hu-
man. vol. Sanguin. hum. vol. Succin. vol. aa \tilde{z} j. M. st. in di-
gest. p. dies XIV. F. Elixir.)

Frictio.

E. N. C. Cent. I. obs. 85.

Ofian-

Osiander (F. B.) Lehrbuch d. Heilwissenk. Götting. 1796. p. 630.
(frictio in cordis scrobiculo et regione epigastrica instituta cele-
rem ei saepius praebuit fructum.)

Fulleri Electuarium antepilepticum.

Fuller (Thom.) Pharmacop. extemporan. Edit. VII. Amstelodam.
1717. 8.

(Formula: R. Pulv. Cort. peruv. ℥vj.
Rad. Serpent. Virgin. ℥ij.

M. f. c. Syrup. Paeoniae qu. f. Electuarium molle.

Si post debitas evacuationes adultis electuarii ℥j. aliis minor dosis
mane et vespere per tres vel quatuor menses exhibeatur et postea
per triduum vel quatrimum ante novilunium repetatur, eradicare
penitus morbos epilepticos et hystericos.)

Fulleri Tinctura antepileptica.

Fuller (Thom.) l. c.

(Formula: R. Castor. opt. ℥℞. Succin. flav. pulverif. Croc. angl.
aa ℥ij. Flor. Lilior. convall. ℥j. His affunde Spirit. Vin. cam-
phor. Lavendul. compos. Sal. ammon. aa ℥iv. Digere absque
calore p. dies VI. in vitro probe clauso; postea filtret. F. Tin-
ctura. Dos. ʒj — ℥j.

Fumigatio.

Baldinger N. Mag. f. Aerzte. B. XII. p. 481. (Joann. Hornschuh,
pseudomedicum prope Isenacum habitantem, amuletorum et fumi-
gationum ope epilepticorum sanationem tentare.)

Bierling (C. Th.) Adversar. curios. Jenae 1679. 4. (Epil. sulphu-
ris suffitu sanata, saltem mitigata.)

Kovacs Tatai l. c. p. 104. (formulam tradit.)

G.

Galega officinalis. (Herba.)

Cruiso (J.) Thesaur. medicamentor. euporist. London. 1701. 12.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1251. (Succi Cochl. j.)

Galium Mollugo. (Flores c. Herba.)

Anonymus quidam, in Gardane Gazette, 1773 et 1774. p. 223.
(queritur de inconstantia hujus remedii in epilepsia.)

Chomel Usuelles. T. II. p. 25. (laudat.)

Jourdain, in Gardane Gazette, 1773 et 1774. p. 19. (Succum expressum ab \mathfrak{z} iv. ad v. mane jejuno stomacho haustum laudat.)

Galium verum. (Flores. Summitates.)

Bonafos (pater et filii), in Richard de Hauteferk Recueil d'observat. en Medecine. T. II. à Paris 1772. p. 499. (laudant succum expressum ad \mathfrak{z} iv. mane ingerendum, qui sudorem plerumque movet, in lecto probe procurandum. Confert et infusum saturatum. Proficuum erat nominationi in puella novenni per biennium epilepsia correpta et folia aurantiorum perperam experta.)

Chomel Usuelles. T. II. p. 24. (In Catalonia vulgarem esse medicinam. In epilepsia infantum florum succum expressum ad cochleare j. datum exoptatam praestitisse efficaciam, praesertim si alvus simul laxetur.)

Gardane Gazette de Santé. 1776. p. 73. (Sudorem vehementer movere.)

Lieutaud Synops. prax. med. p. 768. (flores laudat vel in substantia a gr. iv — viij. vel succum expressum ab \mathfrak{z} β — \mathfrak{z} j.)

Müller D. de clematide vitalba. Erlang. 1786. (laudat flores.)

Taury, v. Murray Appar. Medicam. T. I. p. 371. (usum esse vel Ore ad \mathfrak{z} j. usque vel decocto ex impl. j. pro aquae pinta.)

Garidelli Opiatum antepilepticum.

Bouteille, in Journ. de Medecine. 1777. Fevrier. v. Samml. aus-erles. Abhandl. f. pr. Aerzte. T. IV. p. 313.

Garidel Histoire des Plantes de Provence. p. 350.

Schreger kritisch. Dispensator. p. 81. (constare e Sem. Cumini roman. Flor. et Fol. Menth. Succ. Chelidon. et Melle.)

Gelatina Cornu Cervi antepileptica de Spina.

Spina (D. de) l. c. p. 533.

(Formula: R. Rafur. Cran. hum. Corn. Cerv. aa \mathfrak{z} vj. Ungul. Alc. Ebor. aa \mathfrak{z} ij. Flor. Paeon. Tiliae. Lil. conv. Anthor. aa \mathfrak{z} j. Succ. Citr. \mathfrak{z} viij. Acet. Vin. \mathfrak{z} x. Coqu. et Cola. F. Gelatina.)

Genipi

Genipi veri Herba, v. *Achillaea*.

Gentiana Centaureum. (Herba.)

Schroeder Pharmacop. universal. p. 1175. (Canerarium laudasse.)

Glecoma Hederacea. (Herba.)

Aqua destillata.

In Pomerania, vicinisque regionibus infantibus epilepticis qua remedium domesticum porrigitur.

O'cum destillatum.

Medicina experimental. Dygbaean. Francof. 1687. 8. Th. II. p. 320. (laudatur contra epilepsiam.)

Glossopetra Melitensis.

Kovacs Tatai l. c. p. 115. (a Th. Bartholino et Hofmanno esse usitata in epilepsia a 3j — 3j.)

Schroeder Pharmacop. universal. p. 624. (externe et interne.)

Gmelini (J. C.) Pilulae antepilepticae.

Comm. litter. Noric. Norimb. 1733. p. 195.

(Formula: R. Sanguin. pullul. hirundin. vivent. ad extract. consistent. inspiss. Oliban. aa. Forment. leg. art. pil. Dos. omni tri-duo 3j — 3ß. appropinquante paroxysmorum periodo.)

Gratiola officinalis. (Herba. Extractum.)

Sommer (C. B.) de virtute et vi medica Gratiolae officin. in curandis morbis tam internis quam externis. Rigae 1796. 4. (Sequentes pilulas in Epil. ei efficaces sese praebuisset:

R. Extr. Gratiol. 3ij. Cort. Aurant. 3ß. M. f. c. pulv. rhei qu. f. pilul. p. gr. ij. Consp. 3. sem. Lycop. Quater in die n. ij.)

Guaiaacum officinale. (Lignum. Decoctum.)

Craton. a Craftsheim Consil. et epistol. p. 262. (ejus vires in epil. negat.)

Fallop. de morb. gallic. cap. 48. (laudat.)

Forest. Observ. med. Lib. X. obs. 58. 63. (laudat.)

Gasser (Achill.) Observ. med. obs. 5. (laudat.)

Guargant (Horat.) Respons. varia. fol. 125. (laudat.)

Hofmann (Fr.) Medic. rat. syst. T. IV. P. III. C. I. p. 21. (Alphonf. Ferreum et Leonhard. Jachinum citat, qui decocti usum bis de die ab 3vj — 3viij. sat satis in epil. efficacem comprobant.)

Hor-

Horstii (Greg.) Oper. omn. T. III. Norimb. 1660. fol. p. 32. (ventilatur quaestio: An sit proficuum epilepticis ligni Guajaci decoctum?)

Mercurialis (Hieron.) Respons. et Consult. L. II. c. 3. (laudat.)

Sennert (Dan.) Prax. medic. Lib. I. cap. 31. (laudat.)

Vesalius (Andr.) de usu lign. Guajaci in epilepsia, in Laur. Schol-
zii Consil. et epistol. Francof. 1598. fol. (laudat.)

Willis (Thom.) de morb. convulsiv. p. 460.

Zacut. Lusitan. Princ. histor. Lib. I. cap. 6. et L. II. cap. 1.

Gutteta (Pulvis de).

Pharmacop. Parisiens. 1732. p. 61.

(Sequentem exhibet formulam:

R. Rad. Paeon. mar. Sem. Paeon. Diptamn. alb. Visc. quern. aa ʒ℞.
Semin. Atriplic. ʒij. Cran. human. ʒiiij. Corall. rubr. ppt.
Hyacinth. ppt. aa ʒj. Ungul. Alc. ppt. ʒ℞. Foliol. Auri ʒj.
M. f. p.) (Recentiora dispensatoria formulam variarunt.)

Tiffot l. c. p. 339. (superfluis annumerat.)

H.

Halenfis Pulvis niger.

Kleinfelds Tractat, in Balding. N. Magaz. f. A. B. II. St. 5.

Schreger (B. N. G.) kritisch. Dispensat. p. 237. (constat e residui
nigr. sacchar. gr. xxv. Vitriol. mart. gr. x. Cinnabar. gr. ij.
Dof. gr. ℞ — j. ter in die in eclampsia infantum.)

Halleri Elixir acidum.

Hirschel l. c. p. 35. squ.

Weikard (M. A.) Observat. medic. Francof. 1775. 8. (efficaciam
ejus in epil. pertinaci expertus est.)

Zimmermann, v. Feuerstein l. c. p. 80. (multo cum fructu in
epil. propinasse.)

Hartmanni Aqua antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 58.

(For.

(Formula: R. Flor. Lil. conv. impl. ij. Vin. gener. qu. f. Diger. p. dies X. dein adde flor. Tiliae ℥℥. Paeon. ℥iv. destill. in M. B. ad ficit. Rad. Paeon. ℥j. Dictamn. alb. Visc. quern. Cran. hum. ppt. āā ℥℥. Rad. Pyrethr. ℥℥. Castor. ℥ij. Fol. Rut. impl. j. Fl. Stoechad. arab. Lavend. āā P. iv. Cubeb. Mac. āā ℥ij. Cinnam. ℥j. Scill. ppt. ℥ij. Diger. p. dies XV. Hinc dest. p. Alemb. in M. B. Dos. ℥℥ — j.)

Hartmanni Pulvis antepilepticus.

Majerne Prax. medic. p. 23.

Spina (D. de) l. c. p. 758.

(Formula: R. Cinnab. nat. ℥℥. Magist. corall. perlar. āā ℥ij. Croc. ℥j. Fol. Auri. n. x. M. F. P.)

Hartmanni Rotulae antepilepticae.

Spina (D. de) l. c. p. 822.

(Formula: R. Rad. Paeon. ℥j. Magist. Perl. Corall. āā ℥j℥. Cran. human. ℥℥. Sacch. in aqu. flor. Til. sol. F. R.)

Hartmanni Spiritus Vitrioli antepilepticus puerorum.

Kovacs Tatai l. c. p. 116. (laudat.)

Spina l. c. p. 893.

(Formula: R. Vitriol. Ungar. depur. ℥iv. Urin. pueror. sanor. recent. coll. ℥iv. Digere vase clauso aliquamdiu in M. B. postea ex eodem vase destill. ad ficit. duplex phlegma, quorum primum insigne est paregoricorum ad dolores podagricos aliosque suaviter demulcendos, alterum est insigne ophthalmicum ad quaevis oculorum vitia utilissimum. Caput mort. pulveris. ex retorta valida terrea Δe nudo, sed tamen ab initio valde lente in excipulum capax urge, prodeuntibus confestim spiritibus liquor promanat pretiosissimus. Frei odoris et austeriusculi saporis, qui per retortam semel atque iterum rectificatus et reservatus omnem puerorum epilepsiam radicitus tollit.)

Heidleri Pulvis antepilepticus.

Bierling (C. Th.) Advers. med. pract. p. 114.

Helix Pomatia. (Cochleae.)

Kaempfer (Jo.) Abhandl. von einer neuen Methode, die Krankh. des Unter-

Unterleibs zu heilen: p. 290. (familia quaedam pulverem e gyris cochlearum et margine chelarum cancrorum praeparatum felici cum successu contra epilepsiam propinavit.)

Kaempfer (Jo.) Enchiridion medicum. Francofurt. et Lipsiae 1778. 8. p. 28. (Per multos epilepticos tam adultos [et si nullum acidi indicium] quam infantes pulveris cochlearum et lumbricorum terrestrium [ab aliis, quibus arcano fuit, propinati] usu sanatos esse observavit.)

Helleborus albus, v. *Veratrum album*.

Helleborus niger. (Radix.)

Greding (J. E.) sammtl. mediz. Schrift. T. I. p. 189. (cum fructu dedit epilepticis pulverem radicis.)

Extract. e radice paratum aquosum.

Bouteille, in Journ. de Medecine 1776. Decembr. p. 544.

1777. Janvr. p. 63.

v. Samml. auserl. Abhandl. f. pract. Aerzte. B. IV. St. 2. p. 313.

(efficaciam ejus a gr. v — xx. interdum expertus, praecipue in epilepsia cum mentis alienatione proficuum esse putat.)

Helvetii Antepilepticum-puerorum, v. *Vitriolum caeruleum*.

Hepar Canis, v. *Canis familiaris*.

— — *Elephantis*, v. *Elephas maximus*.

— — *Lupi*, v. *Canis Lupus*.

— — *Lutrae*, v. *Lutra vulgaris*.

— — *Perdix*, v. *Tetrao Perdix*.

— — *Ranarum*, v. *Rana*.

Heracleum Spondylium. (Herba.)

Medical Papers communicated to the Massachusetts medical Society. Number. I. Boston 1790. n. 3. (Experimenta circa hoc remedium in epilepsia tentata efficaciam non probantia.)

Plinii Histor. natural. L. XXIV. c. 6. (ex aceto utile.)

Heracelinum oleum, v. *Oleum heracelinum*.

Hirudo medicinalis. (Chirurgica applicatio.)

Dolaei Encyclop. medic. p. 146.

Gazette salulaire. 1775. (ad anum applicata, sustulit epilepsiam a suppressis haemorrhoidibus, restituto fluxu haemorrhoidali.)

Juy-

Juymes, in Journ. de Medecine. T. LIV. p. 425.

Saur, in Svensk. Vet. Acad. Handl. Vol. XXXIV. Stockholm 1773.
p. 92. (ad tempora, pone aures et circa collum paroxysmos epilepticos rarefecit.)

Sylvaticus (Bened.), in Theoph. Boneti Mercur. compilat.
art. Epileps. §. 40. (ad anum per menses continuata epilepsia sanavit.)

Tiffot l. c. p. 267. 269.

Tulpil (N.) Observat. Lib. I. obs. 56. (ad anum.)

Zacut. Lusitan. Prax. admir. Lib. I. obs. 26. (ad muliebria epilepsiam post partum sanavit.)

— — — obs. 28. (ad anum epil. a haemorrhoid. suppress. sustulit.)

? *Lapilli?* (interne.)

Mizaldi (Ant.) Cent. I. aph. 22.

Hirundo urbana.

Bartholin. (Thom.) Epistol. medic. Cent. II. p. 436.

E. N. C. Dec. II. Ann. IX. obs. 54.

Wirdig (Sebast.) Medicina spirituum curiosa. Hamburg. 1688. 12.
p. 229. (Hirundines in epilepsia efficaces esse, quia in hieme morientes, vere autem quasi iterum resurgentes palingenesias signaturam habent.)

Aqua destillata.

Quercetan. (Jof.) de praeconum philosophorum verae medicinae praeparationis modo. Genevae 1603. 8.

— — — Tetras gravissimorum totius capitis affectuum.
Marburg. 1606. 8. p. 148.

Aqua Hirundinum Pharmacop. Augustav.

Spina l. c. p. 71. (formula.)

— — — *Fischeri*, ib. p. 73. (formula.)

— — — *le Mort*, ib. p. 74. (— —)

— — — *Rolfinci*, ib. p. 73. (— —)

— — — *de Spina*, ib. p. 71. (— —)

— — — *Zwölferi*, ib. p. 74. (— —)

Cor.

Macasii (J. G.) Prompt. Mater. med. p. 11.

Essentia Hirundinum.

Medicina experimental. Dyglacana. T. II. p. 122.

(Formula. Dos. ʒj. in die.)

Sylvatici (Bened.) Consil. et respons. med. Cent. IV. Patav. 1656.
fol. (laudat.)

Sanguis.

vid. Gmelin. Pilul. antepilept.

Hofmanni Aqua cathartica.

Spina (D. de) l. c. p. 44. (et in epileps. laudatur.)

Hofmanni Balsamum epilepticum.

Spina l. c. p. 169.

(Formula: R. Extr. Rutae ʒij. Castor. ʒj. Ol. d. Succin. ʒʒ. Junip. gtt. vj. Theriac. Androm. ʒij. Camphor. gr. v. Misc. F. Balf. In Paroxysmo epileptico cum hocce balsamo nares et vertex capitis inungantur, bis vel ter in die.)

Hofmanni Liquor anodynus mineralis.

Hofmanni (Fr.) Medic. ration. system. T. IV. P. III. p. 20. (leniendo profuisse testatur.)

Hofmanni Pilulae antepilepticae.

Spina l. c. p. 701.

(Formula: R. Ladan. depur. ʒj. Extr. mass. pil. coch. ʒj. Succ. alb. ppt. ʒʒ. Sal. vol. succ. Sangu. human. aa gr. xij. Res. Jalapp. ʒj. Mosch. gr. v. Ambr. gr. vij. F. c. ʒ fl. Tiliae Pilulae.)

Hofmanni Pilulae antepil. praeservativae.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 472.

Hofmanni Pulvis epilepticus.

Spina l. c. p. 760.

(Formula: R. Cinnab. nativ. ʒj. Unicorn. veri. ʒj. C. C. ust. ppt. ʒij. Visc. quern. in leone decerpt. ʒij. Terr. sigill. ver. ʒiij. Magist. Corall. Perlar. aa ʒʒ. Cinnamom. ʒj. M. F. P. Dos. ʒʒ — ʒʒ.)

Homo.

Homo.

Cerebrum.

- Hirschel l. c. §. IV. p. 5.
Cerebri human. ▽ destill.
 Schroeder Pharmacop. univers. p. 1744.
Cerebri human. Spirit.
 Hartmann (Jo.) Prax. chymiatr. p. 19.
 Schroeder l. c. p. 1744.

Cor.

- Macasii (J. G.) Prompt. mater. med. p. 12. (pulverisat. hominis scelerati breviter ante mortem graviter perterriti.)
 Schroeder l. c. p. 1745.

Cranium.

- Cortesii (Jo. Bapt.) Miscellan. med. Decad. II. Messan. 1625. fol.
 (non apparere, quare ossa cranii epilepsiae opitulentur.)
 E. N. C. Dec. I. Ann. II. obs. 28. 53. Schol. p. 99. (laudes.)
 Erasii (Thom.) Disput. IV. p. 135. (ejus usum diabolus docuisse.)
 Henault (Nic.) et Guill. Desdarnes D. Non ergo epilepsiae
 cranium humanum. Paris. 1611.
 Lemnii (Levin.) de miraculis occultis naturae. L. IV. Francofurt.
 1590. 12. p. 148. (mari a cranio masculino, foeminae a foemino
 esse propinandum.)
 Moor (Barthol. de) Patholog. cerebri. (passim laudat.)
 Plinii Histor. natur. Lib. XXVIII. cap. 1.
 Schroeder Pharmacop. univers. p. 1741. (praecipue os triquetrum.)

Cranium calcinatum praeparatum.

- Schroeder l. c. p. 1742.
Cranii Extractum s. Gaiæda Theophrasti.
 Schroeder l. c. p. 1743.

Cranii Magisterium.

- Quercetani (Jos.) Tetras etc. p. 325.
Cranii Magisterium compositum.
 Schroeder l. c. p. 1742.

Cranii Oleum et Spiritus.

- E. N. C. Dec. II. Ann. VI. obs. 37.

Medicin. experiment. Dygbaean. T. II. p. 352. (praeparationem docet. Dos. in epil. gtt. x — xx.)

Schroeder l. c. p. 1742.

Cranii Offa sesameidea.

Pourftein (J. H.) Diff. cit. p. 91. (eorum mentionem facit.)

Cranii Sal volatile.

Schroeder l. c. p. 1742.

Cranii Tinctura.

Schroeder l. c. p. 1742.

Cranii Usnea.

E. N. C. Dec. I. Ann. II. obs. 53.

Schroeder l. c. p. 1333. et p. 1743.

Crinium e regione pubis cinis.

Eahner Magaz. für die popul. Arzneik. B. I. Hest 6. Frankenhausen 1785. 8. p. 339. (a matre infantis desumptarum in eclampsia infantum.)

Cutis Capitis mitrae inflar gestata.

Macasii (J. G.) Promptuar. Mater. med. p. 14.

Dentes pulverisati.

E. N. C. Dec. II. Ann. VI. obs. 122.

Funiculi umbilicalis pars infantilis.

Macasii (J. G.) l. c. p. 33. (exsiccata, delapsa, pulverisata. Hanc ob causam obstetrices eam patri conservandam dare.)

Sanguis.

Bartholin. (Thom.) de sanguine vetito. Francof. 1673. 8. p. 8. squ.

Bartholom. Anglicus de proprietatibus rerum. Nuremb. 1483. fol. L. VII. cap. 9. (Tres sanguinis guttae per scarificationem e scapulis extrahendae et cum ovo corvi in fine accessionis aegroto offerendae.)

Bierling (C. Th.) Medic. theor. pract. p. 935. (laudat.)

E. N. C. Dec. I. Ann. X. obs. 149. (inefficaciae exemplum.)

Langii (Jo.) Epistol. medicinal. Hanov. 1605. Lib. I. epist. 14.

Platearii (Jo.) Practica brevis. Venet. 1497. fol. (sanguinem de scapulis ope cucurbitulae eductum cum ovis corvi post finem paroxysmi aegro dat bibendum.)

Reyes

Reyes Campus Elysius quaestionum jucundarum. Quaest. 71.
p. 949. 950.

Schaper (J. E.) Medicinae curiosae duabus quaestionibus enodatae
specimen. Rostoch. 1703. Quaest. 11.: An sanguis hum. calidus
epilepsiae remedium? Negat.

Tiffot l. c. p. 351.

Tulpii (Nicol.) Observ. med. L. IV. obs. 4. (epilepsia ex ejus usu
aucta.)

Verzascha (Bernard.) Observat. medic. Centur. Basil. 1677. 8.
(frustra et malo cum eventu epotus.)

Sanguis decollati hominis.

Bresl. Samml. Verh. XVI. p. 654. XXIX. p. 222. (vituperatur.)

Macasii (J. G.) Prompt. mater. med. p. 25. (laudatur.)

Riedlini (Vit.) Iter medic. p. 44. (vituperatur.)

Sanguis epileptici.

Aetius. Tetr. II. Sermon. II. cap. 15. (collapsos statim excitari, si
sanguis e pollice pedis aegroti vulnerato labiis illinatur.)

Bartholin. (Th.) Observ. Cent. II. hist. 78.

Camerar. (Jo.) Syllog. memorab. med. Cent. XVI. partic. 43.

Sanguis gladiatorum romanorum jugulatorum.

Celsus (Aur. Corn.) de Medicin. Lib. I. c. 34. edit. Almel. p. 174.

Plinii Histor. natur. Lib. XXVIII. cap. 1.

Sanguis menstruus prima vice eruptus.

Ettmüller (Mich.) Opera omn. T. I. p. 785.

Macasii (J. G.) l. c. p. 33.

Schroeder l. c. p. 1726. (ficcatus.)

Sanguinis Oleum destillatum et rectificatum.

Garmann (Chr. Fr.) de miraculis mortuorum. Lipsiae 1681. 4.

Lib. II. Tit. II. §: 69.

Helmont (J. Bapt. van) Tr. de aura vitali.

Schroeder l. c. p. 1736.

Sanguis paternus.

Camerarii (Jo.) Syllog. memor. Cent. XVI. partic. 34.

San-

Sanguinis Quinta essentia.

Medicina experiment. Dygb. T. II. p. 339. (praeparandi modum docet. Dos. gtt. iv.)

Sanguinis Spiritus.

Schroeder l. c. p. 1736.

Waldschmidt (J. Jac.) Oper. med. pract. Francof. 1695. 4. p. 311.

Secundinae humanae.

Finkii Enchirid. dogmat. hermet. c. 5.

Hirschel l. c. §. IV. p. 5.

Koenig. (Eman.) Regnum animal. Basil. 1682. 4. Sect. III. Art. II. pag. 258.

Langii (Christ.) Oper. omn. T. II. p. 137.

Lentilii (Rosin.) Miscell. medic. p. 37.

Maçarii (J. G.) Prompt. Mater. med. p. 29. (primiparae.)

Schroeder l. c. p. 519. (Pulvis secundinarum.)

Schurig (Mart.) Embryologia. Dresdae et Lips. 1732. 4. p. 379.

Secundinarum Spiritus.

Dolaei (Jo.) Encyclop. medic. p. 140.

Michaelis (Jo.) Oper. medic. Norimb. 1688. 4. p. 682.

Schröder l. c. p. 1727.

Waldschmidt (J. Jac.) Oper. med. pract. p. 682.

Stercus.

Ettmüller (Mich.) Oper. omn. T. I. p. 215.

Lancilotti Guida nuova alla Chymica. p. 34. (aqua ex eo destillata.)

Urinae Spiritus antepilepticus.

Schroeder l. c. p. 1726.

Urinae Spiritus crystallifatus.

Schroeder l. c. p. 1730.

Vertebrarum hominis violenta morte peremti Rasura.

Feurstein (J. H.) l. c. p. 91. (ejus mentionem facit.)

Hyacinthus orientalis. (intrat varios pulveres antepil. c. g. ☞ de gutteta, panonic. rubr. etc.)

Hyoscyamus niger. (Herba.)

Extractum.

Bang (Fr. L.) Prax. med. nosoc. Frider. Havniae 1789. p. 365.

Col.

Collin (H. J.) Observ. Vol. II. p. 148. (dedit convulso a gr. xxiv. -- 3 ℔. Foucquet, in Journ. de Medec. T. LVI. p. 441.

Greding (J. E.), in Adversar. medic. pract. Vol. I. P. I. p. 71. sq.

— — — sämmtl. mediz. Schrift. Th. I. p. 36. (multa circa hujus remedii in epilepsia efficaciam tentavit experimenta. Per breve temporis spatium paroxysmos quidem mitigare, tamen non absque omni periculi metu propinari posse, nec tanti frugis ex ejus usu esse sperandum, quanti a quibusdam putatur. Dedit ab initio gr. j. ter de die; dein gr. xvij. per diem.)

Lentin (Fr. B.) Beobacht. der Krankh. am Oberharze im Jahre 1777 und 1778. Dessau 1783. (proluit ei.)

Sauvages Nosol. method. T. II. p. 306. (imminuit paroxysmum.)

Stoerk (Ant.) Libell. de Stramon. Hyoscyam. Vindob. 1762.

— — — Continuat. experim. Vindob. 1765. p. 112. (primus ejus usum praecipue tentavit. Dedit gr. j. bis vel ter in die, sensim augendo dosin ad gr. viij. usque.)

Senien.

Mayerne (Theod.) Syntagma praxeos medicae. P. I. London. 1690.

8. p. 23. (a gr. vj. vel viij. sensim ad gr. xxiv. ascendendo, ex cochleari succi sempervivi ultra XL. dies usurpandum.)

Scardona (Jo. Fr.) Aphorism. de cognoscend. et curand. morb. Padovae 1746. Lib. I. c. 8. (anceps esse et periculosum remedium.)

Hypericum perforatum. (Herba.)

Quercetan. (Jos.) Pharmacop. dogmat. cap. 9.

Riverii (Lazar.) Observat. med. Cent. I. obs. 16. Cent. II. obs. 16.

Schroeder (Jo.) Pharmacop. universal. p. 1279.

Hyssopus officinalis. (Herba.)

Forest. (Petr.) Observat. Lib. X. obs. 53.

Ruland (Mart.) Curat. empir. Lugd. 1628. 8. Cent. X. curat. 95.

Sennert (Dan.) Institut. pract. Lib. I. P. II. c. 31.

Schroeder l. c. p. 1281. (Hyssopi c. ∇ paeoniae decocti in epilepsia laudes ex Alexandro Tralliano et Camerario habet, nec Matthioli pilul. e Hyssopo et Paeonia in epil. laudatas.)

I.

Ignatia amara. (Ignatiana Philippinica Loureiro. Faba.)

Acta Berolinens. Dec. II. Vol. X. p. 12. (laudatur.)

Herrmann (Paul.) Cynosur. mater. med. T. II. p. 231.

Loureiro Flora Cochinchin. Tom. I. (convulsiones dispellere affirmat et a gr. vj — xij. concedit aqua vel vino captam.)

Stein (G. A.) D. de faba St. Ignatii. Erlang. 1793. 8. (Virgo annorum XXVII. plures per annos ex terrore epileptica et quotidie paroxysmis vexata omni mane pulveris gr. iij. cum Sacchar. gr. xxxvj. et aequalem dosim appropinquante paroxysmo sumens intra bimestre ab epilepsia liberata est.)

Valentini (M. B.) Historia simplicium reformat. p. 198. (Exemplum ea peractae sanationis infantis tenelli septies jam paroxysmo epileptico afflict.)

Imperatoria Ostruthium. (Radix.)

E. N. C. Dec. I. Ann. IV. obs. 42. (radicem recentem pollicibus pedum manuumque applicatum epilepsiae remedium esse.)

Miscell. curios. Ann. IV. obs. 38.

Licifiones. cfr. *Scarificatio.*

Mead (Rich.) de imperio solis et lunae in corpora humana. London. 1704. 8. (commendat.)

Praxagoras et Themison, v. Cael. Aurelian. tard. passion. L. II. c. 4. (jam incisiones in cutem occiput tegentem usitasse.)

Infusoria Chirurgia, v. *Chirurgia infusoria.*

Disitio Scabiei.

Gazette salulaire de Bouillon, 1775. p. 42. (epilepsiam a scabie retrograda sustulit.)

Löffler's Beiträge zur Wundarzneik. B. I. Leipzig 1791.

Insitio Tinea.

Beaumes, in Gazette salulaire de Bouillon, 1790. IV. (infantibus epilepticis proficuum putat ob derivationem acrimoniae irritantis ad cutis superficiem. Hoc illustrare studet casu quodam in: Journal de Medecine 1789. Novembr. enarrato.)

Ipecacuanba, v. *Cynanchum Ipecacuanba.*

Iſis nobilis. (Corallia rubra.)

Pulvis.

Intrat varia composita antepileptica, e. g. pulverem epil. marchionis, de gutteta, pannon. rubr. etc.

Tinctura.

Medicina experiment. Dygb. T. II. p. 358.

Juglans nigra. (Glandes tost. ad pot. coffeiform.)

Marx (M. J.) beſtät. Kräfte d. Eicheln. Hannover 1781. p. 24. (Epil. ab onania iis ſanata.) p. 28. — — p. 34. Obſervat. Blochii Berolinenſis.

Jüngkenii Aqua antepileptica.

Jüngken (J. H.) Lexic. chym. pharmac. P. II. p. 53.

(Formula: R. Aquae Lil. conv. Fl. Tiliae. Ceraſ. nigr. Roſar. a roſ. recent. ſaepius cohobat. āā ℥ij. His mixtis ſucceſſive immergantur Flor. Cheiri, Tunicae āā ℥iij. Lavend. Anthos āā ℥j℔. Herb. Majoran. recent. Thym. āā ℥j. Cinnam. acut. ℥iv. Mac. Cardam. Cubeb. āā ℥℔. Maceratione per tempus facta, ſi lubet, deſtillantur, roſtro-capitelli immiſſa Ligni Aloes ℥℔.)

Jüngkenii Balaſamum epilepticum.

Jüngken (J. H.) l. c. p. 99.

(R. Balaſam. Rutae, Succini āā ℥j. Axung. Caſtor. ℥℔. Camphor. gr. v. M. F. Balſ. quo nares et vertex inungantur in paroxyſmo.)

Jüngkenii Pulvis antepilepticus.

Jüngken (J. H.) l. c. p. 310.

(R. Rad. Valerian. Pulv. Secundin. puelli primogeniti ſiccatae āā ℥℔. Succin. alb. praep. Smaragd. praepar. Cinnab. nativ. praep. āā ℥j. Caſtor. ℥ij. Camphor. ℥j. M. F. P. Doſ. ℥j — ℥j. Eſſe pulverem quoad ſaporem quidem ingratum, ſed quoad effectum omnibus aliis palmam diſputantem.)

Juniperus communis. (Baccae.)

Act. Erud. Lipſ. 1691. Februar. p. 58. (efficaciae exemplum.)

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1210.

Spiritus.

E. N. C. Dec. II. Ann. VIII. obſ. 60.

Z

Jun-

Junkeri Extractum antepilepticum.

Schroeder l. c. p. 405. (formula.)

K.

Kermes minerale, v. Antimonium.

Kiesowii Essentia vitae.

Salzb. mediz. chirurg. Zeit. 1791. B. I. p. 166. (Hocce arcanum Medici Augustae Vindelicorum olim viventis constare forsan e Croco, Aloe, et Rheo. Contra epilepsiam absque fructu propinatam esse.)

Krügeri Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 758.

(R. CrySTALL. fossil. ʒj. Corall. rubr. ppt. ʒij. Margar. ppt. ʒj. Smaragd. ppt. ʒß. F. P.)

Kyphy.

Alexand. Trallian. L. I. c. 15. (hujus remedii magna cum laude mentionem facit. Suffimigium erat apud Aegyptios celebratum, sedecim varias ingredientis continens species [e. g. Aspalathum, myrrham, thus etc.], non ex arbitrio, sed secundum certas magni apud eos aestimati numeri quaternarii regulas componendas. vid. Plutarch. de Isid. et Osirid. Opp. T. II. edit. Xylandr. fol. 1620. p. 383.)

L.

Lic. (usus diaeteticus.)

Cheyne (Georg.) Essay on the Gout. London. 1724. 8. p. 103. (laudat.)

— — — Tr. de natura fibrae ejusque laxae feu resolutae morbis. London. 1725. (Epilepsia lacteo victu sanata.)

Nigrifoli (Fr. Mar.) Tractatus varii ad recentiorum mentem concinnati. Ferrariae 1690. (hyſterico-epilepticis convenire lactis usum.)

Tif.

Tiffot l. c. p. 366. squ. (laudat.)

Serum Lactis.

Plater (Fel.) Observat. select. mantissa. Basil. 1680. 8. (epilepsia ex
aura ascendente erumpens sero lactis curata.)

Lac Asininum, v. Equus Asinus.

Lacerta Crocodilus. (Stercus.)

Cael. Aurelian. Chronicor. Lib. I. cap. 4. (a Serapione esse com-
mendatum.)

Langhansii Tinctura Liliorum alborum, v. Lilium candidum.

Langii (Jo.) Aqua antepileptica.

Langii (Jo.) Epistol. medicin. Francof. 1589. 8. L. III. c. 2.

Spina (D. de) l. c. p. 58.

(R. Flor. Lil. conv. rec. M. p. xij. Lavend. \mathfrak{z} j. Rorism. Stoechad.
aa \mathfrak{z} ß. Cinnam. \mathfrak{z} vj. Nuc. mosch. \mathfrak{z} ß. Piper. long. Cubeb.
aa \mathfrak{z} ij. Visc. quern. Rad. Paeon. Dict. nostr. aa \mathfrak{z} ß. infund. in
vin. gener. M. jß. per octid. destill.)

Langii (Jo. Henr.) Tinctura antepileptica.

Kaempfer (Jo.) Enchirid. medic. p. 30. (laudat ad avertendum par-
oxysmum. Superbibendum esse infusum meracum specierum ner-
vinarum infusumque moschatum ano injiciendum.)

Lange (Jo. Henr.) Tentamen de remediis domesticis Brunsvicensibus.
Brunsvicae 1765. p. 83.

(Formula: R. Asae foetidae \mathfrak{g} j. Solv. in Liqu. C. C. succ. \mathfrak{z} j. Dos.
gtt. xxx. in Aqua hirundinum c. Castoreo: Ante accessionem
ad mitigandam, imo quandoque curandam epilepsiam idiopathi-
cam esse adhibendam; non tamen plethoricis, nisi prius sangui-
nis copia venaesectione fuerit minuta.)

Lapis Armenus, v. Cuprum nativum.

Lapis Chelidonium.

Kovacs Tatai l. c. p. 115. (egregium esse in epile.)

Lapis Divinus, v. Argentum.

Lapis Lazuli, v. Lazurus orientalis.

Laurus Camphora. (Resina.) Cfr. Locherii Mixtur. camphor. Petrii
Tinct. antepil.

Baldinger (E. G.) von den Krankh. einer Armee. 2te Ausg. Langensulz. 1774. (Acetum camphoratum laudat.)

Comm. Lipsiens. Vol. IV. p. 72. (e Gentlemans Magazine.)

Hornung (Jo.) Cista medic. Norimb. 1625. 4. p. 305.

Locher (Max.) Observat. pract. p. 42. (homo quidam per triennium epilepticus convaluit ope mixturae ex aceto et camphora.)

Medicina experimental. Dygbaean. T. II. p. 340. (oleum camphorae laudat.)

Prange (A. D.) D. de virtute camphorae anthelmintica. Gotting. 1759. recuf. in Balding. Syllog. recent. opusc. T. II. p. 125. (laudat.)

Tiffot l. c. p. 322. (levamen ex ejus usu observasse, nunquam autem plenariam epilepsiae medelam. Dosis gr. x. nunquam excedisse et ultimam dosim semper ante horam iv. pomeridianam propinasse; serius datam excitare somnum inquietum.)

Laurus Cinnamomum. (Cortex.)

Aqua Cinnamomi contra epilepsiam Disp. Noric.

Spina (D. de) l. c. p. 38.

(*Laurus*: R. Cinnam. opt. ℥ j. Sem. Paeon. recent. ʒ j. Sclareae, Caryophyll. aa ʒ v. Visc. quern. Rad. Paeon. aa ʒ ss. Incis. et Contus. macer. in ∇ Cinnam. ℔ v. per dies viij. dein f. destill. p. B.)

Oleum.

Medicina experiment. Dygbaean. T. II. p. 308. (dos. gtt. vj.)

Lavendula Spica. (Oleum.)

Medicina experim. Dygb. T. II. p. 323.

Lazurus orientalis.

Sylvatic. (Bened.) Consil. et respons. med. Cent. IV. Patav. 1656. fol. (laudat.)

Leonis Stercus, v. *Felis Leo.*

Lepus Cuniculus. (Pinguedo.)

Kovacs Tatai l. c. p. 119. (Cuniculi violenta morte occisi pinguedo recens liquata et ad gr. v — vj. in aqua picarum aut hirundinum propinata.)

Lepus

Lepus Timidus.

E matre excisus, siccatus, pulverisatus.

Hofmann (Fr.) Medic. rat. syst. T. IV. P. III. Cap. I. §. 2.

Cor.

Cael. Aurelian. Chronic. Lib. I. cap. 4. (a Serapione esse commendatum.)

Macasii (J. G.) Promptuar. Mater. medic. p. 8.

Pulmones.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1746. (cum sale marino et myrrha conditi.)

Sanguis.

Schroeder l. c. p. 1746. (leporis canibus persecuti 3j. c. Vino.)

Lichen Cocciferus et pyxidatus.

Willis (Thom.) de morb. convulsiv.

Ligatura. cfr. P. II. App. II. §. 5. 6. et 7. de aura epileptica.

Bechstedt D. de artuum ligaturis ad nonnullos morbos internos usitatis. Duisburg. 1773.

Cullen (W.) Anfangsgr. der Arzneiw. T. III. p. 174. (commendat.)

Galen. de locis affect. L. III. c. 7.

Löffler's Beiträge zur Arzn. u. Wundarzn. Th. I. (ad genu applicata epilepsiam cum aura a planta pedis ascendente sustulit.)

Lysons practical Essays. Bath. 1772. 8. p. 153. (felicitis successus exemplum.)

Mangor (C. E.) in Act. Societ. med. Havn. Vol. II. Havniae 1791. 8. p. 452. (epilepsia pedisymptomatica sola ligatura sanata.)

Maurer (F. G.) Comm. de medicam. antepil. Marburg. 1792. p. 39. (plerumque ab ejus usu fractam esse morbi vehementiam. Una tantum vice spasmos interne auctos esse, dum externe erant omnia tranquilla.)

Pew (Rich.) Skizzen aus d. Heilkunde; a. d. Engl. Leipzig 1787. 8. p. 34. 35. (plura de hacce chirurgica administratione profert.) p. 44. (sanationis per ligaturam peractae exemplum.)

Preßavin Nouveau Traité des vapeurs. à Lyon 1770. 12. p. 123. (laudat.)

Pura-

Purari, in Burnet. Thesaur. medic. practic. Genevae 1676. 12.

T. II. p. 463. (paroxyfmi cum aura a pede ascendente per ligaturam supra genu applicatam feliciter mitigati.)

Rahn (J. H.) Briefwechsel. B. I. p. 516. (efficaciae exemplum.)

Rhazes Lib. IX. ad Almanzor. c. 2. (jam ab eo usitata.)

Salmuth (Phil.) Observat. Cent. I. obs. 90.

Schenk (Jo.) Observat. rarior. Lib. I. obs. 198. 231.

Lilium candidum. (Flores.)

Intrant varias veterum compositiones.

Tinctura florum Liliorum Langhansii (Medici Bernensis.)

(praeparandi formula non plane nota.)

Baldinger Magaz. für Aerzte. 1777. St. VIII. p. 745.

Langhans Abhandl. von den Lastern, d. i. a. d. Gesundheit d. Menschen selbst rächen. Bern 1773.

Linteum caeruleum.

Carl, in Comm. litter. Noric. 1733. p. 210. (ustum pulverisatum in connubio pulveris nigri epileptici.)

Liquor anodynus mineralis Hofmanni, v. Hofmann.

Liquor antimonialis Rollwagenii, v. Rollwagen.

Liquor Cornu Cerui succinatus. cfr. Langii Tinctura antepil.

Weikard (M. A.) Observat. medic. Francof. 1775.

Liquor Lotharingicus, v. Nicolas *Liquor lotharingicus*.

Locheri Mixtura Camphorata.

Locher (Max.) Observat. pract. etc. p. 42.

(Formula: R. Camphor. \mathfrak{z} β . Sacchar. canar. Mucilag. Gumm. arab.

\mathfrak{aa} \mathfrak{z} j. His invicem in mortario marmor. tritis adde Acet. ca-

lid. \mathfrak{z} β . Aqu. flor. Samb. \mathfrak{z} vj. Symp. flor. Papav. Rhoead. \mathfrak{z} j.

Mixtura per diem sumenda et multo cum fructu propinata.)

Ludovici Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 758:

(R. Bezoard. alb. quod constat ex C. C. philos. Terra figill. et Uni-

corn. foss. \mathfrak{aa} . Succin. alb. ppt. \mathfrak{aa} \mathfrak{z} ij. Cinnab. nativ. \mathfrak{z} β .

Laudan. op. \mathfrak{z} j. F. P.)

Waldschmidt (J. J.) Oper. med. pract. p. 12.

Lujac

Lujac (D.) Pulvis antepilepticus.

Bierling (C. Th.) Medic. theor. pract. p. 114.

Lumbricus terrestris.

Haen (A. de) Rat. medendi. (ptisanam lumbricorum commendat.)

Kaempfer (Jo.) Enchirid. medic. p. 28. (permultos tam adultos quam infantes absque ullo acidi indicio epilepticos pulvere cochlearum et lumbricorum terrestrium sanatos vidit.)

Luna potabilis, v. Argentum.

Lunaria annua. (Herba.)

Kovacs Tatai l. c. p. 124. (laudat.)

Lupi hepar, v. Canis Lupus.

Lutra vulgaris. (Hepar.)

Gasser (Achill. Pyrmin.) Curat. et observ. medic. obs. 30. in Hier.

Welschii Syllog. observ. et curat. med. Cent. VI.

Lycopodium clavatum. (Semen.)

E. N. C. Dec. I. Ann. I. obs. 97. Ann. II. obs. 15.

Miscell. curios. Ann. III. obs. 15. p. 20.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1334.

Lysimachia purpurea. (Herba.)

Scherb D. de Lysimachiae purp. virtute medicinali non dubia. Jenae 1790. p. 32. (commendat decoctum herbae in epilepsia.)

Radix (externe).

Gottsched Flora prussica. p. 155. (radicem, sole ultimum canceri gradum accedente, collectam et collo appensam certissimum epilepsiae remedium esse.)

M.

Magisterium Auri, v. Aurum.

Magisterium epilepticum.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 443. (formula.)

Magisterium epilepticum Michaelis, v. Michaelis.

Magisterium Wismuthi, v. Wismuthum.

Ma-

Magnes.

Anonymus quidam, in Gazette salulaire de Bouillon. 1761.
(brachio utrique epileptici alligato epilepsiam sanasse testatur.)

Paracelsus (Theophr.) de vi magnetica. p. 1019. (in epilepsia
quatuor magnetes ad extremitates inferiores, unum ad caput ap-
plicare suadet.)

Unzer (J. C.) Beschreibung e. m. d. künstl. Magnet. angestellt. Ver-
suchs. Altona 1775. (in duobus epilepticis fere nihil effecisse.)

Magnesia alba.

Gmelin (Jo. Fr.) Apparat. medicam. e regn. miner. T. I. Gotting.
1795. 8. p. 23. (in epil. ab acido primarum viarum antepileptici
titulo multo magis dignam esse, quam sesquipedales illae veterum
formulae ex terris calcareis praesertim animalibus conflatae.)

Magnetismus animalis.

Feurstein (J. H.) D. de epilepsia. p. 82. (Argentorati optimo cum
successu eum applicatum observavit tribus puellis, quae a prima
aetate epilepsia vexatae erant. Per biennium enim paroxysmus
non rediit. Effectum vero laudatum a sola irritatione partium
corporis sensibilibum atque imaginationis operationibus esse deri-
vandum.)

Malaebites, v. Cuprum.

Marchionis Pulvis epilepticus.

Pharmacop. Wirtemb. 1741. p. 261.

(Formula: R. Rad. Paeon. $\frac{z}{3}$ iij. Visc. quern. Rasur. Ebor. Ungul.
Alc. Corn. Cerv. Spodii. Corall. rubr. albor. Margar. ppt. aa $\frac{3}{4}$ vj.
Fol. Auri. n. xx. M. fiat Pulv. subtiliss. Dos. gr. x. — $\frac{3}{4}$ ℞.)

* * *

Ackermann, in not. ad Tiffot. l. c. not. 62. 73. (non raro in
epilepsia infantum ab eo optimum effectum observasse.)

Hofmann, in Baldingers N. Mag. f. A. B. IX. St. 5. p. 535.

(Formula sequenti modo reformata commendatur:

R. Magnes. e Sal. angl. $\frac{z}{3}$ ij ℞. Pulv. rhei. $\frac{z}{3}$ ℞. Visc. quern. Fol.
Aurant. aa $\frac{3}{4}$ j. M. f. P.)

Hufeland Bemerk. über die natürl. und geimpft. Blattern. Leipzig
1793.

1793. 8. p. 345. (pulverem antepil. Marchionis [absque auro] longe praefert Magnesia in epilepsia infantili ab acido.)

Schreger (B. N. G.) krit. Dispens. p. 101. (vituperat.)

Tiffot l. c. p. 338. (inefficacem superfluumque esse, nisi in epilepsia infantum ab acido aliquid frugis praebeat.)

Matrimonium, v. Coitus.

Mayerne Pulvis antepilepticus.

Mayerne (Th. de) Syntagma praxeos medicae. London. 1690. P. I. p. 16. et 44.

Meadii Electuarium antepilepticum.

Mead (Rich.) Monita et praecepta. Sect. III. c. 2. p. 37.

(R. Pulv. cort. peruv. ʒj. Rad. Valerian. sylvestr. ʒij. M. F. c. Syrup. Aurant. qu. f. Elect. Hujus post debitas evacuationes devoret aeger bolum pondere ʒj. mane et vespere tribus mensibus continuis, dein repetat triduo vel quatrinduo ante novam plenamque lunam.)

Melaleuca Leucadendron. (Oleum Cajeput.)

Goetz, in Comm. litt. Noric. 1731. p. 5. (felici cum successu in epilepsia adhibitae guttae ij — x. saccharo instillatae.)

Werlhof (P. G.) Oper. medic. ed. Wichmann. p. 711. (in conubio cortic. peruviani.)

NB. Pulverem quoque antepilepticum Ragolo intrare putatur. vid Ragolo.)

Meloe Vesicatorius (externe), v. Vesicatoria.

Interne.

Forfien, v. Beaumes l. c. p. 348.

Friccius de venenorum virtute medica. p. 161.

Mercurialis (Hieron.) de morbis puerorum. Lib. I. c. 3. (laudat in epilepsia infantum ideoque ingreditur ejus bolum antepilepticum, v. Mercurialis bolus antepilepticus.)

Neuforn J. C. Stockar. de) D. de usu cantharidum interno. Götting. 1781. 4. p. 34.

Zacut. Lusitan. Prax. admir. Lib. I. obs. 35. (epilepsiam ab urinae per calculum suppressione cantharidum usu interno sanasse.)

Mentha Pulegium.

Oleum.

Medicina experiment. Dygbaeana. T. II. p. 322.

Semen.

Plinii Histor. natur. L. XX. cap. 14. (ex aceto propinandum.)

Mercurialis (Hieron.) Bolus antepilepticus.

Mercurialis de morbis puerorum. Lib. I. cap. 3.

(Formula: R. Pulv. Sem. Paeon. Visc. quern. aa ʒij. Card. ʒj. Cantuar. ppt. ʒij. M. F. c. mell. qu. f. Bolus, ejus ʒ℥ — ʒj. singulis vicibus tribus horis ante cibum propinetur.)

Mercurius. cfr. Aethiops miner. Cinnabar. Troghieri pilulae catharticae.

Cullen (W.) Anfangsgr. d. Arzneiw. T. III. p. 186. (quaedam e Mercurii usu sperat.)

Deffault Diss. sur les maladies veneriennes. à Bourdeaux 1733. 8. p. 197. (plane inutilem esse in epilepsia.)

E. N. C. Dec. III. Ann. VII. obs. 171. (ad salivationem usque propinatus epilepsiam sanat.)

— — Cent. I. p. 272. (filia epileptica patris venerei per salivationem curata.)

— — Cent. III. p. 231. et 299. (epilepsia salivatione sanata.)

Ettmüller (M.) Colleg. practie. in Oper. omn. p. 812. (cum fructu in epilepsia venerea adhibuisse.)

— — — Medicus theoria et praxi instructus, i. e. Fundamenta medicinae vera, curante Ausfeldio. Dresdae 1685. 4. (epilepsiam cum morbo venereo complicatam Mercurio sanavit.)

Murray (Ad.), resp. P. Dubb, D. f. meditatamenta circa methodum luis venereaë curandae. Upsaliae 1771. p. 25. sq.

Piso (Homob.) De regimine magnor. auxiliorum. c. 4. } (sanationes

Rolfink Medicina consultator. p. 193. } epilepsiae.

Scardona (J. Fr.) Aphorism. de cognoscendis et curandis morbis. Lib. I. cap. 8. p. 163. } per salivationem.)

Spörry üb. die Wirkung des Quecksilbers in der Epilepsie; im Museum der Heilkunde. B. I. Zürich 1792. n. 35.

Sylvatic. (Bened.) Consultat. medic. Consult. 47.

Tif.

Tiffot l. c. p. 328. sq. (in epilepsia a causa venerea, a humorum stasi et acrimonia lymphæ utilem esse statuit.)

Willis (Th.) Pathologia cerebri. p. 46.

— — — de morbis convulsivis. cap. 3. (cum fructu in epileps. venerea adhibuisse.)

Mercurius dulcis.

cfr. Dôlæi ♂ antepil. Plumeri ♂ alterans, et pilul. alterantes.

Acoluthus (J.), in E. N. C. Dec. II. Ann. IX. obs. 166. (Epileps. inveterata salivatione per Mercur. dulc. sanata.)

Burserii ab Kanisfeld Institut. medic. pract. T. III. p. 253.

Dower, in Medical Essays. Edimburg. T. II. p. 510. (Mercur. dulcem cum cinnabari antimonii junctum in largiore dōsi commendat.)

Heister (Laur.) medic. chirurg. und anatom. Wahrnehm. Rostock 1757. 4. (epil. a vermibus, hisce per Mercur. dulc. et Jalapp. expulsis, sanata.)

Lyson (Dan.) practical Essays. p. 117.

Thomafius (Gothofr.), in E. N. C. Dec. III. Ann. III. obs. 191. (epil. verminosa eo sanata.)

Tiffot l. c. p. 330. (epil. ab acrimonia lymphæ Mercur. dulc. et purgantibus sanata.)

Mercurii inunctio.

Fabre nouvelles observations sur les maladies veneriennes. à Paris 1779. 8. (epil. venerea ea sanata.)

Houffet (E. J. P.) Diss. sur les parties sensibles du corps animal. suiv. d'un mémoire sur les avantages, que procurent les frictions mercurielles dans le traitement des quelques epilepsies idiopathiques etc. à Lausanne 1770. 8. (Præcipuam epilepsiae causam aut in depravata viscerum conditione, aut in summa humorum spissitudine statuens [nisi contraindicans adsit, vel nisi comperitum sit, hunc morbum ortum esse a vitio quodam conformationis cerebri] ad inunctionem mercurialem quam potissimum spissos humores fundendi remedium persugiendum esse putat, exemplisque ea peractæ sanationis confirmare studet.)

Riedlini (Vit.) Observat. med. Cent. III. obs. 71. p. 189. (Sanationis per inunctionem exemplum.)

Mercurii Oleum per se.

Medicin. experiment. Dygbaean. T. II. p. 112.

Mercurius Plenii gummosus.

Kaempfer (Jo.) Enchirid. medic. p. 30.

— — — in Act. philos. in d. Societ. acad. Scient. Hafliae. Vol. I. Giesiae 1771. 4. p. 152. (in epil. a causa venerea efficacissimum expertus est.)

Mercurius sublimatus.

Bourru, v. Beaumes l. c. p. 228.

Gardane Gazette de Santé. p. 47. (in epil. venerea.)

Locher (M.) Observat. pract. p. 41. (cum felici successu adhibuit in epil. venerea cum topico cranii.)

Turpetum minerale.

Sager (C. G.) Fascic. observation. medic. practicar. Sundii. 1794. 8. (Epil. nocturna ab obstruction. intim. ventris eo sanata. Propinabatur omni biduo gr. j. cum Succ. Liquirit. gr. ij. in forma pilular.)

Metzgeri Specificum antepilepticum metallicum.

Metzger's (J. C.) deutl. und gründl. Beschreib. zweier vortreflich. Specificor. chym. medicorum. Strasburg 1724.

Schreger's (B. N. G.) kritisch. Dispensat. p. 284. (pulvis albo-cineus ab inventore multis encomiis promulgatus. Secundum ipsius verba constare e quodam electro philosophico totius regni mineralis metallici. Praecipuam basin esse aurum argentumque. Dosis pro infante neonato gr. j. matris lacte mixtum, a quo secundum aetatis normam ad gr. vj. usque ascendendam.)

Michaelis Decoctum antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 247.

(R. Rasur. Lign. sanct. ʒ iij. Visc. quern. Tiliae aa. ʒ ij. Lign. Rhod. bux. Sassafr. aa. ʒ j. Inf. in f. qu. aqu. fl. til. Lil. conv. Ceras. nigr. qu. f. spirit. vitr. epil. parum st. in inf. per aliqu. dies, postea coqu. in vitr. appos. alemb. destillat. affund. et edulcor. Syrup. fl. Paeon. qu. f. F. D.)

Micha-

Michaelis Emplastrum antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 396.

(R. Succ. alb. Thur. Mastich. aa ʒij. Galban. Opopan. aa ʒj. Visc. quern. ʒij. Ambr. gryf. gr. vj. Mosch. gr. iij. Sem. Paeon. mar. ʒʒ. Ladan. ʒʒʒ. Ol. nuc. mosch. parum asperg. pulver. cubeb. F. Exempl.)

Michaelis Emulsio antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 454.

(R. Sem. Melon. ʒijʒ. Paeon. ʒj. Papav. alb. ʒʒ. Aqu. fl. Til. Lil. conv. Paeon. aa ʒiij. Rosar. ʒj. Mar. chr. perl. ʒʒ. F. Emuls.)

Michaelis Enema antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 462.

(R. Herb. Rut. impl. ij. Fl. Paeon. Lil. conv. aa impl. j. Rad. Paeon. ʒʒʒ. Squamar. ʒʒ. Aristol. rot. ʒiij. Sem. Paeon. ʒij. Coqu. in f. qu. aqu. Colat. ʒxvj. add. Electuar. diaphan. ʒj. Vitell. ovor. n. j. Extr. Castor. ʒʒ. F. Enema.)

Michaelis Magisterium antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 580.

(R. Magist. Ungul. Alc. Cran. human. violent. mort. extinct. Corn. Alc. Cerv. aa ʒʒ. Smaragd. ʒj. Unicorn. ver. ʒij. Succin. ʒj. F. Magist.)

Michaelis Rotulae antepilepticae.

Spina (D. de) l. c. p. 822.

(R. Foecul. Aron. Visc. quern. aa ʒj. Smaragd. ppt. Magist. epil. aa ʒij. Sacchar. in aqu. epil. Lang. soluti qu. f. ut F. Rotul.)

Michaelis Specificum cephalicum.

Pharmacop. Wurtemberg. p. 291.

(Formula. Dos. gr. x—xxiv.)

Schreger (B. N. G.) l. c. p. 102.

Michaelis Tinctura antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 975.

(R. Spirit. Ceras. nigr. Flor. Tiliae. Lilior. convall. aa ʒj. Essent. Flor. Paeon. Tunicae aa ʒʒ. M. F. Tinct. Dos. gtt. xxv.)

Micha-

Michaelis Tinctura bezoardica.

Kovacs Tatai l. c. p. 116. (laudat in epilepsia.)

Schulze (Gothofr.) D. de natura Tincturae bezoardicae Michaelis.
Halae 1678. 8.

Michaelis Vinum antepilepticum purgans.

Spina (D. de) l. c. p. 1014.

(R. Rad. Paeon. ℥ij. Herb. Primul. Ver. impl. j. Flor. Paeon. Lil.
convall. Tiliae āā pgl. iij. Rad. Helleb. nigr. ℥℔. Rad. Jalapp.
℥℔. Cardamom. Cubeb. āā ℥j℔. Sem. Paeon. ℥j. Asperg.
spirit. epil. incl. nod. et immitt. in Vinum.)

Moebii Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 760.

(R. Cinnab. antim. rectific. et nativ. Hungar. āā ℥℔. Smaragd. ppt.
C. C. sine ign. Corn. Alc. sine ign. ppt. Visc. coryl. āā ℥j.
M. F. P.)

* * *

Clauderer (Gabr.) D. de cinnabari nativa hungarica. Jenae 1684. 4.
pag. 17.

Frauentorfer (Ph.) Tabula smaragdina. Norimberg. 1699. p. 234.

Kovacs Tatai l. c. p. 116. (laudat.)

Mort (le) Aqua antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 58.

(R. Fol. et Flor. Lavend. Rosism. Majoran. Salv. āā impl. ij. Ca-
stor. ℥ij. Camph. ℥iij. Sp. Vin. ℥iij. Sal. arm. ℥iv. Tar-
tar. ℥iij. Aqu. Lavend. qu. s. ut innat. poss. dest. post digest.
XIV. d. donec prodierit ℥j. adde Ol. Rut. gtt. xxx. Succin.
gtt. xx. Macis. Junip. āā gtt. xj.)

Moschus arte factus.

Reineck (G. G.) D. de moscho naturali et arte facto. Jenae 1784. 4.
pag. 46.

Moschus moschiferus. (Humor spissus in folliculo umbilicali.)

Ackermann, in not. ad vers. german. Tissot. l. c. p. 310. not. 66.

(moschum in epilepsia infantum a dentitione laudat.)

Ball Anweisung z. mediz. Praxis. Frankf. u. Leipzig 1763. 8. p. 31.

Chi-

- Chiliani (B.), praef. G. Moebio, D. de epilepsia. Jenae 1659.
- Cullen (W.) Anfangsgr. d. Arzn. T. III. p. 128. (moschum probum in non exigua dosi efficacem esse in epilepsia.)
- Fabri (J. Petr.) Anatom. univers. L. III. c. 15. (laudat.)
- Feurstein (J. H.) Diss. cit. p. 73.
- Galeati Institut. Bononiens. T. III. (non juvasse.)
- Hannes (Ch. R.) de moschi virtute antepileptica in proprio filio experta, in N. A. N. C. Vol. V. obs. 63. p. 244.
- Hemman (F. A.) mediz. chirurg. Aufsätze. Berlin 1778. p. 208. (aqua moscho impraegnata venis felici cum successu injecta. vid. Infusoria chirurgica.)
- Hofmann (Casp.) Comm. in Schroeder. Pharmacop. c. 26.
- Hofmann (Fr.) Medic. rat. syst. T. III. p. 25. Suppl. p. 59. 60. T. IV. p. 531.
- Maffa, in Journal étranger. Juillet. 1760. p. 235.
- — Gazette salutaire. 1761. (mulieri post febr. intermitt. quotidie epilepticis paroxysmis vexatae matutino tempore dedit bolum e Moschi gr. x. Ostr. antimon. gr. xx. et Extr. Chamom. confectum addito insuper infuso theiformi. Jam prima dosis paroxysmum mitigavit, secunda plane profligavit. Sudor inodorus. Urina et excrementa alvina moschi odorem per aliquot dies retinebant.)
- Maurer (F. G.) Comm. de medicam. antepil. p. 25. (plurium laudes enarrat.)
- Michaelis (Chr. Fr.) mediz. pract. Bibl. B. I. St. 3.
- Mönch (Fr.) Mater. medic. Artic. Mosch. (in adultis a gr. iv—xxiv. sensim augendo esse propinandum.)
- Pharmacop. Helvetica. Basil. 1771. (in camphorae connubio interdum juvasse.)
- Quarin animadv. pract. p. 27. (laudat ad superandum stuporem a frequentioribus paroxysmis progenitum.)
- Reincke (G. G.) D. de moscho naturali et arte facto. Jenae 1784.
- Rolfink (Guern.) Chim. in art. form. redact. Lib. V. Sect. 5.
- Swieten (Ger. v.) Comment. T. III. p. 473.
- Thouvenel Mémoire sur les principes et vertus medicamenteuses des substances animales. à Bourdeaux 1779. p. 352. (epilepsiam a ter-

a terrore eandemque a scabie retrogressa moscho largiter propinato esse sanatam.)

Tiffot l. c. p. 305. squ. (multum ex ejus usu sperat in epilepsia, absente plethora, sanguinis congestione ad caput, primarumque viarum impuritate obstructionibusque carentibus.)

Unzer (Matth.) *ιερονοσολογ.* L. II. c. 11. (laudat.)

Moxa.

Brunner (Jo. Conr.), vid. Wepfer. *Histor. cicut. aquat.* p. 97. (nuchae applicata epilepsiam sanavit.)

Kaempfer *Amoenitat. exotic.* p. 595. (Nigritae et Sinenses in epilepsia optimo cum emolumento totam futuram coronalem longa et ampla stupra adurunt.)

Naudau, in *Journal de Medecine.* T. LXXV. (Cylindri ardentes capiti.)

Pouteau *Oeuvres posthumes.* T. II. p. 55. (Capiti applicanda. Tutior ferro ignito.)

Rhyne (ten) *Diss. de Arthritide.* London. 1683. 8. p. 108. 116. (Sinenses eam in epilepsia capiti applicare et postea locum ustum aqua salita lavare solent.)

Muscus pyxidatus, v. Lichen cocciferus.

Musica.

Quarin (Jof.) *Animadvers. pract.* p. 28. (Epilepsia ab animi pathematibus excitata per concentus musicos fortuito appropinquante paroxysmo auditos sanata.)

Mus Musculus (calcinatus).

Reusner (Hieron.) *Observat. medic. obs.* 13. et 152.

Mustela vulgaris.

Sanguis.

Augenii (Horat.) *Epistol. et Consult. medic.* Francofurt. ad Moen. 1604. L. VIII. *Epist.* II. (laudat.)

Camerar. (Jo.) *Syll. memorab. medic.* Cent. XVI. *partic.* 39.

Galen. *Compos. sec. loc.* L. III. (Archigenem jam laudasse. Et ipse commendat.)

Spina dors.

Hartmann (Jo.) *Praxis chymiatr.* p. 19. (leniter pulverifata.)

Myn.

Mynsichti Aqua antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 65.

(R. Rad. Paeon. debite collect. ℥ij. Aristoloch. rot. Diptamn. alb. Angelic. āā ℥j. Visc. quern. Sterc. pavon. Squill. praep. Anacard. āā ℥j. Sem. Paeon. mar. Coriandr. praep. Carv. Foenic. āā ℥vj. Secundin. exsiccat. in qua masculus fuit. Castor. ver. āā ℥℔. Herb. Card. Bened. Millef. Rutae Sylvestr. Salviae acut. Rorism. āā ℥ij. Incisa et contusa infundantur in Vin. Malvat. ℥xij. Diger. in loc. calid. p. octid. vase quotidie multoties commoto; postea p. alemb. destill. et liquori destillato a novo impone: Fl. Paeon. mar. Lilior. convall. āā ℥iv. Betonic. Tiliae, Lavend. Meliss. Borrag. Bugloss. āā ℥j℔. Nuc. Mosch. Cubeb. Macis, Cinnam. acut. Piper. long. Caryophyll. āā ℥j. M. et igne lentissimo secunda vice in B. Mariae destilla.)

Mynsichti Balsamum polychrestum.

Spina (D. de) l. c. p. 176.

Mynsichti Claretum antepilepticum laxativum.

Spina (D. de) l. c. p. 220.

(R. Fol. Senn. elect. ℥ij. Turbith. alb. Gumm. Mechoacann. āā ℥℔. Rasur. Corn. Alc. Cran. human. Nuc. Moschat. āā ℥ij. Rad. et Sem. Paeon. debite coll. et. Visc. quern. āā ℥℔. Cardam. min. Cassiae lign. Caryophyll. āā j. Flor. Paeon. mar. Lilior. convall. Lavendul. Tiliae āā ℥℔. Macerentur in Vin. rhenan. ℥xxxvj. Stent in infusione loco in calido p. biduum; Coquantur postea parum et additis Sacchari albiss. ℥iij. clarificentur per manicam Hippocr. et F. Claretum.)

Mynsichti Elixir Paeoniae antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 364.

(R. Rad. Palm. Christi Angelic. Pyrethr. āā ℥j. Visc. quern. Sem. Foenic. Anacard. āā ℥vj. Flor. Rorismar. Stoechad. arab. Lavend. āā ℥iij. Rasur. Corn. alc. Cran. hum. Castor. ver. āā ℥j℔. Majoran. sicc. Mpl. j. Spirit. Vin. rectificatiss. ℥ij. Incisa et contusa infundantur in vase vitreo bene tecto, in loco tepido, per XIV. dies, postea p. alemb. destilla et liquori destillato

Bb

adde:

adde: Rad. Flor. et Sem. Paeon. debite collect. āā ʒj. Spec. diamosch. dulc. Dyaxylo aloes. āā ʒʒ. Misc. et diger. in leni calore per mensem saepius agitando; postea Spiritum Vini unctum aufer per inclinationem et ad medietatem saltem abstrahere; reliquum maneat cum essentia extracta, cujus recipe ʒxij. Spirit. Vitriol. diligent. rectific. et a Cinnab. nativ. prius spagyricè impraegnat. ʒiij. Sal. Paeon. ʒjʒ. Sic simul mixtum per octiduum circul. et diger. F. Elixir, in epil. curanda sua facultate omnia alia remedia superans.)

Mynsichti Emplastrum antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 396.

(R. Ol. Castor. Rut. Ireos. āā ʒj. Rad. et Sem. Paeon. Pyrethr. āā ʒj. Visc. quern. Squill. praep. Corn. Alc. Cran. human. āā. spagyricè calcinatorum ʒij. Thur. elect. Mastich. Ladan. Galban. Opopanac. āā ʒʒ. Flor. Lavend. Stoechad. arab. Spic. indic. āā Pgl. j. Ol. Still. Rorism. Hyssop. Nuc. Mosch. expr. āā ʒj. Resin. et Cerae qu. s. āā. F. Emplastr. ut est artis. In epilepsia etc. futurae coronali applicatum praeclarum praestare auxilium et specifica vi contra illam virtuosissime pugnare.)

Mynsichti Enema antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 462.

(R. Sem. Cartham. ʒj. Agaric. opt. ʒʒ. Pulp. Colocynth. ʒiij. Herb. Centaur. min. Lavend. Majoran. Hyssop. Beton. Rutae hort. āā ʒij. Castor. ver. Flor. Convall. Anthos. āā ʒjʒ. Coqu. et R. Colatur. ʒj. Ol. Chamom. ʒiij. Mell. rosat. ʒij. Acid. Tartar. Sal. Gomm. āā ʒj. Misc. pro Enemate.)

Mynsichti Pilulae polychrestae.

Spina (D. de) l. c. p. 731. (in epil. quoque laudantur.)

Mynsichti Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 762.

(R. Cranii hominis strangulati et sine igne calcinati ʒj. Visc. quern. Cinnab. factit. Ungul. Alc. āā ʒʒ. Misc. et fiat pulvis, cujus ʒʒ. pueris statim post paroxysmum datur, adultis vero ʒj. iteratusque certissime liberat.)

Myn-

Mynsichti Sal antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 851.

(R. Rad. Palm. Christ. ℥ij. Angel. Paeon. Pyrethr. āā ℥j. Sem. Paeon. Scob. lign. cupr. Visc. quern. āā ℥℥. Herb. pentaphyll. Millefol. Rut. hortens. Verbasc. Lavend. Rorismar. Morfas gallin. āā ℥iv. Flor. Prim. ver. Stoech. arab. Tiliae. Paeon. Sambuc. āā ℥ij. Mixta calcin. in reverb. postea adde Ciner. Picar. jun. Hirund. Stercor. Pavon. āā ℥j. et c. liqu. appropri. f. leg. artis Sal crystall. alb.)

Mynsichti Suffimentum antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 899.

(R. Succin. alb. ℥xj. Myrrh. rubr. Mastich. elect. Gummi. anira. Galban. Elem. āā ℥ij. Visc. quern. Sem. Paeon. excort. Bacc. Junip. Rasur. Corn. Alc. āā ℥j. Absynth. Majoran. Flor. Lavend. Lilior. convall. Rosar. rubr. āā ℥℥. Misc. et c. Infusione Tragacanth. facta in aqu. antepil. nostr. f. l. a. Trochisci pro suffitu. Fumus hic supra carbonēs naribus epileptici admotus, paroxysmum ipse sedat.)

Mynsichti Suppositorium in epilepsia applicandum.

Spina (D. de) l. c. p. 904.

(R. Trochisc. Alhandal. Agaric trochiscat. āā ℥j. Hell. bor. nigr. Fol. Senn. āā ℥℥. Sal. Gemm. Nitr. āā ℥j. Mell. qu. f. Fiant suppositoria duo grossa et oblonga, ut est moris.)

Myrepsi (Nicol.) Hiera logadii.

Spina (D. de) l. c. p. 320. (epilepticis quoque convenire.)

Myrrhae Gummi.

Polyfii (Gothofr. Sam.) Myrrhologia. p. 129. v. E. N. C. Dec. II. Ann. VI. Append. Norimberg. 1688. 4.

N.

Naphta Vitrioli, v. Vitriolum.

Narcissus (▽ et Oleum.)

Laurembergii (Guil.) Appar. plantar. Lib. I. cap. 18.

Narcissus Pseudonarcissus. (Extractum.)

Fresnoy (du) des propriétés du Narcisse des Prés. à Paris 1778.
v. Hufeland N. Annal. B. I. p. 366.

Nepenthe Quercetani, v. *Quercetan*.

Nicolai Florentini Electuarium antepilepticum.

Kovacs Tatai l. c. p. 129. (Sequentem formulam tradit:

R̄. Herbae, quae vocatur, Sancti Pauli, Herb. paralyticae āā. qu. vis. Incidantur minutim et misceantur c. Melle qu. f. addaturque Pulv. Caryophyll. Pyrethr. Rad. Paeon. āā. qu. suff. Solo hujus electuarii usu Nicolaum Florentinum feminam XL. annorum jam ab infantia epilepticam sanasse.)

Nicolas Liquor lotharingicus.

Beaumes l. c. p. 348. (laudat.)

Nicolas Leçons publiques de Chymie. Tom. II. à Nancy 1787. p. 270.

(Formula: Alcal. volat. liquid. et concreti c. Cornu Cervi ppti. 3vj. Saturentur c. suffic. quantitate acidi phosphorei. In ipso illo liquore infundatur Castorei 3j. et Cort. Citr. recent. 3ij. post horas XXIV. trajiciatur liquor per pannum, coletur, et in lagena vitrea probe obturata asservetur usui.

Mane jejuno stomacho sumatur Cochl. j. parvum et superbibatur Aqu. flor. Tiliae. Dosis repetatur tempore vespertino. Valde laudat hocce remedium in epilepsia, caeterisque morbis convulsivis, oleoque animali Dippelii longe praefert.)

Nicotiana Tabacum. (Herba.)

Sennert (Dan.) Institution. medicae c. Paralipomenis. Viteberg. 1667. 4. Paralip. 13. ad L. I. (epilepsia Syrupo Nicotianae sanata.)

Zacut. Lusitan. Prax. admir. Lib. I. obs. 23. (epil. Syrupo Nicotianae sanata.)

— — — obs. 24. (epileps. a saburra vomitorio e Nicotiana curata.)

Nitri Spiritus dulcis.

Hofmann (Fr.) Medicina ration. systemat. T. IV. P. I. p. 20. (in insultu epileptico a gtt. XL — cxx. esse proficuum.)

O.

Olea europaea. (Oleum Olivarum.)

Anonymus, in Reichsanzeiger 1796. p. 6201. (cum saccharo canariensi mixtum commendat.)

Oleum Agathi, v. *Agathum.*

— — *animale Dippelii,* v. *Dippel.*

— — *Anisi,* v. *Pimpinella Anisum.*

— — *antepilepticum expressum.*

Spina (D. de) l. c. p. 668.

(℞. Nucleor. Persicor. excort. ℥℥. Cerasor. ℥ij℥. Sem. Paeon. excort. ℥ij. Bardanae major. Basilici āā ℥j. Cubebar. Caryophyll. āā ℥vj. Ex contus. et mixtis invicem exprimatur oleum lege artis quod praestat in epilepsia etc. non solum inunctione externa temporum, verticis et nuchae, verum etiam ab intra receptum.)

— — *Anthos,* v. *Rosmarinus officinalis.*

— — *Antimonii,* v. *Antimonium.*

— — *Cajeput,* v. *Melaleuca Leucadendron.*

— — *Camphorae,* v. *Laurus Camphora.*

— — *Castorei,* v. *Castor Fiber.*

— — *Cinnamomi,* v. *Laurus Cinnamomum.*

— — *Cranii Humani,* v. *Homo.*

— — *Epilepticum.*

Spina (D. de) l. c. p. 634.

(℞. Rad. Aristoloch. long. rec. mund. ℥j. Castor. Euphorb. āā ℥j. Ol. olivar. ℥iv. — Rad. Aristol. incis. prius cum ol. oliv. coque et demum reliqua addenda invicem mixta tecta operculo coque et demum linteum cola.)

— — *Foeniculi,* v. *Anethum Foeniculum.*

— — *Hederae,* v. *Glecomahederacea.*

— — *Heraclinum.*

Heers (Henr. ab) Observat. medic. p. 177. (Sequentem formulam in epilepsia valde laudans tradit:

℞. Vitriol. vener. f. Virid. aeris calcinat. ℥j℥. Cran. human. Ungul.

gul. Alc. aa ʒ ij. Visc. quern. Sem. Pacón. mar. aa ʒ j. c. Spirit.
Vin. rectificatissimi ℥ ij. digere in retorta et destilla.)

Kovacs Tatai l. c. p. 123. (laudat.)

Rulandi (Mart.) Curat. empiricar. Centur. X. Lugdun. 1628. 8.
Cent. II. curat. 6. 99. Cent. III. curat. 61. (laudat.)

Oleum Lavendulae, v. *Lavendula Spica*.

— — *Majoranae*, v. *Origanum Majorana*.

— — *Mercurii per se*, v. *Mercurius*.

— — *Narcissi*, v. *Narcissus*

— — *Philosopborum*.

Medicina experiment. Dygbaean. T. II. p. 335. (formulam
et laudes habet.)

— — *Pulegii*, v. *Mentha Pulegium*.

— — *Salis Veneris*, v. *Vitriolum caeruleum*.

— — *Succini*, v. *Succinum*.

— — *Vitrioli dulce*, v. *Vitriolum*.

Opium, v. *Papaver somniferum*.

Orchis mascula. (Radix.)

Murray (Jo. Andr.) Appar. medicam. Vol. V. p. 289. (apud gen-
tes orientales in epilepsia laudari.)

Orcilly (de) (Medici Toeplitzensis) Arcanum antepilepticum.

Salzburg. mediz. chirurg. Zeit. 1791. T. I. p. 46. (ejus men-
tionem facit. Pretium XL. floren. imperial.)

Origanum Majorana.

Oleum.

Ledel (Sam.), in E. N. C. Dec. III. Ann. IX. X. obs. 32. (infanti-
bus epilepticis proficuum esse.)

Medicina experim. Dygbaean. T. II. p. 321.

Pulvis Herbae.

Fonseca (Roder. de) de tuenda valetudine et producenda vita. Flo-
rentiae 1602. 4. (laudat in epil. a gr. xx — ʒ ℥. c. Julap. flor. Au-
rant. omni mane jejuno stomacho.)

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1309. (Dioscoridem jam laudasse
decoctum in epilepsia.)

Oris

Oris extenso. — cfr. Pibrac.

Gazette salubre. 1761. n. 45. (ope nummi metallici sufficientis magnitudinis os ita esse distendendum, ne maxillae sese per quoddam temporis spatium attingere possint.)

Ossa.

Detharding (G. C.), resp. G. W. Balke, D. de ossium usu medico. Buetzowiae 1780. 4. p. 9.

Aqua ex ossibus destillata.

Quercetani (Jos.) Pharmacop. dogmat. restitut. Giesiae 1607. 8.

Extractum ossium antepilepticum.

Cardilucii (Jo. Hisk.) Officina sanitatis. p. 67.

Tragea ossium antepileptica.

Cardilucius l. c. p. 67.

Ova Corvi, v. *Corvus Corax*.

Ova Coturnicis, v. *Tetrao Coturnix*.

Oxyeratum.

Galen. Consil. pro puero epilept. ed. Charter. Opp. T. X. cap. 4.

Riverii (Lazar.) Observat. medic. et Curation. insign. Centur. IVta.

Hagae 1659. 8. obs. 10. (ejus quotidiano usu epilepsiam esse profligatam.)

Oxymel squilliticum, v. *Scilla maritima*.

P.

Pachii-Hiera, s. *Electuarium Diacolocynthidos*.

Spina (D. de) l. c. p. 320. (epilepticis quoque conducere.)

Paeonia officinalis.

Flores.

Tissot l. c. p. 299. (ob odorem venenatum ei suspectae videntur.)

Willis (Th.) Patholog. cerebr. C. III. p. 30. (et flores pulveri radicis addere suadet.) v. *Praeparata e paeonia*.

Radix (praesertim maris).

Externe qua Amuletum (collo appensum).

Apollonii Menabeni Tr. de Alce. Cap. 7.

Came-

- Camerar. (Jo.) Syllog. memorab. Cent. III. partic. 30. 31.
 — — — — — Cent. VI. partic. 93.
 Costaei (Jo.) L. de natura stirpium. fol. 82.
 Fernel de abdit. rerum causis. L. II. cap. 17. p. 133.
 Forest. (P.) Observat. medic. Lib. X. obs. 61.
 Galen. de simplic. medic. Lib. VI.
 Lemnii (Levin.) de occult. natur. miracul. L. II. cap. 2.
 Schenk (Jo.) Observat. medic. Lib. I.
 Storch (Jo.) von d. Kinderkrankheiten. B. II. p. 115. (filo affixa et
 pone aegrotum cubiculo imposita.)
 Willis (Th.) Patholog. cerebr. Cap. III. p. 30. (taleolis et bracteo-
 lis radice recentis filo affixis totum collum circumdare et, ut pri-
 mum exaruerint, novas substituere jubet. Memorat quoque amu-
 leti ficci.)
 Zacut. Lusitan. de medic. princip. histor. Lib. I. hist. 22.

Interne.

Pulvis Radicis.

- Appel (J. J.) Discurs. de epilepsia. Altenburg. 1713. 8. p. 39. (radi-
 cem die parascève aurei aut argentei instrumenti ope effodendam
 valde laudat.)
 Berger (Sim.) Bericht von wunderbarlicher Kraft der Paeonienwur-
 zel wider das Vergicht. Frankfurt 1599. 8.
 Borelli (Jo.) Observat. medic. Cent. I. obs. 18.
 Forest. (Petr.) Observat. medic. Lib. X. obs. 59.
 Friderici (Jo. Arn.) D de paeonia Jenae 1670.
 Haller. Histor. stirp. helvet. p. 1187. (inertiae ejus testimonium
 a Boerhavo.)
 Herrmann (Paul.) Cynosur. mater. medic. Argentor. 1726. 4.
 p. 176. sq. (inefficacem esse.)
 Home Clinical experiments etc. edit. 2. p. 209. (bina epilepticorum
 exempla, in quorum uno quater de die 3 ℞. eo successu data, ut
 insultus per aliquot dies pauciores inde fierent, sed subsequenter
 frequentibus octavo die; in altero autem frustra radix eodem
 modo per dies XI. subministrata est.)
 Kovacs Tatai l. c. (passim.)

Ludo.

- Ludovici Pharmac. modern. p. 494. (Saepius fallere expectationem.)
- Moor (Barthol. de) Pathologiae cerebri delineatio practica. Amsterdam. 1704. 4. (non multum ab ea sperat.)
- Paracelsi (Theophr.) Paragran. I. p. 209. (ex observatis viribus Paeoniae epilepsiae originem et symptomata declarare studet.)
- Riverii (Lazar.) Arcana c. Bernard. Christin. a. Juvellina institutio- nibus. Venetiae. 1676. 4. (efficaciae exemplum.)
- Schacht (Jo. Oosterdyk) Institution. medic. pract. Traject. ad Rhe- num 1767. 4. p. 64. (efficacissimis remediis antepil. annumerat.)
- Schenk (Jo.) Observat. medic. L. I. obs. 227.
- Sylvatic. (Bened.) Consil. et respons. medica. Cent. IV. Patav. 1656. fol. (laudat cum Tinctura picarum.)
- Sylvii (de la Boe) Oper. medic. p. 427. (nihil praestitisse.)
- Tiffot l. c. p. 299. (inefficax ei videtur et plane negligenda.)
- Vogel Historia Materiae medicae. p. 206. (Brendelium quoque eam laudasse adeo siccam.)
- Willis (Thom.) Pathol. cerebr. Cap. III. p. 30. (laudat a 3j—iij. bis de die.)

Succus Radicis.

- Murray (Andr.) Appar. Medicam. T. III. p. 40. (plurimum ex eo sperandum esse putat.)
- Willis (Thom.) Pathol. Cerebr. C. III. p. 39. (cum vino hispanico contusae radicis succum saccharo dulcesfactum laudat.)

Semen.

- Eraști (Th.) Disputat. IV. p. 140.
- Forest. (Petr.) Observat. medic. Lib. X. obs. 59.
- Lemnii (Levin.) de miracul. et occult. naturae. Francof. 1590. 12. Lib. II. c. III. p. 146.
- Quercetani (Jos.) Tetras. p. 157. (Paeoniam capiti aequare et fo- liorum rubrorum fasciculum in capsula alba fulgorem repraesentare, ex quo epilepsiae symptomata declaranda. Ideoque hujus plantae semina tam egregium contra epilepsiam effectum prae- stare.)
- Sylvii (de la Boe) Opera medic. p. 427.

Willis (Thom.) Patholog. cerebr. Cap. III. p. 30. (et pulveri radicis addere suadet.)

Præparata e Paeonia olim in epilepsia usitata.

Aqua Paeoniae.

Pharmacop. Wirtemberg. 1741. p. 7.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 1372.

Conserva Florum Paeoniae.

Pharmacop. Wirtemberg. p. 39.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1372.

Conserva Radicis Paeoniae.

Horstii (J. D.) Pharmacop. cathol. P. II. Lib. X. (laudat.)

Decoctum vinosum cum Castoreo quæ Balneum.

Reusner (Hier.) Observat. medic. obs. 12.

Schroeder l. c. p. 1371.

Strobelberger de morbis pueror. cap. I.

Elixir Paeoniae Mynsichti, v. Mynsicht.

Emulsio Seminum Paeoniae.

Schroeder l. c. p. 1372.

Extractum diapacon.

Schroeder l. c. p. 413.

Fecula Paeoniae.

Schroeder l. c. p. 1372.

Mel Paeoniae.

Schroeder l. c. p. 1372.

Oleum destillatum Paeoniae.

Schroeder l. c. p. 1372.

Sal Paeoniae.

Schroeder l. c. p. 1372.

Spiritus Paeoniae.

Purmanni (Matth. Godofr.) Chirurgia curiosa. Francofurt. 1694. 4.

(Feminae epilepticae spiritum Paeoniae in venas injecit eamque sanavit.)

Syrupus Paeoniae.

Pharmacop. Wirtemberg. p. 216. (e succo recenti florum.)

Schroeder.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1372.

Syrupus Paeoniae Zwölferi, v. *Zwölfer*.

(NB. Intrat praeterea Paeonia omnes fere veterum compositiones antepilepticas.)

Panacea Anwaldina, v. *Anwald*.

Papaver Rhoeas. (Extractum e capitulis et herba paratum.)

Murray (Jo. Andr.) Appar. medicam. T. II. p. 213. (Fouquet, [Medicus Mompelienfis] hocce extractum opio praefert eoque a gr. vj — xvij. epilepsiam compefcuit testante Adolpho Murray.)

Papaver somniferum. (Opium parum. Extractum thebaicum. Laudan. liquid. Sydenh. Tinctura thebaica.)

Aaskow, in Act. Havniens. T. II. p. 17. (epilepsiam communicativam opio et asa foetida mitigavit.)

Ackermann, in not. ad Vershön. german. Tissot. l. c. n. 65. (Indicationes opium propinandi nondum satis esse determinatas. Nunquam satisfecisse in totius systematis nervorum commotione.)

— — — n. 66. (In epilepsia infantum a dentitione non multum ab opio sperat, plura a moschio.)

Aetii Tetrabibl. IV. Serm. I. cap. 96. (jam opium laudat et specificis antepilepticis annumerat.)

A. N. C. Dec. III. Ann. III. obs. 64. (epilepticis esse noxium.)

Cullen (W.) Anfangsgründe der pract. Arzneiw. Th. III. p. 188. (Opium in epilepsia a plethora nunquam exhibendum.)

— — — Treatise of Mater. medic. Vol. II. p. 247. (ubi ab irritatione quadam nascitur epilepsia regularesque accessiones habet, conferre opium, ut in aura epileptica summopere.)

Feurstein (J. H.) Diss. citat. p. 60 et 77.

Fothergill (Jo.) Medical observat. and Inquir. Vol. VI. p. 80. (in epil. a pathemate commendat.)

Haen (A. de) Ratio medend. P. V. ed. secund. p. 117. (epil. triennis ex terrore nata et quotidie fere erumpens ejus usu sanata.)

Hornung (Jo.) Cista medica. Norimb. 1625. 4. p. 89.

Millars (Fr. Xav.) D. de medicam. antepil. Argent. 1787. p. 37.

Morgagni (Jo. Bapt.) Epistol. anat. med. L. IX. ep. 6. 7.

- Murray (Jo. Andr.) Appar. medicam. T. II. p. 272. (multum promittere in epil. a sensibilitate et mobilitate nimia vel ab animi pathemate orta.)
- Panzani, in Giornale di Medicina. Vol. XIII. Venet. 1776. (in epil. cum mentis alienatione gr. iv. cum levamine propinata.)
- Quarin (Jof.) Animadvers. practic. p. 20. (in epilepsiae aestu propinatum non modo nihil levaminis adtulit, sed quoque soporem apoplecticum induxit.)
- Quercetanus, v. Quercetani Nepenthe.
- Rehfeld (C. F.) Progr. (ad Dissert. meam inaug.) sist. historiam morbi cataleptico - epileptici opio potissimum sanati. Gryphiae 1738. 4.
- Scardona (Jo. Fr.) Aphorism. de cognoscend. et curand. morbis. Lib. I. cap. 8. §. 14. (in epil. cum visus tempore paroxysmi obnubilatione adhibuit. Visus hebetior inde factus, paroxysmus quidem serior accedit, ita autem fortior evadit, ut vitae periculum insisteret.)
- Sennert (Dan.) Medicin. pract. Tom. I. p. 370. (in camphorae connubio ad praecavendum paroxysmum commendat.)
- Spindler (Paul.) Observat. medic. Centur. edit. Car. Raiger. Francfurt. 1691. 4. obs. 5. (eo peractae sanationis exemplum.)
- Tiffot l. c. p. 307 — 317. (p. 307. Puellae e moerore epilepticae Laudani liquidi gtt. xxx. omni trihorio cum levamine dedisse.
- p. 309. ad avertendos paroxysmos, per animi pathemata facile excitandos, commendandum felicique successu Laudan. liquid. gtt. xv. dedisse.
- p. 310. cum fructu in epil. infantum a dentitione dedisse.)
- Tralles (B. L.) de usu opii. Vratislav. 1760. 4. p. 16. (In epil. haereditaria et connata minus conferre. In epil. cujus causa in capite externo aut interno latet, ejus effectum esse imparem. In epil. ab interceptione evacuationis sanguineae aut serosae nihil efficere. In epil. a violenta totius systematis nervosi irritatione et commotione maximae frugis. Nil valere in epil. cujus causa in externis partibus haeret.)

Whytt (Rob.) Works. p. 680. (Largior dosis [gtt. xl.] Laud. liqu. Sydenh. epileptico subvenire non valuit.)

Paracelsi Spiritus antepilepticus.

Schroger (B. N. G.) kritisch. Dispens. p. 216. (Phlegma Vitriol. Spirit. Vin. rectific. Theriacam et Camphoram continet.)

Paracentesis.

Schenk (Jo.) Observat. Lib. I. obs. 232. (ex Paraco.)

Paris quadrifolia. (Baccæ.)

Blochwitz. (Mart.) Anatomia Sambuci. Lipsiæ 1631. 12. p. 62.

Kovacs Tatai l. c. p. 124. (Baccarum n. v — ix. pulverisat. et cum aqua flor. Lil. convall. vel Liqueur. Tiliae propinat. laudat.)

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1356.

Pavo cristatus. (Stercus.)

Borelli (Jo.) Observat. Cent. III. obs. 15. (eo sanatae epil. exemplum. $\frac{3}{j}$. cum vino, luna silente, propinata.)

Kovacs Tatai l. c. p. 118.

Macasii (Jo. Georg.) Prompt. mater. medic. p. 38.

Medicina experim. Dygbaean. T. II. p. 8.

Paulini (Chr. Fr.) Dreckapotheke. Sect. I. cap. 10. p. 20.

Scholzii (Laur.) Consil. medic. Francof. 1598. fol. Consil. 42.

Schroeder l. c. p. 1784.

Spiritus e stercore pavonis.

Schroeder l. c. p. 562.

Syrupus e stercore pavonis.

Spina (D. de) l. c. p. 941.

Peregrinatio.

Hippocratis Aphorism. L. II. aphor. 47.

Hofmann (Fr.), resp. G. Th. Barthold, D. de peregrinationibus sanitatis causa instituendis. Halæ 1701. 4. p. 22.

Swieten (Ger. van) Comment. T. III. p. 436. (Plures epileptici Hollandia in Indiam orientalem profecti ibique commorantes ab epilepticis accessionibus liberi fuerunt. Redeuntes alteri denuo ab iis vexati, alteri autem plane ab iis liberati.)

Petri Tinctura antepileptica.

Hannes (L.) Epist. de puero epilept. p. 47. (cum successu dedit.)

Schre-

Schreger's (B. N. G.) kritisch. Dispensat. p. 141. (Sequentem formulam tradit:

R. Granor. Kermes. $\mathfrak{z}\text{jj}$. Spirit. Vin. rectificatiss. $\mathfrak{z}\text{x}$. Digere et post filtrationem in hac tinctura solve Camphorae $\mathfrak{z}\text{jj}$. Dos pro adulto gtt. xl.)

Petroleum.

Dioscorides l. c. Lib. I. cap. 85.

Gmelin (Jo. Fr.) Appar. Medicam. Vol. I. p. 155. (Si unquam aliquid praestitit, in epilepsia verminosa fuisse judicat.)

Ramazzini (B.) Oper. omn. Gen evae 1717. 4. p. 339.

Wedel (G. W.) D. de epilepsia. Jenae 1076. 4.

Phoca Monachus. (Hancce speciem esse veterum phocam, docet N. G. Leske, in Anfangsgr. der Naturg. Th. I. p. 166.

Coagulum. (πύριον φάμας.)

Serapion, v. Cael. Aurelian. Chronic. Lib. I. cap. 4. (contra epilepsiam commendasse.)

Phoenix dactilifera. (Fructus.)

Beaumes l. c. p. 31. (Boerhavius in epilepsia a nimia irritabilitate et sensibilitate visco fere semper pulverem dactylorum addidisse. Beaumes eum quoque commendat, propria experientia de ejus utilitate certior factus.)

Phosphorus Urinae.

Feurstein (J. H.) Diss. cit. p. 80.

Haartmann (Jo.). resp. E. Elfwenberg, D. de noxio phosphori urinae in medicina usu. Aboae 1773. (Quatuor epilepticis incassum esse propinatum et saepius vomitum excitasse.)

Kramer, in Comm. litter. Noric. 1733. p. 137. (commendat.)

Quarin. (Jof.) Animadv. pract. p. 23. (a gr. j — iij. ter quaterve in die vel in liquido congruo solutus vel in conserva.)

Weikard (M. A.) vermischte Schriften. St. IV. p. 105. (anceps esse remedium.)

Physalis Alkekengi. (Fructuum Quinta essentia.)

Medicina experiment. Dygbaean. T. II. p. 147.

(Formula; laudatur pro dosi $\mathfrak{z}\text{j}$.)

Pibrac

Pibrac Ligatura Linguae.

Greding (J. E.) sammtl. medic. Schrift. Th. I. p. 241. (Optimum ejus effectum ad leniendum paroxysmum, nec non ad sanandam linguam dentibus in paroxysmo laesam affirmat.)

Pibrac, in Mémoires de Chirurgie. T. III.

Picarum Aqua, v. Corvus Pica.

Pilulae Alterantes Plumeri, v. Antimonium.

Pilulae Antepilepticae Cloßaei, v. Cloß.

— — — *Gmelini, v. Gmelin.*

— — — *Hofmanni, v. Hofmann.*

— — — *praeservativae Hofmanni, v. Hofmann.*

— — — *Struvii, v. Struv.*

Pilulae balsamicae Stablii, v. Stabl.

— — *catharticae Troghieri, v. Troghier.*

— — *polychrestae Mynsichti, v. Mynsicht.*

Pimpinella Anisum.

Plinii Hist. natur. L. XX. cap. 17. (Pythagoram putasse, plantam in manu detentam esse antidotum epilepsiae.)

Oleum.

Kaempfer (Jo.) Enchirid. medic. p. 27.

Medicina experiment. Digbaean. T. II. p. 316.

Plumbago europaea. (Radix.)

Kovacs Tatai l. c. p. 124.

Plumbum.

Acetum ex alembico plumbeo destillatum.

Majerne (Theod. de) Prax. medic. p. 46.

Calx Saturni.

Tode (Jo. Clem.) medicin. Journal. B. I. St. 3. Kopenhagen 1794.

(Ewald dedit epileptico cuidam absque successu gr. CLXXX. Inde salivatio.)

Saccharum Saturni.

Agricola (Jo.) Commentar. et Observation. in Jo. Poppii chymische Medicin. Lipsiae 1638. 4. p. 223. (in epilepsia infantum laudat.)

Jacob.

Jacobson, v. Act. Societ. med. Havniens. T. III. Havniae 1792. p. 345. (in epil. saccharum Saturni propinavit a gr. $\frac{1}{4}$ — gr. $\frac{1}{2}$. cum conch. praepar. \mathfrak{z} j. sensim ad tales doses vj. in die ascendendo. Vomituritio et alvus laxa inde observata. M. Saxtorph hasce observationes communicat. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XV. S. 2.)

cf. Schachtii Arcanum antepilepticum.

Pollen Coryli, v. *Corylus Avellana*.

Populus nigra. (Semen.)

Plinii Histor. natur. L. XXIV. cap. 8. (ex aceto datum.)

Portulaca oleracea.

Plinii Histor. natur. L. XX. cap. 20.

Potassa arsenicata, v. *Arsenicum*.

Potentilla reptans. (Herba.)

Schroeder Pharmacop. universal. p. 1387. (Thom. Erastum herbae decoctum cum fructu contra epilepsiam adhibuisse.)

Pressavini Decoctum antepilepticum.

Nouveau traité des vapeurs, ou traité des maladies des nerfs, dans lequel on développe les vrais principes des vapeurs; par Mr. Pressavin. à Lyon 1770. 12. p. 119. (Sequenti remedio plures epilepticos sanasse: Salsaparill. \mathfrak{z} j. Guajac. \mathfrak{z} ℥. Rad. Chinae, Bardan. Enulae aa \mathfrak{z} iv. per horas VI. ex aquae fontan. Mensur. xij. coqu. in olla operculo probe clausa, in qua simul nodulus suspendatur antimon. contus. \mathfrak{z} iv. et Sal. Tartar. \mathfrak{z} j. continens. Finita coctione addantur Rhei \mathfrak{z} j. Sennae mundat. \mathfrak{z} iv. Chamom. roman. \mathfrak{z} ij. Cumin. \mathfrak{z} j. et, olla iterum obtecta, coctio per hor. \mathfrak{z} ℥. continuetur. Colatus liquor effundatur in pelvim amplam, additis \mathfrak{z} ij. Sacchari farinacei [Cassonade], ebulliat per hor. \mathfrak{z} ℥. sollicitè interea despumetur. Frigefacto addantur \mathfrak{z} vj. Spirit. Vini, in quo antea Cantharid. \mathfrak{z} j. infusa fuerit; postea liquor in lagenis probe obturatis servetur in loco frigido. Dos. \mathfrak{z} iv. mane et quatuor horis post prandium. Singulae dosi addi potest pulvis de gutteta vel pulvis radices Valerianae vel Paconiae ad \mathfrak{z} ℥. aut oleum animale Dippelii ad gtt. viij. — x. aut., quod tamen viribus inferius est, oleum succini. Adjungenda auxilia diaetetica et reli-

reliqua ex signis generalioribus petenda, ex quibus praecipue cauteriis magna efficacia tribuenda est.)

Prunus avium. (Fructus.)

Aqua ex iis destillata.

Baricelli (Jul. Caes.) Hortulus genialis. p. 338.

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1178.

Spiritus Ceraforum.

Kesler (Frid.) process. chymic. p. 37.

Schroeder l. c. p. 1179.

Pulsatilla nigricans, v. *Anemone pratensis*.

Pulvis alterans Plumeri, v. *Antimonium*.

Pulvis anodynus Weismanni, v. *Weismann*.

Pulvis antepilepticus aureus Zwölferi, v. *Zwölfer*.

— — — *Bartholini*, v. *Bartholin*.

— — — *Beuceri*, v. *Beucer*.

— — — *Caroli V.*, v. *Carol*.

— — — *Cellarii cum Castoreo*, v. *Cellar*.

— — — *Cervinus*.

Spina (D. de) l. c. p. 762.

(R. Pulv. cervin. simpl. ex typhis praepar. \mathfrak{z} vj. Sal. volat. Corn. Cerv. juxta modum Salis viperin. volat. parat. Sal. Succin. volat. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{z} \mathfrak{B} . Sacchar. Cand. alb. pulverif. \mathfrak{z} ij. Ol. still. Coriandr. Majoran. Lavendul. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ \mathfrak{z} j. M. F. Pulv. custodiatur in vitro cera optime obturato. Dos. \mathfrak{z} j — ij.)

— — — *Cervinus Zwölferi*, v. *Zwölfer*.

— — — *Cratonis*, v. *Crato*.

— — — *Daniæ Regis*, v. *Dan*.

— — — *D. F. H.*

Schroeder Pharmacop. univers. p. 520.

— — — *D. G. M.*

Schroeder l. c. p. 520.

— — — *Diaphoreticus*.

Spina l. c. p. 763.

(R. Cinnab. \mathfrak{z} n. purificat. Magist. Corali. Perlar. Cran. human. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$. F. pulv. subtilissimus. Dos. gr. x — xvj. bis in septimana.)

Dd

Pal-

Pulvis antepilepticus Doereri, v. *Doerer*.

— — — *Dolaci*, v. *Dol*.

— — — *Dorncrellii*, v. *Dorner*.

— — — *Egßii*, v. *Egß*.

— — — *Eisemengeri*, v. *Eisemm*.

— — — *Engelhardi*, v. *Engelh*.

— — — *Etmülleri*, v. *Etmüll*.

— — — *Fausßi*, v. *Faufß*.

— — — *(de) Gutteta*, v. *Guttet*.

— — — *Hartmanni*, v. *Hartm*.

— — — *Heidleri*, v. *Heidl*.

— — — *Holfaticus*.

Pharmacop. Wirtemberg. 1741. p. 260.

(R. Rad. Paeon. Gentian. āā ʒ ij. Herb. Betonic. Chamaedr. Pentaphyll. Flor. Paeon. Lilior. convall. Violar. Tiliae āā ʒ j. Semin. Paeon. excortic. Coriandr. āā ʒ ij. Rasur. Ungul. Alcis. ʒ ij. Asini ʒ v. Rasur. Corn. Cerv. Corn. Cerv. fin. ign. praepar. āā ʒ j. Cran. human. ppt. ʒ vj. Corall. rubr. albor. ppt. Margarit. orient. ppt. āā ʒ ʒ. Fol. Auri. n. xxiv. M. f. pulv. subtilissimus. Dos. ʒ ʒ — ʒ ʒ.)

— — — *Jüngkenii*, v. *Jüngken*.

— — — *Krügeri*, v. *Krüger*.

— — — *Ludovici*, v. *Ludov*.

— — — *Lujac*, v. *Luja*.

— — — *Marchionis*, v. *March*.

— — — *Mayernii*, v. *Mayern*.

— — — *Mercurialis*, v. *Merc*.

— — — *Moebii*, v. *Moeb*.

— — — *Mynsichti mirabilis*, v. *Mynsicht*.

— — — *Niger*.

Pelargi (Jo.) medicin. Jahrg. I. p. 284.

Stahl (Jo. Ern.) Collegium practic. Lipsiae 1728. 4. p. 524.

— — — *Niger Viennensis*, v. *Vienn*.

— — — *Officinalis Dispensf. Brand*.

Dispen.

Dispensator. Brandenburg. edit. ab Ern. Fagino. Erford.
1734. fol. p. 155.

(R. Corall. rubr. ppt. Cran. human. non humat. Matr. perlar. ppt.
āā 3 ij. Corn. Cerv. sine igne ppt. 3 iij. Rad. Paeon. mar. 3 j.
Sem Paeon. ij Visc. quern. Sacch. albiss. āā 3 ℞. Fol. Auri
puriss. n.v. M. F. P.)

Pulvis antepilepticus P. H. D.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 520.

— — — *Ruber.*

Pharmacop. Wirtembergica. 1741. p. 261.

(R. Rad. Paeon. Corall. rubr. ppt. āā 3 ij. Unicorn. marin. Cinnab.
nativ. Succin. ppt. āā 3 j. M. F. P. Dos. 3 ℞ — 3 ℞.)

— — — *Rudolphi Imperatoris, v. Rudolph.*

— — — *Secundinae humanae.*

Spina (D. de) l. c. p. 763.

(R. Secundin. puelli primogenit. exsiccat. 3 ℞. Cranii maris calci-
nat. 3 j. Pulv. pullor. corvi 3 ij. Coagul. lepor. 3 j. Corn. Cerv.
raf. 3 ij. Castor. 3 ℞. Succin. albiss. 3 ij. Visc. quern. luna de-
crescente collect. 3 ℞. Granor. et rad. Paeon. ante novilun. col-
lect. āā 3 ℞. Ambr. gryf. Mosch. āā 3 ℞. Spec. Dianth. dia-
plaeres. Archont. laetific. Galen. Margarit. ppt. Corall. ppt.
āā 3 j. M. F. Pulv. subtiliss.)

— — — *de Spina, v. Spina.*

— — — *Timaei, v. Tim.*

— — — *Viridis.*

Bierling (C. Th.) adversar. p. 117.

— — — (Baron a) *Wallenstein, v. Wallenst.*

— — — *Weikbardi, v. Weikb.*

— — — *Zwölferi, v. Zwölfer.*

Pulvis Cephalicus albus.

Pharmacop. Wirtemberg. 1741. p. 257. (Dos. 3 ℞ — 3 ij.)

Pulvis Cephalicus Camerarii, cum Siccharo.

Pharmacop. Wirtemberg. p. 257. (Dos. 3 ℞ — 3 iij.)

Pulvis Cephalicus Winteri.

Pharmacop. Wirtemb. p. 257. (Dos. 3 j — 3 ℞)

D d 2

Pul.

Pulvis Dresdensis niger, v. *Dresdens.*

Pulvis Halensis niger, v. *Halens.*

Pulvis Pannonicus ruber.

Pharmacop. Wirtemberg. 1741. p. 264. (Dof. 3j — 3ß.)

Purgantia.

Barbette (Paul.) Praxis Barbettian. Amsterdam. 1665. 8. (Bigæ observationum probat purgantium efficaciam.)

Caelii Aureliani. tardar. passion. L. II. c. 4. (Praxagoram et Themisonem jam ea in epilepsia dedisse.)

Chesneau (Nicol.) Observat. medic. Lugdun. 1673. Lib. I. cap. IV. obs. 3.

Deckers (Fr.) Exercitat. practic. circa medendi methodum. Leidæ 1673. 8. p. 47.

Eraſti (Thom.) Disputation. P. IV. p. 103. (frequenti purgatione epilepsia nonnunquam superatur, facilius ea quæ ab artu quodam ascendit.)

Fabricii Hildani Observat. Cent. I. obs. 41.

Galenus L. de purgantium medicamentorum facultate. (Se aptis purgantibus epilepsiam sanasse testatur.)

Galenus Consilium pro puero epileptico. (Suadet purgantia.)

Hamburg. Magazin. B. XV. Hamburg 1755. 8. p. 313. (purgans anthelminticum epilepsiam sanans.)

Kinnear Essay on the Nerves. p. 179. (purgans rhabarbarinum feliciter adhibitum.)

Kovacs Tatai l. c. p. 88. squ. (magnam copiam formularum medicamentorum alvum ducentia et in epilepsia olim usitatorum tradit.)

Mangold (Chr. Andr.) Pr. de epilepsiac nonnullis speciebus, recens. in Ej. Opuscul. Altenburg. 1767. 8. T. I. p. 49. (Tinctura rhei qua purgans felici cum successu propinata.)

N. A. N. C. Vol. VII. obs. 30.

Recueil periodique des Observations de Medecine et Chirurgie. T. I. à Paris 1754. 8. p. 403. (in quatuor epilepticis felici successu data.)

Re-

Renaulme (Paul.) Observat. Paris. 1606. 8. obf. 47. 48. (purgans aloeticum.)

Rhazes Continens. L. I. (alvum milibus ducere suadet.)

— — — L. VI. (Filogorium in L. de medicinis laxativis annotasse: sola alvi ductione curatam esse epilepsiam.)

Ruland (Mart.) Curation. empiric. (passim.)

Saillant, in Mémoires de l'Académie royal. Tom. III. à Paris 1782.

v. Giornale per servire alla storia ragionata della Medicina di questo secolo. T. II. Venezia 1784. p. 120. (epilepsiam ab abundantia humorum purgantibus sanasse.)

Septalii (Ludov.) Animadvers. et cautel. medic. Dordrecht. 1650.

8. p. 151. (purgantia in epil. adhibita interdum apoplexiam provocasse contendit.)

Tissot l. c. p. 225. squ. et p. 273. squ. (eorum efficaciam laudat, praesertim in epil. a saburra primarum viarum et vermibus, prolixiusque de eorum justa administratione tractat.)

Unzer (Jo. Aug.) der Arzt. B. V. et VI. (passim.)

Woodward (J.) Select cases and observations. London 1737. 8. p. 93. (purgantibus epilepsiam pluries avertit.)

Q.

Quarzum Crystallus. (varias intrat veterum compositiones antepilepticas.)

E. N. C. Dec. II. Ann. IV. obf. 12.

Kovacs Tatai l. c. p. 133.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 686.

Sennert (Dan.) Paralipom. ad Lib. I. Medicin. practic. paralip. 12.

Quercetani Elixir. vitae majus.

Spina l. c. p. 370.

Quercetani Nepenthe.

Quercetani (Jos.) Pharmacop. dogmaticor. restituta. Lips. 1603. 8.

Tissot l. c. p. 314. (continere opium in aromatum connubio.)

Quercetani Spiritus antepilepticus.

Quercetan. l. c.

Schre-

Schreger's (B. N. G.) kritisch. Dispensat. p. 216. (Sem. Hyperic. Paeon. Flor. Lilior. convall. Calendul. Rorismar. Hyperic. Ebur. Cranium human. Viscum quern. c. phlegm. Vitriol. digest.)

Quercetani Syrupus ant-epilepticus.

Spina l. c. p. 922.

(R. Rad. Paeon. Visc. quern. aa $\frac{3}{4}$ lb. Cinnam. $\frac{3}{4}$ lb. Flor. Calendul. Lilior. convall. Tiliae. Lavend. aa Pgl. j. Rosar. rubr. Pgl. ij. Fiat extr. c. Spirit. Junip. vel Spirit. Vin. ad emin. digit. iv. decantetur Tinctur. $\frac{3}{4}$ x. adde Sacchar. cand. $\frac{3}{4}$ iv et accendantur flagrenturque continuo agitando, donec Syrupus sit satis coctus.)

R.

Ragolo Remedium antepilepticum.

Potentillae constitutivarum exploratio.

Anonymus quidam in Allg. Litt. Ztg 1793. n. 246. (ex agarico muscario, Valeriana et oleo quodam destillato constare putat.)

Gmelin (Jo. Fr.), in Crell. chem. Annal. St. XII. 1792. p. 483. et in Feurstein. Diss. cit. p. 84. (Non analyticis solum, sed et syntheticis experimentis probare studet, continere pulverem Valerianae Magnesia. Sale ammon. et Ol. Cajep. commixtum et quidem sequens miscela ipsi arcano maxime aequabat:

R. Pulv. rad. Valer. $\frac{3}{4}$ lb. Magnes. alb. \odot Xc. depur. aa gr. iij. Singulis in pulverem tritis adde olei de Cajeput. gtt. ij.

Folia Aurantior. continere [quod Cl Knopf putat], ei non probabile videtur.)

Knopf. in Balding. N. Mag. f. A. Vol. XI. St. 3. p. 232. (vegetabilia continere quoque putat et sequens formula ei videtur arcano haud absimilis:

R. \odot rad. Valer. $\frac{3}{4}$ lb. Fol. Aurant. $\frac{3}{4}$ lb. \odot Xc. gr. ij. Ol. de Cajep. gtt. iv.)

Rozier, in Gazette de Paris. à Paris 1784.

Thi.

Thilemann, in Balding. N. Mag. f. A. B. XI. St. 1. p. 75. (e mineralibus constare putat.)

Therapeutica administratio.

(in schedula, quae pulveri venali additur, docetur.)

Vires observatae.

Abhandlung von dem berühmten und wirksam. Ragolofchen Mittel zur Heilung d. Epil.; nebst den Zeugnissen derer, welche durch den Gebr. d. Mittels sind geheilet worden. Von einigen deutschen Aerzten zum Druck befördert. Leipzig 1788. (gratis remedii emtoribus exhibetur.)

Barnusconi (Medici Veneti) Abhandl. v. d. Ragolofch. Mittel in d. Heilung der Epilepsie. (Loc. et ann. typogr. me fugit. An forsitan idem cum praecedente?)

Dolle, in Balding. N. Mag. f. A. B. XIV. St. 6. p. 441.

Feurstein Diss. cit. p. 33. (epilepsiam a coitu, aliam ab onania, tertiamque a lacte nutricis iratae ingestio ejus usu profligatam vidit.)

Gesenius (W.) Heilmittellehre. Stendal 1791. p. 418.

Jahn, in Balding. N. Mag. f. A. B. XII. St. 6. p. 495. (inefficax ei sese praebuit.)

Reinold üb. d. Gebrauch des Ragolofch. Mittels in der fall. Sucht; in der Samml. f. pr. Aerzte. B. XIII. p. 676. sq. (laudat.)

Thilemann von d. Wirkung. d. Ragolofch. Arzenci in d. Epilepsie; in Balding. N. Mag. f. A. B. XI. St. 1. p. 73—76. (laudat.)

Trecourt Traité des nerfs et des leurs maladies, dans laquelle on trouve aussi une nouvelle methode, pour guerir les convulsions et l'épilepsie par le remede de Ragolo. (Versio germanica in lucem prodiit Lipsiae 1792.)

Rana esculenta. (Siccata tota.)

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1757. (pulveris. c. lacte nutricis Cusp. j. in epilepsia infantum.)

Cor.

Schroeder l. c. p. 1757.

Hepar pulverisat.

Abel (Henr. Casp.) reformirter und ganz vollkommener Leibmedicus d. Studenten. Leipzig 1720. 8. p. 574. (laudat. Fridericum IV.

[Co-

[Comit. palatin.] per decennium ab epilepsia vexatum ejus ope
ab ea esse liberatum.)

Camerarii (Jo. Rud.) Sylloge memorab. medic. Cent. XVI. par-
tic. 41. (Specificum esse contra epilepsiam.)

E. N. C. Dec. III. Ann. IV. obs. 73.

Hartmann (Jo.) Praxis chymiatr. p. 19. (laudat.)

Schroeder l. c. p. 1757.

Welsch (Georg. Hier.) Hecatost. II. obs. 35. p. 20. (frustra adhi-
bitum esse.)

Raphanus sativus. (Radix.)

Riedlin (Vit.) Observat. medic. Cent. III. ed. filio Augusti. Vin-
delicor. 1691. 12. Cent. I. obs. 7. (cum fructu data.)

Regii Electuarium antepilepticum.

Spina (Dav. de) l. c. p. 315.

(R. Conserv. flor. Anthos. \mathfrak{z} j β . Buglossi. \mathfrak{z} β . Spec. diamosch.
dulc. \mathfrak{z} j β . Rad. Paeon. Sem. Paeon. jun. Cran. hum. Visc.
quern. aa \mathfrak{z} j. Spirit. Vitriol. gtt. xv. Syrup. de Stoech. qu. f.
M. f. Elect.)

Renodaci Electuarium fennatum.

Spina (Dav. de) l. c. p. 348. (epilepticis quoque convenire.)

Rheum palmatum. (Radix.)

Tinctura rhei.

Kinneir new Essay on the Nerves. p. 179.

Mangold (Chr. Andr.) Pr. de epilepsiae nonnullis speciebus. recus.
in Ej. Opuscul. Altenb. 1767. 8.

Rhūmelii Extractum e scoriis Argenti, v. Argentum.

Rollwagenii Liquor antimōnialis.

Zeller (J.), resp. Bauer, Theses medicae. Tubing. 1701. 4.

Rosmarinus officinalis.

Oleum Anthos.

Medicina experiment. Dygbaean. T. II. p. 318.

Ros. Solis, v. Drosera rotundifolia.

Rotulae antepilepticae Hartmanni, v. Hartmann.

— — — Michaelis, v. Michael.

— — — de Spina, v. Spina.

Rudol.

Rudolphi, Imperatoris, Pulvis antepilepticus.

Bierling (Casp. Th.) Adversar. medic. append. p. 113.

Dolaei Encyclop. medic. p. 136.

Schroeder l. c. p. 520.

Spina (D. de) l. c. p. 759.

(℞. Cinnab. antimon. ℥℔. Unicorn. ℥ij. Corn. Cerv. Visc. quern.
āā ℥j. Terr. figill. Cran. hum. ppt. Margar. ppt. āā gr. xv. Lap.
Smaragd. Cinnamom. Croc. āā ℥℔. M. F. Pulvis.)

Rulandi Pulvis antepilepticus.

Spina l. c. p. 760.

(℞. Effent. Cran. human. ℥ij. Corall. rubr. Margarit. āā ℥j. Ma-
gister. Succin. ℥vj. Spirit. Vitriol. dulc. in coag. red. ℥j. Lap.
Bezoar. ℥j℔. Ambr. gryf. ℥ij. Mosch. ℥℔. M. f. Pulvis.)

Ruta graveolens. (Herba.) (Aqua destillata, Decoctum, Infusum, Oleum, Succus.)

Alexand. Trallian. Oper. omn. Lib. I. c. 15. (jam laudat.)

A. N. C. Cent. I. obs. 85. (epilepsia decocto Rutae sanata.)

Boerhave (Herm.) Institut. Chemiae. T. II. p. 68. (aquam destilla-
tam laudat ad levandos paroxysmos.)

— — — Consultat. medic. Gotting. 1752. p. 28. (infusum
theiforme commendat.)

Borell (Petr.) Observat. et Curat. Cap. I. obs. 18. (laudat.)

Forest. (Petr.) de capitis et ventris morbis. Lib. III. Lugdun. Batav.
1590. 8. (Rutae confricatae odorem paroxysmum dissipare.)

Γεωπονικὸν Λίβρ. XII. curant. Brassican. Basil. 1539. p. 349.

Mayerne (Th. de) Prax. medic. p. 20. (laudat.)

Moor (Barthol. de) Pathol. cerebr. p. 74. (laudat.)

Plinii Histor. natur. Lib. XX. c. 13. (qua decoctum ante accessio-
nes, quarum frigus intolerabile est.)

Riedlin (Vit.) Lin. medic. Ann. IV. Octobr. 1698. obs. 25. p. 877.
(infantum epilepsiam succo sanavit.)

Schenk (Jo.) Observat. Lib. I. obs. 228.

Scholzii Consilior. L. III. cons. 4. (caput oleo inungendum ad
praecavendum paroxysmum.)

Stenzel (Ch. Godofr.) D. de Ruta medicamento et veneno. Viteberg. 1735. 4.

Tiffot l. c. p. 327.

Valleriola (Franc.) Observat. medicinal. L. VI. Lugdun. 1573. fol. L. III. obs. 7. p. 156. (Succus cum oxymelle squillitico propinatus ei se comprobavit.)

S.

Saccharum officinarum (canariense).

Reichsanzeiger. pr. 1796. Octob. p. 6201. (Infantibus cochlear magnum dimidium cum cochl. j. olei olivarum. Adultis dosis duplex. Post tertiam dosin sanatio, nisi malum inveteratum aut periodicum.)

Sacchari Saturni, v. *Plumbum*.

Sal antepilepticum Weismanni, v. *Vitriolum caeruleum*.

Sal Colcotharis.

Penoti (Bern. Georg.) Vademecum Theophrastic. Magdeb. 1607. p. 118. (laudat.)

Quercetan. (Jof.) Tetr. capit. affect. p. 153. (a ʒj — ʒß. cum felici successu adhibitum.)

Sala (Angel.) Oper. medic. chymic. Francof. 1647. p. 498.

Sal commune.

Der Landarzt. St. XII. (epilepsia forsan verminosa tribus quotidie per tres menses salis communis cochlearibus deglutitis profligata.)

Sal epilepticum Myusichti, v. *Myusicht*.

Salia lixiviosa.

Sylvii (Franc.) praxeos medicae idea nova. Lib. II. Amstelodam. 1674. 12. (epilepsiae potissimum salia lixiv. praesertim ea ad volatilitatem perducta, subvenire.)

Sal sedativum Hombergi.

Homberg, in Mémoir. de l'Academ. des Scienc. à Paris 1702. n. 2.

Reufs (A. C.) D. de sale sedativo Hombergii. Tubing. 1778. 4. p. 43.

Sal Succini, v. *Succinum*.

Sam.

Sambucus nigra.

Blockwitzii (Mart.) Anatom. Sambuci. Lipsiae 1631. 12. Sect. III.
cap. 4.

Dufour, in Gazette de Bouillon. 1775. p. 46. (baccae.)

Qua Amuletum, v. *Amuleta.*

Sanguis Aquilae, v. Aquila.

— — *Cervi, v. Cervus Elaphus.*

— — *Columbae, v. Columba Turtur.*

— — *Corvi, v. Corvus Corax.*

— — *Felis, v. Felis Catus.*

— — *Hirundinis, v. Hirundo urbica.*

— — *Humanus et ejus praeparata, v. Homo.*

— — *Leonis, v. Felis Leo.*

— — *Leporis, v. Lepus timidus.*

— — *Lupi, v. Canis Lupus.*

— — *Mustelae, v. Mustela vulgaris.*

— — *Talpae, v. Talpa europaea.*

— — *Testudinis, v. Testudo.*

Sapindus Saponaria. (Herba.)

Borell. (Petr.) Histor. et Observ. Cent. II. obs. 1. (epilepsia ejus
ope fanata.)

Semen.

Borell. (Petr.) l. c. obs. 18.

Hofmann (Fr.) Method. medend. Lib. I. c. 19. (ante paroxysmum
℥j. per trimestre semel in mense.)

Schroeder. Pharmacop. univers. p. 1415.

Sapo, hispanicus, venetus.

Barbette (Paul.) prax. Barbettiana. Amstelod. 1665. 8. (laudat Sa-
pon. hispan. 3℔. in lactis vaccini ℥iij. coctum et mane vespere-
que per triginta dies sumtum.)

Beccario (Profess. olim Bononiensis), v. Burserii Institut. med.
pract. T. III. edit. Lips. p. 257. (laudat saponem in liberaliore
dosi cum lacte praesertim asinino coctum et diutius propinatum.)

Cohaussen (Fr. Ant.), in N. A. N. C. Tom. II. p. 31. (epilepsia

- idiopathica sapone veneto in lacte soluto et per aliquot septimanas administrato sanata.)
- Scabiosa succisa.* (Herba.)
 Schroeder Pharmacop. universal. p. 1439.
- Schachtii* (Oosterdyk) *Arcanum antepilepticum.*
 Abhandl. d. Gesellsch. d. Wiss. zu Vliessingen. Th. III. (ab Archiatro Gesnero accepit. Saccharo Saturni infundatur Spirit. Nitri. Saepius moveatur lagena et propinentur aegroto omni mane gtt. vj.)
 Guerike, in Balding. Mag. f. A. 1778. St. XII. p. 1104. (ad gtt. xvj. intra novem septimanas ascendit absque successu aut noxa.)
 Schreger (B. N. G.) kritisch. Dispensat. p. 146.
- Scilla maritima.* (Radix.)
 Gardane Gazette salutare. p. 223.
 Hofmann (Fr.) Medic. rat. system. T. IV. P. III. p. 357. (medellae ea peractae exemplum.)
 Lemnii (Lev.) de miracul. occult. naturae. L. IV. p. 147.
 Zacut. Lusitani Histor. princip. med. Histor. 29.
Oxymel squilliticum.
 Plinii Histor. natur. Lib. XXIII. cap. 2.
 Saillant, in Mémoir. de l'Academ. roy. des Sciences à Paris. 1782. (usque ad vomitum dato adjunctis purgantibus epilepsiam sanavit.)
- Secale cereale.* (Succus graminis.)
 Wunderbare Kräfte der Natur durch die Sym- und Antipathie. Frankfurt u. Leipzig 1772. p. 107.
- Secundinae humanae et earum praeparata, v. Homo.*
Sempervivum tectorum, v. Bachione Arcan. antep.
Sericum ustum.
 Bresl. Sammlung. 1718. Febr. p. 698. (laudatur.)
 Heimreich jun. de holoferico remedio antepileptico. in Act. N. C. Vol. IV. obs. 17. p. 76. (vim medicatricem in \ominus et \oplus holoferici ponit.)
- Serum Lactis, v. Lac.*

Setaceum.

Beaumes l. c. p. 350.

Clarke, in London medical Journal. 1781. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. B. VII. p. 201. (in dorso cum fructu applicatum.)

Fabricii Hildani Observat. et epistol. Francos. 1646. fol. Cent. I. obs. 41. (epilepsia fetaceo ad nucham applicato sanata.)

Frank (Joh.) Bericht vom Schnurziehen. Augsburg 1683. 12. (exempla efficaciae fetaceorum in epilepsia tradit.)

Maret, in Nouveaux Mémoires de l'Acad. de Dijon. Premier Semestre 1784. à Dijon 1784. p. 149. (epilepsia a laesione digiti indicis cum aura epileptica fetaceo ad brachium applicato profligata.)

Murali (Jo.) Schriften in der Wundarznei. Basel 1691. 8. p. 113. (efficaciae exemplum.)

Paré (A.) Oeuvres de Chirurgie. Lib. IX. cap. 4.

Schenk (Jo.) Observat. Lib. I. obs. 232.

Tiffot l. c. p. 379.

Sinapis nigra. (Semen.)

Plinii Histor. natur. Lib. XX. cap. 22. (aut cum succo cucumerum aut cum cumino et fico contusum.)

Smaragdus, v. *Borax Gemma nobilis Smaragdus*.*Solanum Dulcamara.* (Stipites.)

Boerhave, v. Beaumes l. c. p. 353. (decoctum cum melle in epilepsia a metastasi acri.)

Species antepilepticae Zwölferi, v. *Zwölfer*.*Specificum cephalicum Michaelis*, v. *Michaelis*.*Spigelia anthelmintica.* (Herba.)

Beaumes l. c. p. 204.

Quarin. (J.) Animadvers. pract. p. 27.

Spina (Dav. de) *Decoctum antepilepticum*.

Spina l. c. p. 247.

(℞. Rafur. Lign. Guajac. \mathfrak{z} ij ℞. Visc. quern. \mathfrak{z} j. diger. in ∇ \mathfrak{v} j. tum coqu. ad \mathfrak{v} . adde Rad. Paeon. \mathfrak{z} ℞. Sem. Anis. \mathfrak{z} j ℞. Rad. Liquirit. \mathfrak{z} ℞. Coqu. adhuc et cola. F. Decoct. pro potu ordinar. in epilepsia usurpandum.)

Spina

Spina (D. de) Electuarium antepilepticum.

(R. Conserv. flor. betonic. Anthos. āā ʒiij. Rad. Eryng. cond. Mithridat. āā ʒj. Lign. Sassafr. ʒvj. Castor. ʒiij. Cran. human. calcin. Ungul. Alc. āā ʒij. Rad. et Sem. Paeon. Rut. sylvestr. Nigell. Rad. Pyrethr. āā ʒj. Oxymell. squill. qu. s. ut F. Elect.)

Spina (D. de) Gelatina antepileptica.

Spina l. c. p. 533.

(R. Rasur. Cran. human. Corn. Cerv. āā ʒvj. Ungul. Alc. Ebor. āā ʒij. Flor. Paeon. Tiliae. Lil. conv. Anthos. āā ʒj. Succ. Citr. ʒviij. Acet. Vin. ʒx. Coqu. et col. F. Gelatina.)

Spina (de) Pulvis antepilepticus.

Spina l. c. p. 759.

(R. Unic. ver. vel Lap. Bezoar. ʒj. Ungul. Alcis. Margarit. non perforat. Corall. rubr. ppt. alb. Corn. Cerv. ust. Rad. Paeon. Sem. Cydon. excortic. Visc. quern. Auri ungar. āā ʒʒ. Stercor. pavon. ʒj. M. F. P. Dosis pueris ʒj. adultis ʒʒ. in aqua appropriata.)

Spina (de) Rotulae antepilepticae.

Spina l. c. p. 822.

(R. Cinnam. ʒj. Rad. et Sem. Paeon. āā ʒij. Cubeb. Caryoph. Macis āā ʒj. Spec. aromat. Rosar. Caryoph. Diamb. Diamosch. dulc. āā ʒʒ. Sacchar. in aqu. flor. Tiliae et Paeon. solut. ʒiv. Ol. Anis. Macis. āā gtt. iv. F. Rotulae.)

Spina (de) Syrupus antepilepticus laxativus.

Spina l. c. p. 950.

(R. Rad. Paeon. ʒj. Fumar. Apii āā ʒij. Visc. quern. ʒʒ. Flor. Paeon. Mpl. ʒ. Tunic. Tiliae. Borrage. Viol. Anthos. Hyssop. āā Pgl. ij. Cinnam. Macis. āā Pgl. j. Coqu. in f. qu. aqu. ad ʒʒ. Colat. adde Fol. Senn. ʒj. Rad. Mechoac. ʒʒ. Turbith. ʒiij. Zingib. ʒʒ. Coqu. iterum colat. adde Syrup. de Cichor. c. Rheo. ʒiij. Coqu. ad consist. Syrupi.)

Spiraea Filipendula. (Radix.)

Schroeder Pharmacop. universal. p. 1247. (aut cibis addita aut pul.

pulverisata cum liquore appropriato epilepticis propinata laudatur
a Matth. Sylvatico.)

Spiritus antepilepticus Basilii, v. *Basil.*

— — — *Colleg. Leidens.*

Jüngken (Jo. Helfr.) *Lexicon chym. pharm.* P. II. p. 355.

(R. Fol. et Flor. Lavend. Rorism. Majoran. Salviae aa M. ij. Ca-
stor. ℥ ij. Camphor. ℥ ij. Salis Ammon. ℥ iv. Sal. Tartar. ℥ iij.
Spir. Vin. ℥ vj. ▽ Lavend. qu. s. ut ei simplicia innatare que-
ant, post trium vel quatuor dierum digestionem destillentur,
donec ℥ iij. prodierunt Spiritus, cui adde Olei Sem. Rutae
gtt. xxx. Succin. rectific. gtt. xx. Macis. Juniper. aa gtt. xl.
Misce et ferva. — Hoc Sal volatile oleosum esse penetrantissi-
mum et insignium virium ad omnes morbos convulsivos et spas-
modicos, tam interne dosi gtt. x—xx. vel ultra propinatum
quam externe in paroxysmo naribus applicatum.)

— — — *Dolaci*, v. *Dol.*

— — — *Dresleus*, v. *Felis Leo.*

— — — *Paracelsi*, v. *Paracels.*

— — — *Quercetan.*, v. *Quercet.*

— — — *Urinae humanae*, v. *Homo.*

— — — *Vitrioli Dispens. Brand.*, v. *Vitriolum.*

— — — *Vitrioli Hartmanni*, v. *Hartmann.*

Spiritus Cerasorum nigrorum, v. *Prunus avium.*

— — *Cranii humani*, v. *Homo.*

— — *Juniperi*, v. *Juniperus communis.*

— — *Nitri dulcis*, v. *Nitrum.*

— — *Sanguinis humani*, v. *Homo.*

— — *Stercoris Leonis*, v. *Felis Leo.*

— — *Vitrioli*, v. *Vitrioli Acidum.*

Stablii Pilulae balsamicae.

Juch (H. M.), resp. J. G. Hannimann, D. f. facillimam ac certissi-
mam methodum curandi epilepsiam. Erfordi 1741. 4. (hasce pi-
lulas valde laudat.)

Stannum. (Limatura.)

Fothergill, in *Medical Observations and Inquiries.* Vol. VI. Lon-
don

don 1784. n. 9. (per octiduum quotidie $\zeta j.$ in electuario laudat contra epilepsiam verminosam.)

Stercorea.

Macasii (Georg.) Promptuar. mater. medic. (passim.)

Paullini (Chr. Fr.) Dreckapotheke. Frankfurt u. Leipzig 1748. 8.
Sect. I. p. 20. Sect. II. p. 6.

Sebitz (Melch.) Manuale l. speculum medicinae practicae. Tom. I.
Argentor. 1661. 4. p. 276. squ.

Stercus Asini, v. *Equus Asinus*.

— — *Cameli*, v. *Camelus*.

— — *Caprarum*, v. *Capra Hircus*.

— — *Ciconiae*, v. *Ardea Ciconia*.

— — *Coturnicis*, v. *Tetrao Coturnix*.

— — *Crocodili*, v. *Lacerta Crocodilus*.

— — *Hirci*, v. *Capra Hircus*.

— — *Humanum*, v. *Homo*.

— — *Leonis*, v. *Felis Leo*.

— — *Pavonis*, v. *Pavo cristatus*.

— — *Vaccae nigrae*, v. *Bos Taurus*.

Sternutatoria.

Cael. Aurelian. Chronicor. Lib. I. cap. 4. (noxia esse.)

Celsus de medicina: Lib. III. cap. 28. (item.)

Diocles Carystius, v. Cael. Aurelian. l. c. (laudat.)

Kovacs Tatai l. c. p. 101. (commendat et sternutatorii in epilepsia cum fructu adhibendi formulam tradit sequentem:

R̄. Sem. Lolii, Nigellae. Rad. Helleb. alb. \overline{aa} $\zeta j.$ Herb. Majoran.
Salviae. Anthos. \overline{aa} $\zeta j.$ Moschi. gr. ij. F. Pulv. subtiliss. ex
quo pisi quantitas naribus inspiretur.)

Marryat (Thom.) Handb. der pract. Arzneiw.; a. d. Engl. Leipzig
1793. 8. (pulverem Euphorbii, piperis et hellebori naribus epilepticorum inflare suadet.)

Praxagoras, v. Cael. Aurelian. Chronicor. L. II. c. 4. (laudat.)

Tiffot l. c. p. 389. (noxia esse ob irritamentum et sanguinis congestionem eo excitatam.)

Val.

Valsalva, v. Morgagni de sed. et caus. morbor. Epist. IX. §. 6.
(noxia esse.)

Struvii Pilulae antepilepticae.

Struve (O. G.) Essays ou reflexions interessantes etc. avec une dissertation sur la question: Si les causes des maladies de l'ame et des nerfs ont toujours leur siege dans le cerveau? à Lausanne 1772. 8.

Strychnos Nux Vomica. (Fructus. — Extractum.)

Gebauer, v. Jo. Henr. Schulzii Praelect. de virib. et usu medicamentorum. p. 404.

Hufeland (C. W.), in Journ. der pract. Arzneik. B. I. St. I. p. 109.

Reze (G. H. A.) D. de nuce vomica. Jenae 1788. 4. p. 20. (ob vim anthelminticam in epil. verminos. commendat.)

Schlereth Dispensator. Fuldense. p. 31.

Sidren (Jon.), in Act. medic. Suec. T. I. Upsal. 1783. 4. p. 367.

Syrax Benzoin. (Flores chemicæ.)

Räimert (Car. Benj. Andr.), præs. P. J. Hartmann, D. sist. varias epilepsiae medendi methodos. Francof. ad Viadr. 1787. p. 11.
(ob vim analepticam commendat.)

Succinum. (cfr. Mosch. arte fact. Liqueur. C. C. succinat.)

Hofmann (Fr.) Medicin. ration. system. T. IV. P. III. p. 20.

Ludovici (Dan.) Pharmac. p. 516.

Reinike (G. G.) D. de moscho natural. et arte facto. Jenae 1784.
(varia auctorum testimonia collecta tradit.)

Oleum.

Cullen (W.) Treatise of mater. medic. Vol. II. p. 361. (oleum succini plus una vice destillatum medicinam esse efficacem in epilepsia ad gtt. xxx. propinandum.)

Riverii (Lazar.) Prax. medic. p. 32. (co sanatae epilepsiae exemplum.)

Sal volatile.

Beattie (Guil.) Aphorismi de cognoscend. et curand. morbis. edit. D. S. de Matai. Halae 1780. 8. (praestantissimum esse remedium in epilepsia infantum.)

Moor (Barthol. de) Patholog. cerebri. (passim.)
Riequet, v. Beaumes, l. c. p. 204.

Suffimentum antepilepticum Mynsichti, v. Mynsicht.

Sulphur. (Manu complexum aggrediente paroxysmo.)

Ackermann, in annot. ad version. german. Tissot. l. c. p. 363.
not. 67.

Whytt (Rob.) von den Nervenkrankheiten. p. 353. (interdum ju-
vante testatur et hunc effectum attentioni et fiducia aegroti ex-
citatae tribuit.)

Odor accensi Sulphuris.

Bierling (Casp. Th.) Adversar. medic. p. 18. obs. 7.
Plinii Histor. natur. L. XXXV. cap. 15.

Sulphur venereum, v. Cuprum.

Superstitiosa varia.

Bresl. Samml. Versuch V. p. 1702. (mappa triclinalia, in qua
antea jam sacra coena administrata fuit, capiti aegroti imponenda.)

Osiander (F. B.) Lehrb. der Hebammenk. Götting. 1796. 8. p. 629.
(meminit moris, faciem infantum epilepticorum textura nigra
[sic dicta Flohr] obtegendi et pollices spassice in volam contra-
ctos omni adhibita vi explicandi.)

Storch (Jo.) von den Kinderkrankheiten. B. II. p. 116.

(Linea corallina a sacerdote quodam consecrata collo applicata.

Athenum haereditate acquisitum infantibus epilepticis impositum.

Panni haereditate acquisiti, et indusia a compatre gestata ad invol-
vendos infantes.)

Wunderbare Kräfte der Natur durch die Sym- und Antipathie. Frank-
furt u. Leipzig 1772. p. 107. (ad paroxysmum profligandum ae-
ger nomine in actu baptismatis accepto invocandus et sequentia
verba distincta voce ei acclamanda: „Creatura! memento crea-
toris tui!“)

Zulachtes, v. Haller. Bibl. med. pract. T. I. p. 303. (jam super-
stitiosa quaedam contra epilepsiam commendasse.)

Suppositorium antepilepticum Mynsichti, v. Mynsicht.

Sus scrofa. (Aper.)

Offa petrosa capitis.

Hartmann (Jo.) Prax. chymiatr. p. 19.

Testiculi.

Cael. Aurelian. Chronic. Lib. I. cap. 4.

Plinii Histor. natural. L. XXVIII. cap. 10.

Sinibaldi (Jo. B.) Geneanthrop. L. III. p. 310.

Urina.

Plinii Histor. natural. l. c.

Vesica cum lotio.

Heers (Henr. ab) Observat. med. p. 210. (in furno siccata.)

Syrupus antepilepticus Quercetani, v. Quercetan.

— — — *de Spina, v. Spina.*

T.

Talpa Europaea.

Cinis.

Hirschel (E. L.) von der Fallsucht. p. 5. §. 4.

Paullini (Chr. Fr.) Talpa. Francof. et Lipsiae 1689. 12. p. 132.

Waldschmidt (Jo. Jac.) Prax. medic. p. 311.

Cor.

Bartholin (Thom.) Acta Havniens. Vol. IV. obs. 50. p. 153.

Sanguis.

Mayerne (Th. de) Prax. medic. p. 21.

Reusner (Nicol.) Observat. medic. p. 30.

Viscera.

Mayerne (Th. de) l. c. p. 21.

Tartarus emeticus, v. Antimonium.

Taxus baccata. (Extractum.)

Harmand, in Journal de Medecine. 1790. vid. Hufeland Annal. der franzöf. Arzeneikunde. B. I. p. 148. (per restitutionem mensium epilepsiam mitigans. Dos. gr. j — ij. sensim augendo.)

Loder (J. Chr.), resp. J. C. Reddelien, D. de taxo baccata. Jenae 1794. 4.

Teucrium Chamaepytis. (Aqua ex herba destillata.)

Schroeder Pharmacop. univers. p. 1181.

Terentii Electuarium antepilepticum.

Kovacs Tatai l. c. p. 128.

Murellus (Phil.) de Myster. medic. p. 87.

Testiculi Apri, v. Sus Scrofa.

— — *Asini, v. Equus Asini.*

— — *Ursi, v. Ursus Arctos.*

Tesudo.

Fel.

Plinii Histor. natural. L. XXXVII. cap. 4. (naribus illitum paroxysmos sedare.)

Sanguis.

Camerarii (Jo.) Sylloge memorab. medic. Cent. XVI. partic. 38.

Plinii Histor. natural. l. c.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 1804. (Siccati ʒ ij.)

Serapion, v. Cael. Aurelian. Chronic. Lib. I. cap. 4.

Tetrao Coturnix.

Cerebrum.

Camerarii (Jo.) Sylloge l. c. partic. 42.

Ova.

Hoefer (Wolfg.), v. Le Clerc leichte Medicin. Dresden 1711. 8. p. 85. (Siccata pulverisat. ʒ ʒ.)

Stercus.

Hartmann (Jo.) Prax. chymiatr. p. 19.

Hoefer Hercules medicus. p. 97.

Macasii (Jo. Georg.) Promptuar. mater. med. p. 35.

Tetrao Perdix. (Hepar.)

Craton. a Craftsheim Epistol. et consil. medic. p. 263.

Tetrao Urogallus. (Lingua.)

Appel (J. J.) Discursus de epilepsia. Altenburg 1713. 8. p. 39. (ventibus excisa siccataque.)

Thea Babea. (Folia.)

Molinariis (Sim. de) Ambrosia Asiatica seu de virtute et usu herbae

bae Theae five Cia. Genovae 1672. 12. (eorum laudes contra epilepsiam habet.)

Tilia europaea. (Flores, Ligni carbones, Radix.)

Aqua destillata e floribus parata.

Mizaldi (Ant.) Memorabil. Cent. IX. aphor. 25.

Infusum florum theiforme.

Hofmann (Fr.) Opuscul. medic. p. 227. (ejus diuturno usu chronicam epilepsiam prostrigasse.)

Ligni Carbones.

Hirschel (E. L.) l. c. §. 4. p. 5.

Hofmann (Fr.) Observat. physic. chemic. select. Libr. III. Halae 1736. 4. p. 304. obs. 13.

Ruiandi (M.) Thesaur. medic. ed. Car. Raiger. p. 4 et 7.

Radix Liqueur.

Tilemann L. de mater. medica. p. 308. (e radice tiliae mense Februar. transversim incisa supposito vase vitreo bene tecto collectus, dein rectificatus et purificatus contra epilepsiam laudatur.)

Somnus in tiliæ umbra.

Paulini (Chr. Fr.) Observat. med. physic. Cent. I. obs. 41.

Timaei a Guldengklee Electuarium antepilepticum.

Spina l. c. p. 315.

(℞. Pulv. antep. Timaei ℥℥. Medull. nuc. indic. cond. ℥vj. Confect. Alkerm. de Hyac. aa ℥ij. Magist. Lunae ℥ij. Spirit. Lil. convall. flor. Tiliae, Rosar. aa ʒj. Essent. Ambr. ℥ij. Syrup. Paeon. qu. s. F. Elect.)

Timaei a Guldengklee Elixir antepilepticum.

Spina l. c. p. 361.

(℞. Rad. Paeon. ℥j. Doron. Dictamn. Dentar. aa ℥℥. Flor. Paeon. ℥vj. Lil. conc. Lavend. Stoech. arab. Prim. ver. Tunic. Anthos. Tiliae aa ℥℥. Sem. Paeon. Visc. quern. aa ℥v. Nuc. mosch. . . . affunde Spirit. Ceras. nigr. ad emin. 4. digit. Spirit. in digest. NB. p. 3. d. postea exprim. fortiss. et colat. Sp. abstrah. ad dimid. resid. adde Theriac. Androm. ℥j℥. Mithrid. ℥℥. Castor. ℥ij. Sal. Succin. ℥iv. diger. p. triduum et filtrat. adde Tinct. Lunae ℥℥. F. Elix.)

Ti-

Timaei a Guldendlee Pulvis antepilepticus.

Bierling (Casp. Til.) Adversar. curios. Append. p. 108. (laudat.)

Spina (D. de) l. c. p. 758.

(R. Magist. Lunae ʒiii. Perl. orient. Corall. rubr. Lap. Cancr. Succin. alb. Matr. perlar. aa ʒj. Cran. human. ʒiv. Corn. Alc. philosoph. ppt. ʒij. Corn. Cerv. sine igne ppt. ʒjʒ. Faecul. Paeon. ʒv. M. F. P.)

Timaei a Guldendlee (Balthaf.) Oper. medic. pract. Lips. 1677.

p. 157.

Tinctura antepileptica Dolaci, v. Dol.

— — — Fulleri, v. Fuller.

— — — Langii, v. Lang.

— — — Michaelis, v. Michael.

— — — Petri, v. Petr.

— — — Vitrioli Fischeri, v. Fischer.

— — — Waldschmidt, v. Waldschmidt.

Tinctura Auri, v. Aurum.

— — Bezoardica Michaelis, v. Michaelis.

— — Coralliorum, v. Isis nobilis.

— — Cupri alcalina, v. Cuprum.

— — — Stiffi, v. Vitriol. caeruleum.

— — Liliorum alborum Langhansii, v. Liliam candidum.

— — Lunae, v. Argentum.

— — Martis belleborata, v. Ferrum.

— — Picarum, v. Corvus Pica.

— — Rhei, v. Rheim palmatum.

— — Solis, v. Aurum.

— — Veneris Helvetii, v. Vitriol. caerul.

— — Zincea, v. Zincum.

Tonsio Capitis.

Celsus (Aurel. Corn.) de medicina. L. III. c. 28. edit. Almeloy.

p. 174.

Trepanatio

Abernethi Quaestiones medicae Monspelienses. Monspeliae 1617.

4. p. 97. (ventilatur quaestio: an epilepsiae cranii perforatio.)

Are-

Aretaei diuturn. curat. Lib. I. cap. 4. (optimo cum eventu cranium perforabat in epilepsia, quum dura mater esset denigrata.)

Caelii Aureliani. tardar. passion. Lib. II. cap. 4. (terebrae usum rejicit in epilepsia.)

Kite (K.) über die Wiederherstellung scheinbar todter Menschen etc. a. d. Engl. von D. C. F. Michaelis. Leipzig 1790. 8. p. 190. (feminam epilepticam, quae triginta quadragintave paroxysmos per diem [intercedente gravissimo delirio] experta fuerat, trepanationis ope sanavit.)

Lysons (Dan.) Essays etc. p. III.

Marchettis (Petr. de) Observat. chirurg. Patav. 1664. (Epilepsiam a vulnere capitis justo citius clauso trepanatione sanavit.)

Motte (de la) Traité complet de Chirurgie. Tom. II. p. 409. obs. 172. (in epilepsia absque manifesta causa cum levamine adhibuit terebrae usum. Occluso vulnere autem rediit epilepsia.)

Rhodii (Jo.) Observation. Cent. I. obs. 66.

Stalpart van der Wiel Observat. medic. Cent. I. obs. 8. p. 36. (epil. a lapsu plenarie sanata trepanatione.)

Themison, v. Cael. Aurel. tard. passion. Lib. II. cap. 4. (jam bregmatis perforationem in epilepsia commendavit.)

Tissot l. c. p. 246. squ.

Troglieri Pilulae catharticae.

Dell'Arme Saggio di Medicina pratica. T. II. p. 92.

Novelle Lettere di Firenze 1762. p. 183.

(R. Hydrargyr. \mathfrak{z} j. Solv. et exstingu. c. Therebint. \mathfrak{z} vj. add. Agaric. Extract. Rhei. aa \mathfrak{z} ij. Aloes. succotr. \mathfrak{z} iiij. M. f. Pilul. quarum semidrachma alternis diebus per VI. menses, deinde per alios VI. quovis quarto vel quinto die dumtaxat data et de super hausto decocto Radic. Valerian. sylvestr. feminam epilepticam feliciter persanavit.)

Trutta Fluviatilis. (an Salmo fluviatilis. L.?) (Ossa.)

Welsch (Georg. Hier.) Hecatoest. II. obs. 90. p. 57. (proficua esse in epilepsia infantum.)

Tussilago Petasites. (Radix.)

Swieten (Ger. van), v. Cranz. Mater. medic. T. II. p. 162. (laudat

dat infusum ex radicis ℥j. et hydromiell. ℥j. cujus aliquot unciae omni mane jejuno stomacho diutius potandae, subjuncta bis vel ter de mense medicina laxante.)

U.

Ulcera arte facta. (cfr. *Canterium*, *Fonticul.* *Setaceum*. *Ulsio*. *Vesicatoria*.)

Bromfield (Will.) *chirurgical observations and Cases*. T. I. London 1773. (*Ulcera arte facta* in epilepsia a sero in capitis laesione extravasato in partem posteriorem suturae squamosae sic dictum additamentum suturae temporalis applicata utilissima putat.)

Maurer (F. G.) *Comm. de medicam. antepilept.* p. 37.

Umbilicus hominis, v. *Homo*.

Ungtio.

Albertini, v. Jo. B. Morgagni *Opuscul. miscell.* Venetiis 1763. p. 77. (olei amygdalor. calesfacti magno cum levamine tentata.)

Celsus (Aur. Corn.) *de Medicina*. Lib. III. cap. 23. Edit. Almelov. p. 174. (olei, adjecto aceto et nitro.)

Tissot l. c. p. 390. (non plane esse rejiciendam.)

Unguentum antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 1033.

(℞. Cinnab. nat. ℥℥. Lap. Ophit. ℥j℥. Magnet. ℥ij. Olei destill. macis. express. nuc. mosch. destill. Guajac. Coryl. āā gtt. iij. Confect. Alkerm. de Hyacynth. āā ℥℥. Ungu. de Alabastr. qu. s. F. Ungu.)

Ungula Alces, v. *Cervus Alces*.

Unicornu fossile.

Boodt (B. de) *de Lapid. et gemm.* L. II. cap. 242.

Grubel (J. G.), in E. N. C. Dec. II. Ann. VIII. obs. 36.

Kovacs Tatai l. c. p. 118. (*Unicornu fossile*, quod in specu Baumanniano reperitur contra epilepsiam usitatum.)

Schroeder *Pharmacop. universal.* p. 706.

Unzeri Liquor viridis, v. *Argentum*.

Urina humana, v. *Homo*.

Urina

Urina Suis, v. *Sus scrofa*.

— — *vaccæ*, v. *Bos Taurus*.

Ursus Arctos. (Fet.)

Waenerberg, v. kongl. Svensk. Vet. Ac. Handl. för År 1765.
Stockholm 1765. p. 324. (in comitiis 1756. remedium antepi-
lepticum obtulisse e felle urfi et floribus liliorum convalliorum.)

Testiculi.

Plinii Histor. natur. L. XXVIII. cap. 10.

Urticatio.

Miccoli (Joseph.), vid. Ernest. Setti (Medic. Doctor. Correg-
giani) Diss. de urticatione in L. Brugnatelli Bibliotheca fisica.
Tom. XI. Pavia 1789. n. 6. (feliciter eam adhibuisse in epilepsia
obstinata.)

Ustio. (cfr. Moxa.)

Albucasis Chirurgicor. Lib. I. (ustionem jam commendat in epi-
lepsia.)

Beaumes l. c. p. 349. squ.

Bernais (du), in Journ. de Medecine. 1790. Fevrier. (inefficacem
fuisse.)

Comte (de la), in Journ. de Medecine. T. LXXVII. p. 53.

— — — — — 1789. Novbr. n. 9.

Delius (H. Fr.), resp. J. P. J. Rudolph, D. de cranii ustione in
epilepsia. Erlang. 1768. vid. Balding. Auszüge. T. I. p. 44.
(exempla felicitis successus collecta. Periculum Vindobonae a Cl.
de Haen factum male successisse, quod tegumenta fuerint remota
et resecta.) (cfr. cit. de Haen.)

E. N. C. Dec. I. Ann. II. obs. 9.

— — — II. Ann. V. obs. 155.

Forest. (Petr.) Observat. Lib. X. obs. 61. (nuchae et calvariae.)

Haen (Ant. de) Rat. medend. P. VI. p. 254. (periculosissimam esse
habendam; imo lethalem esse expertum. cfr. cit. Delius.)

Heister (Laur.) Institut. chirurg. P. II. p. 38.

Lamzweerde (Jo. B.) App. ad Armament. medic. chirurg. p. 133.
(cranii.)

Gg

Mar-

- Marcell. Donat. de medic. histor. mirab. Lib. II. cap. 4. p. 149.
(cranii.)
- Marles (Rich.) et Fr. Pijart D. Ergo epilepsiae *πυρίμας*. Paris
1622.
- Maurer (F. G.) Comm. de medicam. antepil. p. 37.
- Meekren (Job. van) Heel- en geneeskondige Anmerkingen. Am-
sterdam 1668. 8. Cap. 5. p. 45. (epilepsia cauterio ad coronariae
et sagittalis futurae concursum adinoto sanata.)
- Mercuriis (Scip. de) degli errori popolari d'Italia. Venet. 1603. 4.
Lib. VI. (Florentinos ad epilepsiam avertendam infantibus mox
post partum nucham adurere.)
- Panaroli (Domin.) Jatrologism. Pentecostiae V. Romae 1652. 4.
Pent. II. obs. 39. Pent. IV. obs. 37. (abulum cauterii in nucha
vituperat.)
- Piso (Car.) de morbis capitis. S. II. P. II. cap. 8. (nuchae unctionem
laudat.)
- Praxagoras, v. Cael. Aurelian. tard. passion. Lib. II. cap. 4.
(jam unctionem in epilepsia commendavit.)
- Rochard, in Journ. de Medecine. 1739. Aout. n. 5. (laudat.)
- Schenk (Jo.) Observat. Lib. I. obs. 233. (varia felicitis successus
exempla.)
- Sennert (Dan.) Paralipom. ad Lib. I. Medic. pract. n. 14. (unctio
pollicis pedis cum fructu tentata.)
- Severini (Marc. Aur.) de efficac. medic. L. III. Francof. 1671. fol.
p. 212.
- Themison, v. Cael. Aurelian. tard. pass. L. II. cap. 4. (jam lau-
dat eam in epilepsia.)
- Tiffot l. c. p. 243 et 379. squ.
- Tulpilii (Nicol.) Observat. medic. Lib. I. cap. 56. (nuchae.)
— — — Lib. IV. cap. 3. (pollicis pedis.)
- Zechii (Jo.) Consultat. medicin. Romae 1601. 4. (cauterium ad-
moveret inter primam et secundam vertebra.)

V.

Valeriana officinalis. (Radix.)

Andree Cases of Epilepsy. p. 262. (ex ejus usu ventriculum labefactari.)

Anfiaux Observation sur une epilepsie epidemique guerrie par l'usage de la racine de Valeriane, in *Esprit des Journaux*. T. XI. Paris 1785. p. 355 et 377. (laudat.)

Aretaei diurn. curat. Lib. I. cap. 4. (jam epilepticis commendat.)

Beaumes l. c. p. 203. (variorum laudes de ejus usu collectae.)

Bergii Mater. medic. e regno vegetab. T. I. p. 31.

Bouteille, in *Journal de Medecine*. Tom. L. (praecepit in Epil. a faburra primarum viarum et vermibus. Interdum autem spem quoque fallere.)

Burserii Institut. medic. pract. T. III. ed. Lips. p. 84.

Cannengieser D. de epilepsia. Lugd. Batav. 1672.

Chomel Abregé de l'histoire des plantes usuelles. T. I. p. 71 et 228. (plures epilepticos se ea sanasse refert.)

Columna (Fab.) *Phytobasanos*. Napoli 1592. 4. p. 97. (se ipsum ejus ope ab epilepsia liberavit.)

Comparetti (Andr.) *Occursus medici de vaga aegritudine infirmitatis nervorum*. Venetiis 1780. 8. p. 303. (ejus efficaciam affirmat propriaque experientia edoctus statuit, eam iis esse proficuum, quibus sunt fibrae crassae et laxae; inutilem vero, imo noxiam, graciliorem tensemque fibram habentibus.)

Crüger (Dan.), in *E. N. C.* Dec. II. Ann. VII. obs. 78. (epilepsiam ex terrore eandemque ab ira ejus usu profligavit.)

Cullen (Will.) *Treatise of Mater. medic.* p. 372. (Saepius efficacem reperit.)

Cullen (Will.) *Anfangsgr. d. Arzneiw.* T. III. p. 187. (maximam partem antispasmodicorum e regno vegetabili depromptorum inefficacem esse et non sperandum, fore, ut vires radiceis Valerianae a multis laudatae experientia confirmarentur.)

Dispensator. Fuldenf. p. 40. (laudat. Effodiendam esse mense Martio, antequam caulem edidit.)

- Dresky (Guil.) D. de Valeriana officinali. Erlangae 1776.
- Feurstein (J. H.) Diff. cit. p. 66.
- Fothergill, in Medical Observat. and Inquir. Vol. VI. London 1784. (causam epilepsiae praecipue in ventriculi distensionem ejusque et intestinorum repletionem statuens, Valerianae similibusque medicamentorum salutar. in effectum ab aegrotorum iis imminuto appetitu derivat.)
- Friborg, v. Tode medicin. Bibl. B. I. p. 117.
- Grossin Dühaume Traité de petite verole, augmentée d'une Traité sur les remèdes domestiques. à Paris 1779. 8. p. 507. (laudat.)
- Haen (Ant. de) Rat. med. P. V. c. 4. §. 2.
- — — P. VI. p. 317. (efficaciae exempla.)
- Haller (Alb. ab) Histor. stirp. helvet. p. 92 et p. 210. (laudat.)
- Hill von d. Tugenden d. Baldrians; a. d. Engl. Nürnberg 1765.
- Hirschel (L. E.) Gedank. über d. Heil. d. fall. Sucht. ed. secunda. p. 34. (cortici peruviano esse postponendam.)
- Lentilius (Ros.), in E. N. C. App. ad Dec III. Ann. III. p. 86. (feminis ex obstructione mensium epilepticis praesertim conducere)
- Locher (Max.) Observat. pract. p. 40. (initio levamen quidem attulisse, paulo post autem pristinum malum eadem vehementia repullulasse.)
- Marchant, in Mémoir. de l'Acad. des Scienc. à Paris 1700. p. 335. (pluribus epilepticis cum fructu dedit.)
- Maurer (Fr. Guil.) Comm. de medicam. antepil. p. 13. sq.
- Mead, v. Mead Electuar.
- Medizin. Wochenblatt. 1781. n. 21. (adhibitis jam antea anthelminticis cum fructu in epil. propinata.)
- Panaroli (Dominic.) Jatrologism. Pentecost. I. obs. 33. p. 20. (Sanationis ea peractae exempla.)
- Pfündel, in C. W. Hufeland, Journal der pract. Arzneiw. B. II. St. 2. p. 256. (in connubio visci. querni et infusi theiform. folior. aurantior. cum fructu data.)
- p. 281. (in visci connubio.)

- Planus (Jan.), in Annotat. ad Fab. Columnae Phytobasium. (Solam efficaciam in epil. verminosa ei tribuit.)
- Quarin (Jos.) Animadvers. pract. p. 25. (praestantissimum longe remedium esse.)
- Riverii (Laz.) Prax. medic. Lib. I. p. 62.
- Sauvages (Boiss. de) Nosol. method. T. III. P. II. p. 231. (epilepticum per XII. annos sub quolibet veneris exercitio paroxysmo correptum ea sanasse)
- Schacht (Joh. Oosterdyk.) Institut. medic. pract. Traject. ad Rhen. 1767. 4. p. 64. (efficacissimum esse remedium antepilepticum.)
- Schuchmann (Christoph.), in E. N. C. Dec. II. Ann. IV. obs. 44. p. 116. (epilepsiam ex terrore ortam ejus opē sanasse.)
- Scopoli Flora Carniol. p. 347. (epil. ex terrore ea sanavit.)
- Sebitz (Melch.) Conspect. Medic. pract. P. II. Sect. II. c. 4. p. 278.
- Selle neue Beiträge. Th. I. (laudat.)
- Spiegs (J. G.) D. de Valeriana. Helmstad. 1724.
- Sprengel (K.), in Annot. ad W. Buchan. Hausarzneikunde; aus d. Engl. Altenburg 1792. (principem esse antepilepticorum.)
- Sylvii (de la Boe) Opera omn. p. 427. (paeoniae praefert.)
- Thilenius medic. chirurg. Bemerk. Frankfurt am M. 1789. p. 129. (multos ea sanasse.)
- Tiffot l. c. p. 235. squ. (primum locum inter sic dicta specifica antepileptica tenere. Contra Cl. Andree contendit, minime ejus usum debilitare digestionis organa. Initio quidem majori dosi sumtam producere anxietatem, quod autem evitari posse, si in minori dosi et in pulveris florum macis connubio propinetur.)
- Tode (Jo. Clem.) Diss. sist. praestantissimam rationem illustrandi materiam medicam practicam. Havniae 1778. (absque successu datam esse.)
- Unzer Bestätigte Beobachtungen v. d. Mittel des Fabius Columna wider die fallende Sucht. v. Gesellschaftl. Erzählungen. St. 64. et N. Hamburg. Magaz. B. XVIII. St. 103. p. 74—83.
- Whytt (Rob.) von d. Nervenkrankheiten. p. 513. (in mentis alienatione cum epilepsia juncta proficuum fuisse.)
- Willis (Thom.) Tr. de morbis convulsivis. c. 24.

Oleum destillatum:

Sagar (Jo. Mich.) *Systema morbor. symptom.* Viennae 1771. p. 39.
(summum in epilepsia remedium esse.)

Thilenius *medicin. chirurg. Bemerkungen.* p. 131. (juvenem ex
terrore epilepticum hocce oleo sanavit.)

Valeriana Pbu. (Radix.)

Bergius *Materia medica e regn. veget.* T. I. p. 31. (amaritie et foetore superare praecedentem.)

Linnée *Amoenitat. academ.* P. II. p. 135. (officinali longe praestantio-
riorem esse.)

Scopoli *Annus Histor. natur.* IV. p. 141. (epilepticis commendat.)

Venaesectio.

Arcefin (Petr.) *Quaest. medic. an epilepsiae rara venaesectio?* affirmat
Lud. Gilbert. Boyrot de Joncheres. Paris 1761. 4.

Aesclepiades, v. Cael. Aurelian. *Chronic.* L. II. c. 4. (jam epilepticis eam commendavit.)

Barbette (Paul.) *Prax. Barbettian.* Amstelodam. 1665. 8. p. 93.
(epil. sola venaesectio et medicam. purgantibus sanata.)

Beaumes l. c. p. 116. et p. 353.

Bonnet (Theop.) *Mercur. compilativus.* Cap. de Epileps. §. 5. (in
epil. ex terrore proficua erat.)

Burserii a Kanilfeld *Institut. med. pract.* T. III. edit. Lipsiae.
p. 246. sequ. (laudatur in Epil. a plethora, haemorrhoidibus men-
sibus et narium haemorrhagiis suppressis.)

Cael. Aurelian. *tardar. passion.* Lib. I. c. 4.

Celsus (Aur. Corn.) *de Medicina.* ed. Almeloven. p. 172.

Diocles Carystius, v. Cael. Aurelian. *Chronic.* L. II. cap. 4.
(in epil. a vinolentia et carneo victu orta venam secabat.)

Edimburg. *Medical Comment.* B. VII. p. 72.

E. N. C. *Centur.* III. et IV. obs. 132.

— — *Decur.* III. *Ann.* IX. obs. 185.

Fevre (J. F. le) *Opera medic.* Veruntiae 1737. p. 61.

Friborg, v. Tode, *medicin. Bibl.* B. I. p. 117.

Graef (Jo. Paul.) *D. sist. casum de motibus epileptico-convulsivis her-
niae*

- niae incarceratae supervenientibus per venaesectionem sublatis.
Altorf. 1747.
- Hagendorn (Ehrenfr.), in Medicin. septentr. T. I. p. 115. (venae jugularis sectio cum fructu instituta.)
- Hoechstætter (Phil.) Observat. med. Decur. VIII. cas. 20.
- Hofmann (Fr.) D. de vera mali epileptici causa. §. 31. (venae jugularis sectionem commendat.)
- Marryat (Thom.) Handb. d. pract. Arzneikunde; a. d. Engl. Leipzig 1793. 8. p. 109. (nunquam in epilepsia venaesectionem esse adhibendam.)
- Moor (Barthol. de) Patholog. cerebri. (passim commendat.)
- Panzani, in Giornale di Medicina. Vol. XIII. Venetiis 1776. (repetita paroxysmos non mitigavit, sanguine etsi nimis denso.)
- Pargetes (Will.) Abhandl. über d. Wahnsinn; a. d. Engl. Leipzig 1793. p. 91. (praecipue in epilepsia cum mentis alienatione esse proficuum.)
- Pechlin (Jo. Nicol.) Observat. med. Lib. II. obs. 30.
- Recueil periodique des observations de Medecine. T. I. à Paris 1754. 8. p. 403. (Anonymus quidam ventilat quaestionem: „Utrum venaesectio epilepsiae paroxysmos praecaveat aut potius revocet?“ Quatuor epilepticos in medium profert, purgatione et venaesectione curatos, quibus omnibus sub finem curationis venaesectionem prophylacticam quolibet trimestri repetendam felicissimo cum successu commendavit.)
- Richard. (Nicol.) et Phil. Caron. D. Ergo epilepsiae venarum jugularium sectio. Parisiis 1689.
- Rhodii (Jo.) Observat. medic. Cent. I. obs. 64.
- Riedlin (Vit.) Lin. medic. Ann. I. p. 454.
- Rosetti, in Epist. ad Burserium. v. Burserii l. c. p. 248. (in epil. idiopathica cum fructu eam tentavit.)
- Sauvages (Boiss. de) Nosolog. method. T. I. p. 581.
- Severinus (M. Aur.) de efficac. medicina. p. 42.
- Themison, v. Cael. Aurelian. Chron. Lib. I. cap. 4. (jam eam in epilepsia commendavit.)

Tiffot l. c. p. 263. squ. et. 390. squ. (saepius esse necessariam, praefertim in plethoricis.)

Tralles (Balth. Lud.) de vena jugulari saepius secanda. Lipsiae 1735. p. 181. (venae jugularis sectionem epilepticis proficuum esse.)

Valleriola (Franc.) Observation. medicinal. L. VI. Lugdun. Batav. 1581. 8. L. III. obs. 7.

Zacut. Lusitan. Prax. admir. Lib. I. obs. 21. 29. 30. et 32.

Veratrum album. (Radix.)

Celsus (Aur. Corn.) L. III. cap. 23. edit. Amelov. p. 172. (commendat emesin per veratrum album.)

Greding (J. E.) vermischte medic. und chirurg. Schriften. Altenburg 1781. p. 30. squ. (in epilepsia ambiguo cum successu adhibuit hocce remedium. Usus fuit cortice radicum verno tempore collectarum, rejecta parte interna lignosa. Initium fecit exigua cum dosi [unius grani cum saccharo] intra nycthemerum data sensim augendo e. m. Extractum Stoerkiana arte paratum quibusdam quoque est datum, cui autem pulverem praefert.)

Greding (J. E.) sämmtl. Schrift. Th. I. n. 6. (exiguam efficaciam ei tribuit.)

Hippocrates *περὶ ἑλλεβορισμοῦ*, in Oper. ed. Linden. T. I. p. 610.

Mayerne (Th. de) Praxis medic. Lib. I. cap. 3. p. 15. (pulveris radicis gr. iij. robustis epilepticis optimo cum successu exhibuit, qua dosi vomitum et alvi purgationes excitavit)

Plinii Histor. natur. L. XXV. (cum lacte aut dulci quodam propinatam commendat.)

Schulzii (Jo. Henr.) D. de Helleborismis veterum. Halae 1717. (de ejus apud veteres usu in morbo comitiali tractat.)

Smyth, in Medical Communications. Vol. I. p. 207. (epilepsiae Tincturae Veratri ope quidem mitigatae, per tempus autem redeuntis exemplum.)

Starke (J. C.) Auszüge aus d. Tageb. d. klin. Instit. zu Jena. Jena 1789. p. 176. (cum fructu dedit.)

Themison, v. Cael. Aurelian. tardar. pass. L. II. cap. 4. (epilepticos helleboro purgavit.)

Vera-

Veratrum Sabadilla. (Semen.)

Loeffler's Beiträge zur Arzn. und Wundarzneiwiss. Th. II. p. 616.
(laudat.)

Schmucker (J. L.) vermisch. Schrift. Th. III. p. 1 — 45. obs. 1 -- 6.
(laudat, praesertim in epil. verminosa. Propinavit Pulv. Sem. Sa-
badill. Elaeosacch. foenic. aa ʒ ʒ. aut ʒ ʒ. cum melle in forma
boli omni mane. Haecce dosis superbib. pot. theiform. fl. Cha-
mom. vomitum alvique dejectiones excitavit. Post quadriduum
mane et vespere dedit gr. xv. cum melle ad boli consistentiam.)

Seeliger, in Schmucker. l. c. p. 38. squ. obs. 12. 13. (adultis
ʒj — ʒj. cum melle in forma boli omni mane. Continuetur usus
per XIV. dies, interpolato quolibet quinto die laxante rhabar-
barino.)

Verbena officinalis. (Herba.)

Act. Erud. Lips. Ann. 1699. Septemb. p. 284.

Albert. Magn. de virtut. herbar.

Mizaldi (Ant.) Memorabil. Cent. IV. aph. 26.

Riedlin (Vit.) Lin. medic. Ann. IV. August. obs. 10.

Sebitz (Melch.) Manuale s. speculum medic. pract. p. 278. (Sole
in arietis signo habitante, collecta.)

Radix (qua Amuletum, v. Amuleta).

Rosenstein (N.) v. d. Kinderkrankh. p. 62. (ejus mentionem fecit.)

Vesicatoria.

Aretaei diuturn. curat. Lib. I. cap. 4. (vesicatorii usum in epilepsia
tentavit.)

Beaumes l. c. p. 351.

E. N. C. Cent. I. et II. obs. 80. (parti, unde aura, applicanda.)

— — Dec. I. Ann. IX. X. obs. 14.

Gruebel (Jo. Georg.), in E. N. C. Dec. III. Ann. I. obs. 72. (effi-
caciae exemplum.)

Mead (Rich.) de imperio solis et lunae. C. II. pag. 8. (capiti appli-
canda.)

Panaroli l. c. Pentecost. IV. obs. 30. (cum fructu futurae coronali
imposita.)

Percival Essays. Vol. I. p. 183. (laudat in idiopathica.)

Quarin (Jof) Animadvers. p. 21. (saepius incantam in epil. pedi-
symptomata tentata vidit.)

Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. B. II. p. 125.

Septalii (Ludov.) Animadv. et caut. med. L. VI. p. 55. (capiti ap-
plicata commendat.)

Serrao (Franc.), in Morgagni epist. anat. med. Lib. N. n. 8. (capiti
imposita laudat.)

Tiffot l. c. p. 243. et p. 385. sequ. (ulterius de eorum in epilepsia
usu tractat.)

Wepfer de Cicuta aquatica. p. 97. (epilepsiam a dorso pedis orien-
tem vesicatorio in huncce locum affectum posito sanavit.)

Viennensis, Pulvis antepilepticus niger.

Pharmacopoea Wirtemberg. 1741. p. 261.

(℞. Rad. Paeon. ʒx. Dictamn. alb. Visc. quern. aa ʒv. Lign.
Aloes. Sem. Paeon. aa ʒiij. Corall. rubr. ppt. Matr. perlar.
aa ʒ℥. Ungul. Ale. ʒiij. Succin. alb. ppt. Unicorn. marin.
aa ʒij. Carbon. Tiliae ʒ℥. F. pulv. subtiliss. add. Folior. Aur.
n. xx. Dos. in tenellis gr. v — ʒ℥. in adultioribus ʒ℥.)

Vinum antepilepticum Michaelis, v. Michael.

— — — purgans *Waldschmidtii, v. Waldschmidt.*

Vinum buglossatum, v. Anchusa officinalis.

— — *Rhenanum (externe).*

Rosenstein (N.) von d. Kinderkrchten. p. 61. (infantes epilepticos
panno, hocce vino calido humectato, involvendo esse.)

Viola odorata. (Flores.) (id quod purpurei coloris est in flore.)

Dioscorides. L. IV. cap. 105. et 122. (pueris comitialibus com-
mendat.)

Mediolano (Jo. de) Schola Salernitana. edit. Ratisbon. 1722. 12.
p. 292.

Plinii Histor. natur. Lib. XXI. cap. 19.

Viola tricolor. (Herba.)

Haase (Aug.) D. de Viola tricolore. Erlang. 1782. cap. 15. (epi-
lepsia infantis septem mensium ejus ope profligata. v. Samml. f.
pract. Aerzte. B. VIII. St. 2. p. 329.)

Mat-

Matthioli (Jo.) Comment. in Dioscorid. p. 822.

Theodori Kräuterbuch. Th. II. p. 691. (vires antepilepticas ei tribuit.)

Vipera.

Caro.

Galen. de locis affect. Lib. II.

— — de simpl. medicam. facultat. L. II. (epilepticis proficuum esse.)

Ossa, v. Amuletum.

Virgatio.

E. N. C. Dec. III. Ann. VII. et VIII. obs. 187.

Viscum album (inprimis quernum). (Lignum.)

Andrée (John) Cases of Epilepsy. p. 261. (semel tantum ei satis fecit.)

Baier (Jo. Jac.) D. de Visco. Altorf. 1706.

Bergii (P. J.) Mater. medic. e regno vegetabili. T. I. p. 789. (dubium esse.)

Borelli (Jo.) Observat. medic. Cent. II. obs. 96. (efficaciae exemplum.)

Boyle (Rob.) Usefulness of experim. philos. p. 174. (epilepsia haereditaria pulveris ʒj. omni mane prope plenilunium cum aqua cerasorum sumpta sanata.)

Buchwald (Balth. Jo. de), resp. Mackerang, D. s. analysin Visci ejusque in diversis morbis usum. Hafniae 1753.

Cartheuser (Jo. Fr.) Fundam. mater. med. T. II. Francof. ad Viadr. 1767. p. 528. (laudat.)

Colbatch (Jo.) Dissertation concerning Mistleto a most wonderful specifick remedy for the Cure of convulsive distempers. Edit. 3. London 1723. Joh. Colbatch's Abhandl. v. d. Mistel und dessen Kraft wider die Epilepsie; a. d. Engl. mit Anm. u. Zusätzen eines teutsch. Arztes. Altenburg 1776. 8. (Prae reliquis maxime hocce remedium celebravit Cl. Colbatch. Dedit vel solum in pulvere sive bolo cum Syrupo Paeoniae ad ʒʒ. supraque sive qua infusum vel Asa foetida sive alio medicamine mixtum. Ipse tamen statuit, in epilepsiis magis inveteratis vel quando causa quaedam

- pertinax remotior alicubi haerens ad morbum vellicat, nonnisi levamen asferre.)
- Cole (Guil.) Consil. aetiolog. de casu quodam epileptico. London. 1702. 8. (Viscum commendat.)
- Cullen (Will.) Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. p. 183. (nunquam ejus efficaciam expertus in magna tamen dosi aliquid praestare statuit.)
- E. N. C. Cent. VI. obs. 58. (efficaciae exemplum.)
- Eraſti (Thom.) Disputat. IV. p. 140.
- Gordon Liliū medicinae. Venet. 1496. fol. 119. b.
- Haen (Ant. de) Rat. medend. P. V. Cap. IV. §. 2. (Valerianae et Paeoniae aequiparat.)
- Hannes (C. R.) de puero epileptico etc. p. 39. (Agyrtam quandam Erfordiensē arcani instar cum felici successu viscum exhibuisse.)
- Hartmann (Jo.) Prax. chymiatr. p. 20. (corylinum praecipue commendat.)
- Jacobi, v. Vogel medic. Bibl. B. I. p. 363.
- Koelderer (Jo. Georg.) D. de Visco. Argent. 1747. p. 23.
- Kovacs Tatai l. c. p. 123. sq.
- Lemnius (Lev.) de mirac. occult. natur. p. 148. (laudat.)
- Lewis (Will.) experiment. history of mater. medic. p. 574. (virtutes ejus negat.)
- Linden (Ditr. Wessel) vier chemische Abhandl. N. III. von d. besondr. Kraft der Mistel gegen Epilepsie; von d. Verfasser a. d. Englisch. übers. und erläutert. Amsterdam u. Leipzig 1771. 8.
- Löfke (Fr.) Abhandl. von auserles. Arzneim. Vierte Aufl. p. 400. (pulveris ʒß. omni trihorio data, juncto decocto ejus pro potu ordinario, duos epilepticos sanavit.)
- Maurer (Fr. Gu.) l. c. p. 29. (non plane esse rejiciendum.)
- Moor (Barth. de) Pathol. cerebr. p. 74. (exiguam ei tribuit efficaciam.)
- Paracelsus (Theophr.) de caduco. p. 602. (Astro ascendente esse propinandum. Ob hujus regulae neglectum tam saepe nil juvare.)
- Pfündel (Chr. Fr.) D. de spasms tonicis visco persanatis. Jenae 1783. Pfün-

Pfündel (Chr. Fr.), in C. W. Hufeland Journal. B. II. St. 2. p. 256. et 281. (cum fructu in connubio Valerianae adhibitum.)

Plinii Histor. natur. L. XVI. cap. 45. et L. XXIV. cap. 4.

Quarin (Jof.) Animadvers. p. 22.

Swieten (Ger. v.) Commentar. §. 1084. (laudat.)

Tiffot l. c. p. 301. (etsi non magnam, tamen quamdam, ei tribuit efficaciam in mucilagine et tonico principio quaerendam et decoctum ejus Valerianae propinatae superaddit.)

Tode (Jo. Cl.) D. s. praestantissimam rationem illustrandi materiam medicam. Havniae 1778. (absque successu datum esse.)

Vogel Histor. mater. medic. Ed. secund. p. 279.

Vitrioli Acidum. (cfr. Halleri Elixir acidum. Hartmanni Spirit. antepil. Vitriol.)

Quercetani (Jof.) Tetras. p. 360. (in acido Vitrioli esse vim magneticam, per quam epilepsiam sanat.)

Naphta Vitrioli.

Friborg, in Tode medicin. Bibl. B. I. p. 117.

Oleum Vitrioli dulce.

Panaroli (Dominic.) Jatrologism. Pentecost. II.

Spiritus Vitrioli.

Agricola (Jo.) Comment. in Poppium de Vitriolo. p. 386.

Cnofell, v. Tiffot l. c. p. 361.

Heers (Henr. ab) Observat. medic. obs. 18.

Paracelsus (Theophr.) de morbis ament. L. II. p. 499.

Rosenberg (Jo. Car.) Rosa nobilis iatrica. Argentor. 1624. 12. cap. 30.

Ruland (Mart.) Curat. empiric. Cent. VI. obs. 96.

Sala (Angel.), v. Tiffot l. c. p. 361.

Spiritus Vitrioli antepilept. Brandenburg.

Spina (Dav. de) l. c. p. 896.

(R. Vitriol. hungar. ad albed. calcin. et pulv. ℥ iiij. Limat. Cran. human. violent. mort. peremt. Rasur. Ungul. Alc. Corn. Alc. Cerv. cum cran. Corall. rubr. ppt. Visc. quern. Sem. Paeon. aa ʒ ij. M. ac retort. inde affund. Spirit. Vin. rect. qu. f. ℥ iiij. -- iv. tum

tum igne aperto aut balnei ficci, quod tutius gradatim adhibito ac successive aucto ad candescentiam usque retortae omnimodam spiritus omnes elice. Spiritum egressum ex arena rectific. eique adde Sal. Paeon. Rutae, Succin. volat. āā ʒj. Digere per mensem et circulant. donec exacte uniantur vi.)

Vitriolum album.

Johnson, in Medic. and Philos. Comment. of Edinburgh. Vol. V. p. 311. (granis v. pedetentim xij. bis de die exhibitis absque molestia superasse epilepsiam, jam per tres annos singulis quatuordecim diebus infestantem et efficacissimis remediis resistentem. Diutius autem esse continuandum.)

Lettson, in Memoirs of the Medical Society of London, instituted in the Year 1773. Vol. III. London 1792. n. 18. (ejus ope in connubio Corticis peruviani et Limaturae martis epilepsiam fassinasse.)

Pearson, v. Samml. auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIII. p. 574. (praecipitatum ex eo florum Zinci loco commendat.)

Vitriolum caeruleum.

Cullen (Will.) Treatise of mater. medic. Vol. II. p. 24. (a quarta grani parte usque ad gr. j. bis de die sensim augendo dosin, ita ut nauseam moveat: propinandum et diutius continuandum.)

Heers (Henr. ab) Observat. rarior. obs. 18.

Heredia (Petr. Mich. ab) Illustrat. et observat. medic. obs. 14.

Schulze (J. H.) Theses de mater. medica. Halae 1736. 8. p. 33. (gr. j — ij. in aqua solut. in infantum epilepsia commendat.)

Cuprum ammoniacum. (f. Crystalli Cupri, f. Sal antepil. Weismanni.)

Beaumes, in Journ. de Medec. et Chirurg. T. LXX. 1787. Februar. p. 273. (efficaciae exemplum.)

Bland (Thom.), in Duncan Medical Comment. T. VII. p. 300.

Causland, in Duncan Medical Comment. T. VIII. p. 213. (efficacem esse medicinam, nausea autem et vomitu, quos ciet, aegris magnopere molestam.)

Chandelier, in Journal de Medecine. T. XI. p. 45. (in quatuor epilepticis inane fuisse.)

Cul-

Cullen (W.) Treatise of Mater. medic. Vol. II. p. 25. (Si per mensem contiguum non juvet, abstinendum esse ab ejus usu, ob timendam venenatam cupri qualitatem.)

Duncan (Andr. Krankengeschichten nebst einigen Bemerkungen; a. d. Engl. Leipzig 1779. 8. p. 1 et 12. Anmerkung. p. 200. squ. (cum fructu in epil. adhibuit.)

Feurstein (J. H. Diff. cit. p. 72. not. I. (hujus remedii efficaciam e vi emetica, irritante et derivante declarare studet.)

Gmelin (Jo. Fr.) Appar. medicam. e regn. miner. T. I. p. 137. squ. (a quarta unius grani parte sensim ad gr. j — iij. ascendendo propinatur, donec aegrotus primos vomitus prodromos experiatur, sive aqua simplici solutum, sive cum quinque partibus micae panis et spiritu salis ammoniaci qu. f. in pillulas redactum [Pilulae caeruleae. v. Pharmac. Edinb. p. 118.]. Iis maxime convenit, qui debilitate, relaxatione et nimia irritabilitate laborant, non perinde plethoricis, nisi per evacuantia, vitae genus accommodatum et refrigerantia obstaculum istud sublatum sit.)

Maurer (F. G.) l. c. p. 21.

Michaelis Medicin. pract. Bibl. B. I. St. 3. p. 355. (e XIV. Epilepticis quatuor plenarie ejus ope sanavit morbumque in caeteris mitigavit.)

Pfündel (Chr. Fr.) über d. Gebrauch d. Kupfersalm. in der Epil., in C. W. Hufeland Journ. d. practisch. Arzn. B. II. St. 2. p. 271. (Puerum XII. annorum jam per triennium epilepticum ejus ope plenarie sanavit idemque remedium virgini epilepticae XXII. annorum cum levamine dedit.)

Reil (J. C.), resp. A. Neumann, D. de crisi bus genuinis morbis nervosis peculiaribus. Halae 1792. (Sanatio puellae epilepticae chloroticae ejus ope peracta.)

Thilenius Mediz. und chirurg. Bemerkungen. Frankfurt am Mayn 1789. p. 129. (epilepsiam absque manifesta causa saepius sustulisse neque unquam noxam peperisse.)

Walker, in Duncan Medical Commentar. for 1785. Vol. X. n. 5. (laudat.)

Weismann, in Nov. Act. Nat. Curios. T. I. Norimberg. 1757. 4. Arti-

Articul. 67. p. 276. (Inventor hujus remedii magnopere illud laudat, praecipue ad profligandam epilepsiam habitualem.)

Weizenbreyer (C. G.) D. de cupro medicato. Erford. 1783. p. 12. 13.

Whithers Bemerk. über die Fehler beim Gebrauche der Arzneimittel. p. 365. (laudat.)

Willan, in Medical Journal. London 1786. Vol. II. n. 13. (laudat.)
Helvetii Tinctura Veneris f. *antepilepticum puerorum*.

Boerhave (H.) Element. Chem. T. II. Proc. CLXXXIX. p. 263. (guttulas pauculas in hydromelle datas jejunis, levi motu, alvi subductione nauseaque inducta mire mutare pigros tenellos stomachos, hos excitare, aquam pituitamque educere, vermes necare, quibusque viribus quasdam quoque epilepsiae species sanare.)

Helvetius (Adr.) Traité des maladies les plus frequentes et des remedes specifiques pour les guerir. Paris 1704. 12. (ab inventore contra epilepsiam laudata haecce Tinctura amoene caerulea e Spirit. Sal. ammon. et Vitriol. caerul. c. duabus Salis ammon. partibus leni igne prius liquato et in pulverem contuso parata a gtt. iij — x. propinanda.)

Oleum e Sale Veneris.

Willis (Thom.) Patholog. cerebr. p. 187.

Stifferi Tinctura Cupri.

Stiffer (J. A.) Act. Laborat. chemic. in Acad. Julia edit. Specim. I. Helmstad. 1690. 4. C. 4. (Tinctura five viridis, five instillatis aliquot Spiritus Salis ammoniaci caustici guttulis caerulea e Spiritu Vini rectificato a sublimato cum sale communi sale ammoniaco per destillationem abstracto et vitriolo caeruleo contuso parata, metallici saporis, laudatur a gtt. ij — vij. cum Vino Malvatico.)

Vitrum Antimonii ceratum, v. Antimonium.

Vulturis Cor.

Macasii (Jo. Georg.) Promptuar. Mater. medic. p. 11. (laudatur in epilepsia.)

W. Wag-

W.

Wagleri (judicis Kunersdorffensis prope Annabergam)

Remedium antepilepticum.

Reichsanzeiger. 1796. August. p. 5705. (ad hujus remedii promulgationem provocatur.)

Waldschmidtii Tinctura antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 975.

(R. Tinct. Lunae 3℔. Succin. 3ij. M. f. Tinct. Dos. gtt. xv.)

Waldschmidtii Vinum antepilepticum purgans.

Spina (D. de) l. c. p. 1014.

(R. Rad. Paeon. 3ij. Herb. Primul. Veris. M. j. Flor. Paeon. Lil. convall. Tiliae P. iij. Rad. Helleb. nigr. 3j. Rad. Jalapp. 3℔. Cardamom. Cubeb. āā 3j℔. Sem. Paeon. 3j. Asperg. Spirit. epilept. inclus. nod. et immitt. in Vinum.)

Wallenstein (Lib. Bar. a) Pulvis antepilepticus.

Bierling (C. Th.) adversaria. p. 114.

Weikbardi Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 762.

(R. Rad. Paeon. decrefcente luna collect. 3j. Sem. Paeon. masc. excortic. 3℔. Ungul. Alc. 3ij. Succ. alb. C. C. ust. ppt. āā 3ij. Margar. ppt. Corall. rubr. ppt. āā 3j. Stercor. Pavon. 3iv. Lap. Bezoar. orient. 3j. Unicorn. ver. 3ij. Limat. Aur. Hungar. 3j. Croci. 3j. Man. Christ. perlat. 3℔. M. F. Pulv. subtiliss. addendo Ol. still. Macis. 3℔. Dos. 3℔. — 3℔.)

Weismanni Pulvis anodynus.

Hofmann (Fr.) Medicin. ration. system. T. IV. P. III. C. I. p. 21.

Weismanni Specificum antepilepticum, v. Vitriolum caeruleum.

Willichii Arcanum antepilepticum.

Willich. (Chr.), in Thom. Bartholini Epistol. medicinal. 1662. n. 69.

Wismuthum nativum.

Aqua Wismuthi.

Schroeder Pharmacop. universal. p. 913.

Magisterium.

Carminati Opusc. therapeutica. Ticini 1788. (dedit gr. j — ij. bis, ter, quaterve de die cum levamine aegri.)

Odier, in Journ. de Medecine. T. LXVIII. Juill. 1786. (nihil effecisse in epilepsia.)

Magisterium Anodyni.

X.

Xenocratis Medicamentum contra epilepsiam.

Alexand. Trallian. Lib. I.

Z.

Zincum.

Calx Zinci praecipitata.

Neumann (Casp.) Praelection. chemic. p. 1870. (laudat.)

Flores Zinci.

Ackermann, in annot. ad verf. germ. Tissot. l. c. p. 356. n. 76.

Armbrecht, in Müller et Reichard mediz. Wochenbl. Th. VIII. (eorum usu epilepsiam verminosam adjuncto decocto rad. Valerianae et flor. Arnicae profligavit.)

Arnaud, in Journal de Medecine. T. LXXV. Juill. 1788. (laudat.)

Beaumes l. c. p. 203. (laudat pluresque observationes citat.)

Beireis, v. Hurlebusch Diss. cit. p. 35. (laudat.)

Bell, in Medical Commentar. of Edinburgh. Vol. I. P. II. p. 126. (quotidie ad gr. xxxvi.)

Carminati (B.) Opuscul. therapeut. Vol. I. Paviae 1788. S. n. 2. (Nullum effectum ab eorum usu observasse.)

Crell, v. Hurlebusch Diss. cit. p. 37. et Martini Diss. cit. p. 50. (laudat.)

Cullen (W.) Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. p. 186. (nunquam eos efficaces expertum esse.)

Dehne (B.), v. Martini Diss. cit. p. 56 — 62. 64. (efficaciae documenta.)

Duroi

- Duroi (B.), v. Martini, Diff. cit. p. 76. (absque fructu exhibuit epileptico.)
- Feurstein (J. H.) Diff. cit. p. 74. (absque fructu exhibuit epileptico.)
- Fouquet, in Gardane Gazette de Santé. 1775. (efficaciae exemplum.)
- Gaubii (H. D.) Adversar. var. argum. Lugd. Batav. 1771. p. 113. sq. (ab empirico quodam Amstelodamensi [Ludemann] sub nomine Lunae fixatae cum fructu esse propinatos. Se ipsum quoque eorum efficaciam esse expertum.)
- Goodser, in Medical Comment. of Edinburgh. T. I. P. IV. (pro-
fuisse ei in epilepsia.)
- Haigarth, in Duncan medic. Comm. Vol. III. P. II. p. 187.
- Hart (Jacob) De Zinco ejusque florum usu medico observationibus confirmato. Lugdun. Batavor. 1772. (efficaciae documenta.)
- Hartmann (P. J.) D. sist. quaestiones medicas super florum Zinci usu interno. Francofurt. ad Viadr. 1778. (paroxysmos interdum eorum usu auctos esse.)
- Herz, v. Martini Diff. cit. p. 54. (in eclampsia infantum tantummodo intervalla prolongarunt et ipsos paroxysmos mitigarunt.)
- Hirschel (L. E.) medicin. Nebenstunden. p. 161. (laudat.)
- Hurlebusch (G. L.) D. Zincum medicum inquirens. Helmstad. 1776.
- Kaempfer (Jo.) Encirjd. medic. p. 30. (laudat.)
- Lichtenstein, v. Martini Diff. cit. p. 51. (efficaciae exemplum.)
- Löffler's Beiträge z. Arzn. und Wundarzn. Th. II. (eorum efficaciam affirmat.)
- Martini D. de Zinco medico recent. observat. Helmstad. 1780. (varia efficaciae documenta habet.)
- Meglin, in Journal de Medecine. T. LXIX. Decembr. à Paris 1786. (nullum fructum ab iis in epil. adhibitis observasse.)
- Metzger Adversar. medic. P. II. p. 98. (efficaciae exemplum.)
- Mleza (Theoph. de) Compend. medic. pract. Fascic. V. Havniae 1781. p. 7. (interdum efficaces, saepius tamen plane inertes fuisse.)
- Mönch systemat. Lehre von d. Arzneimitt. Marburg 1789. p. 277. (in epil. a vermibus eorum efficaciam expertum esse.)

- Muzel, v. Hirschel. *medizin. Nebenst.* p. 190. (jam ante quinquaginta et plures annos speciei nomine a multis contra epilepsiam adhibitos esse testatur.)
- Odier, in *Duncan Medical Comment.* Vol. III. (Interdum bono successu, saepius tamen incassum tentavit.)
- Parmentier, in *de Garaye Chymie hydraulique pour extraire les sels essentiels des vegetaux.* à Paris 1775. (efficaciam affirmat.)
- Percival, in *Duncan Medical Commentar.* Vol. II. P. II. p. 257. (quotidie ter gr.v. cum fructu dedit.)
- Ponche, in *Journal de Medecine.* T. LX. p. 311.
- Pott, v. Hurlebusch. *Diff. cit.* p. 40. (efficaciae exemplum.)
- Rahlwes, v. Martini *Diff. cit.* p. 76. (nunquam aliquid ei praestitisse.)
- Ranoe, in *Act. Societ. medic. Havn.* T. I. p. 451. (efficaciam exemplo affirmat.)
- Reimarus, v. Martini *Diff. cit.* p. 68. (efficac. exemplo affirm.)
- Richter (A. G.) *Medizin. chirurg. Bemerk.* B. I. Göttingen 1793. p. 140. (efficaciae eorum exempla habet.)
- Roboel, in *Handelingen van het Geneeskondige Genootschapp: Servandis civibus.* Deel II. 1776. (infantem a tinea capitis retrogressa epilepticum eorum ope sanasse.)
- Roche (de la), in *Journal de Medecine.* T. LII. p. 518. 1779. Decembre. (rarius in epilepsia aliquid praestitisse.)
- Rush, in *Duncan Medical. Commentar.* Vol. III. P. I. p. 114. (laudat.)
- Starke *Einricht. d. klin. Instit. zu Jena.* Jena 1782. 4. (in epil. a terrore et mensibus suppressis optimo successu propinavit.)
- — — — — 1784. p. 13. (in epil. a vermibus.)
- — Auszüge a. d. *Tageb. d. klin. Instit. z. Jena.* 1789. p. 89. 178. (efficaciae exempla.)
- Stoerk *Mediz. pract. Unterricht für Feld- und Wundärzte.* Vol. I. p. 348. (laudat.)
- Veckofkrift för Läkare och Naturforskare. Vol. V. Stockholm 1784. (laudat.)

Tinctura Zinci.

Dehne, v. Martini Dill. cit. p. 11. (juveni epileptico eam una cum floribus optimo successu exhibuisse.)

Zwölferi Aqua antepileptica.

Spina (Dav. de) l. c. p. 28. (infantibus epilepsia vexatis convenire a ʒj—ij. in grato aliquo vehiculo.)

— — — *antepileptica.*

Schroeder Pharmacop. universal. p. 138.

— — — — — *ex avibus destillata.*

Schroeder l. c. p. 139.

— — *Electuarium anacardinum.*

Spina l. c. p. 291. (Epilepticiis ʒij—ʒ℞.)

— — *Extractum antepilepticum.*

Spina l. c. p. 491.

(℞. Rad. Paeon. debit. tempor. collect. Doronici veri āā ʒij. Ze. doariae ʒj. Lign. Visc. quern. ʒj℞. Aloes ponderos. Rhodii, Santal. citrin. āā ʒj. Croc. austriac. ʒ℞. Flor. Paralyf. Paeon. Tiliae āā ʒvj. Sem. Paeon. ʒj. Bardan. major. ʒ℞ Citri ʒvj. Succin. alb. ʒj. Cort. Aurant. extim. Rasur. Ungul. Alc. āā ʒ℞. Cran. human. ʒj. Incisa crassiuscule et contusa immittantur cucurbitae vitreae, super quae fundatur Spirit. Vin. rectific. ℞. ut species saltem parum humectent; facta autem maceratione per diem unum alterumque destillantur in Balneo ʒijj. circiter spiritus fragrantis, quo interim curiose asservato in vitro satis clauso, fiat specierum residuarum cum f. q. Spiritus Vini rectificati extractio, et quidem repetitis vicibus ad virtutum earum plenariam extractionem; Colaturae seu Spiritus omnes tincti et filtrati in M. B. abstrahantur ad remanentiam circiter ℞j. vel ʒx. Hic liquor, cui paucillum resinae inhaerebit, coletur per linteum. Resina in colatorio residua leni calore nonnihil exsicceetur, qua interim servata, liquor colatus in diplomate seu vase duplicato ad consistentiam spissam Extracti evaporet, cui Extracto tandem jungatur sua Resina, cum superiori primitus destil-

deffillato et affervato Spiritu soluta, additisque porro subsequen-
 tib; utpote Ol. Nuc. Mosch. express. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$. Ol. stillat.
 Cinnam. Lign. Rhodii $\mathfrak{aa}\mathfrak{j}$. Lavendul. Coriandr. Succin. $\mathfrak{aa}\mathfrak{ss}$.
 prius cum Pulv. Sacchar. albiss. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$. in Elacosaccharum con-
 verforum; item: Magist. solub. Matris Perlar. c. Spirit. Vene-
 ris parat. \mathfrak{ij} . Magister. solub. Lapid. Carphon. itid. cum Spirit.
 Vener. parat. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. Fiat Extractum justae consistentiae. Dos.
 $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — \mathfrak{ss} .

Zwölferi Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 763.

(R. Pulv. ex typhis Cervi $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Unicorn. veri marin. Cran. homin.
 suspens. raspat Bezoar. occident. Lapid. sublan. Carphon. supra
 eorum oculos reperiendorum $\mathfrak{aa}\mathfrak{ij}$. Vermiculor. in spongiis Cy-
 nostat. inventor. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Ol. still. Cinnam. \mathfrak{j} . Caryophyll. \mathfrak{ss} .
 Magister. solub. Matr. perlar. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. F. Pulv. subtil. Dos.
 $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — \mathfrak{ss} .)

Sub Pulveris antepilept. Zwölferi titulo alteram adhuc in eadem pa-
 gina tradit formulam:

R. Nucl. Cerasor. nigror. \mathfrak{ss} . Sem. Paeon. excort. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. Citr. ex-
 cortic. Bardan. $\mathfrak{aa}\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$. Contundantur subtilissime in morta-
 rio, addita semper particula Aquae flor. Aurant. ad pultis for-
 mam, ut per setaceum transmitti possint: Cui adde parum antea
 conquassata sequentia: Nempe Rad. Paeon. debite collect. Do-
 ronic. ver. $\mathfrak{aa}\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. Visc. quern. Nuc. Moschat. Cardamom. mi-
 nor. Croc. austriac. $\mathfrak{aa}\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. Succin. alb. ppt. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. Magist. so-
 lub. Corall. rubr. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. Cranii human. raspat. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. Ol. stillat.
 Cinnam. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. Lign. Rhodii $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. F. Pulv. subt. Dos. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.)

Zwölferi Pulvis antepilepticus aureus s. solaris.

Spina (D. de) l. c. p. 764.

(R. Croc. Auri cum Tinctura Antimonii fermentat. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. Unicorn.
 fossil. alb. Unicorn. marin. $\mathfrak{aa}\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Cran. homin. strangulat. ra-
 spat. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. Pulv. ex typhis vel saltem ex junioribus lanuginosis
 et mollibus adhuc Cervorum cornubus n. m. parat. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Ma-
 gister.

giler. solub. Matr. petlar. Corall. rubr. aa 3jß. Nuc. Moschat.
3ß. Ol. stillat. Cinnam. 9j. vel 3ß. F. Pulv. subtil. Dos.
9j — 3ij.)

Zwölferi Pulvis antepilepticus Cervinus.

Spina (Dav. de) l. c. p. 761.

(R. Flor. Tiliae recent. 3ij. Rad. Paeon. recent. dec. r. coll. 3ij.
Semin. ejusd. excortic. 3j. Incisa et contusa coquantur in
aquae simplicis f. q. repetitis vicibus assusae et expressae, quo-
usque tota virtus proleatata sit: Decoctiones expressae junctim
optime clarificentur et ad 3vj. circiter evaporentur. Cui re-
dicto decocto sive extracto liquido cucurbitae vitreae immisso,
adde Pulv. cervini simpl. ex typhis parati 4ß. Margarit. Orien-
tal. ppt. sive earundem solutionis menstruo Zwölfero proprio
paratae 3j. Corall. rubr. ppt. f. eorundem solutionis indicato
modo menstruo paratae 3ß. Lenta destillatione per Balneum
Mariae iterum totaliter exsiccentur, ut in Alcohol redigi que-
ant, cui pro aromatificatione addatur Elaeosacchar. Cinnamom.
3jß. Olei Coriandr. destill. 3j. M. F. Pulv. Dos. 9j — ij.)

Zwölferi Species antepilepticae.

Spina (D. de) l. c. p. 849.

(R. Sem. Paeon. excorticat. 3ß. Bardan. 3ij. Contendantur mi-
nutissime in mortario, ad pultis formam, addita f. q. aquae flo-
rum et radicum Paeoniae sine addit. stillatae ac per cribrum co-
gantur. Huic pulpa adde Bezoard. cervin. simpl. 3ß. Rad.
Paeon. debit. tempor. collect. Doronic. veri, Nucum Moscha-
tar. aa 3ij. Cranii humani subtiliter raspati, Succin. alb. prae-
par. aa 3ij. Margarit. praep. 3jß. Visc. quern. Cardamom.
aa 3ij. Quae omnia leni in calore exsiccentur et in pulverem
tandem subtilem redigantur. Dos. 9j — 3ß.

p. 50. Aliam priori haud absimilem tradit formulam:

R. Bezoard. cervin. simpl. seu Pulv. ex typhis Cervi 3vj. Cran.
human. subtiliter raspati 3ß. Rasur. Ungul. Alcis. 3ij. Rad.
Paeon.

Paeon. mar. debit. tempor. collect. Doronic. veri aa $\frac{3}{4}$ ℔. Sem.
Paeoniae excorticat. Bardan. Nuc. Moschat. aa 3 ij. Magister.
solub. Margarit. oriental. Corall. rubr. aa 3 j. M. F. Pulv. sub-
til. Dos. ʒj — 3j.)

Zwölferi Syrupus de Paeonia.

Spina (Dav. de) l. c. p. 934. (epilepticiis $\frac{3}{4}$ ℔ — j. pro dosi.)

P A R S IV.
B I B L I O G R A P H I C A

SISTENS
SERIEM CHRONOLOGICAM SCRIPTORUM DE EPI-
LEPSIA SEORSIM TRACTANTIUM.

Scripta incertī anni.

- I**gnoti auctoris, Hippocrati olim addictus Liber *περὶ ἐπιπλῆς νοῦσου*.
v. Haller. Bibl. pract. T. I. p. 69. extat in omnib. Hippocrat. ope-
rum editionibus.
- Pofidonii Fragmentum de morbo comitiali. v. Aetii L. II. cap. 20.
- Theodorus de morbo comitiali citatur a Tralliano. v. Haller. Bibl.
pract. p. 183.
- Didymi Fragmentum: Quae collabentes comitiales excitant. v. Aetii
Tetr. II. Serm. II. cap. 15.
- Pelops (Galenī Praeceptor) jam de epilepsia cum egisse testatur Galen.
de loc. affect. L. III. v. Haller. Bibl. pract. T. I. p. 219.
- Galenī Documentum de puero epileptico. Extat in omnibus Galenī ope-
rum editionibus, e. g. in Charterianae T. X. Seorsim cum nonnullis
aliis Galenī libris prodiit Basil. 1531. v. Haller. Bibl. pract. T. I.
p. 262.

* * *

1544. Thiebault (Jean) Tresor des remedes préservatifs et curatifs de
la peste, des enfes de la goutte de l'epilepsie, de l'apoplexie, de la
pleuresie. à Paris.
1548. Roth D. de ortu et cura morbi comitalis. Lipsiae.
1561. Gabuccini Fanestrini (Hieron.) de comitali morbo. L. III.
Venetiis. 4.

1564. Paracelsi etliche Tractaten vom Podagra, Schlag und fallende Sucht. Cöln. 4.
- — — Philosophia ad Athenienses. Drei Bücher von Ursachen und Cur der Epilepsie. Cöln. 4.
1567. — — de Physiognomia morborum, therēbinthina et utroque helleboro, morbo caduco etc. Cöln. 4.
1568. — — Pyrophilia vexationumque liber. Accedunt contracturae origines et causae. Quatuor morborum capitalium, scil. podagrae, epilepsiae, paralytis et hydropis, curae. Basileae. 4.
1570. Peuceri (Casp.) Tractatus de epilepsia, pleuritide, arthritide. Witteberg. 8.
1573. Huguet (J.) et Nicol. Marchant, Ergo epilepsia in omni aetate curabilis. Parisiis. 4.
1575. Georg. Phaedronis (alias Fedronis) von Rhodach (Rhodochaei) Eleenus s. perfecta epilepsiae curatio, tum aquilae coelestis s. hydrargyri praecipitatio. Basileae. 8.
- — Tenot. (Lazar.) et Philib. Gilles, Ergo epilepsiae febris superveniens curatio. Parisiis. 4.
1580. Liebault (J.) et Carn. Gerbault, Ergo ingeniosi et libidinosi epilepsiae obnoxii sunt. Parisiis. 4.
- — Val (Ant. du) et Pierr. de l'Ecluse, Ergo epilepsia sternutamento solvitur. Parisiis. 4.
1581. Fernelii (Joh.) Consilium pro epileptico. Francofurt. 8. extat quoque in Ej. Univers. Medicina. Lugdun. 1645. 8.
1584. Plateri (Felic.) et Baucynet D. de epilepsia. Basileae. 4.
- — Steinbach (Joh.) de epilepsia. Basileae. 4.
1586. Hafenreuter (Jo. Ludov.) Tract. de epilepsia. Argentorat. 4.
- — Planeri (Andr.) Tract. de epilepsia. Tubingae. 4.
1589. Tomaro (Jacob.) de epilepsiae curatione Libellus. Seville. 4.
1590. Fichard (Joh.) Consilium de morbo comitiali. Francofurti ad Moenum. 8.
1592. Nymman (Hieron.) de epilepsia. Witteberg. 4.
1596. Seidel (Jacob.), resp. M. D. Herlitz et C. Calende, Theses de epilepsia. Gryphiswaldiae. 4.

1598. Tacquet (Hieron.) et Bonavent. Hachette, Non ergo in epilepsia Θεῶν τ'. Parisiis. 4.
- * * *
1600. Schatonis (Andr.) Theses de vertigine, epilepsia etc. Witteberg. 4.
1601. Hofmann's (Pet.) Freysambüchlein, von der Praeservation und Curation des Freysams oder Epilepsie an kleinen Kindern. Coburg. 8.
1602. Möller (Sebast.) de epilepsia. Francof. ad Viadr. 4.
- Taxil (Jean.) Traité de l'épilepsie. Tournon. 8.
1603. Alfarii de Cruce (Vincent.) de epilepsia s. comitiali morbo praeflectionum Bononiensium L. III. Venetiis. 4.
- Nagel. (H.) D. de epilepsia. Basileae.
- Warenius (H.) D. de morbis, attonito et sacro. Rostochii. 4.
1604. Hoechstætter (Phil.) D. de epilepsia. Basileae. 4.
1605. Bazin (Sim.) et Char. Bouvard, Ergo epilepsia post vigesimum annum sanabilis. Parisiis.
1606. Siglicius (Joh.) περί διαγνώσεως καὶ προγνώσεως τῆς ἐπιληψίας. Lipsiae. 4.
1607. Oltermann D. de epilepsia. Rostochii. 4.
- Pijart (Pierr.) et Gabr. Breard, Ergo in epilepsia quid occultum. Parisiis. 4.
- Rumbaum (Georg.) Tr. de epilepsia. Sedani. 4.
1608. Spiess (Frid.) D. de epilepsia. Basileae. 4.
1609. Mock (Jacob.) Tr. de epilepsia. Friburgi. 4.
- Siegfried (Joh.) D. de epilepsia. Helmslad. 4.
1610. Arnisaei (Henning.) D. de apoplexia et epilepsia cognoscendis et curandis. Francofurt. ad Viadrum. 4.
- Bazin (Sim.) Non ergo a sola copia humorum epilepsia. Parisiis. 4.
- Helmbach (Jo. ab) D. de morbi sacri διαγνώσει et θεραπείᾳ. Basileae. 4.
- Loeppen (Joach.) D. de epilepsia. Gieslæ. 4.
- Rex s. Koenig (Dav.) D. de morbo sacro. Basil. 4.
- Victoria (Petr. Valent. de) de singulari curatione affectus epileptici in praegnante femina. Madriti. 8.
1611. Deckers D. de epilepsia adultorum. Lugdun. Batavor. 4.

1611. Halvegii (Nicol. Eslern.) D. de sacro morbo et igne. Basileae. 4.
 — Henault (Nicol.) et Guil. Desdames D. non ergo epilepsiae cranium humanum. Parisiis. 4.
 — Lucii (Jo. Jodoc.) D. de epilepsia. Heidelberg. 4.
 1613. Culigii (Christoph.) D. de epilepsia. Basileae. 4.
 — Eifenmenger (Jo. Christoph.) D. de epilepsia. Basileae. 4.
 — Petraei (Henr.) D. de epilepsia. Marburg. 4.
 1614. Opfopoei D. de epilepsia. Heidelberg. 4.
 — Otter (Frid.) D. de epilepsia. Basileae. 4.
 — Sennert (Dan.) de epilepsia. Witteberg. 4.
 1615. A Collection of english medicines experienced against the jaundice, dropfy, falling sickness and pestilence. London.
 — Beckh D. de epilepsia. Basileae. 4.
 — Guenault (Fr.) et Ludov. Robillat D. ergo epilepsiae aetatis mutatio. Parisiis. 4.
 1616. Gesner (Jerem.) D. de epilepsia. Basileae. 4.
 — Schroeteri (Phil. Jacob.) Syllabus disputationis medicae ex tortuosis, nodosis et rigidis epilepsiae fraxinis conglomeratae, et compactae. Jenae. 4.
 — Untzeri (Matth.) *ἱερονοσολογία* chymiatrica, i. e. epilepsiae accuratissima principia, descriptio et curatio. Halae. 4.
 1617. Alfarii a Cruce (Vincent.) de morbis capitis frequentioribus, quorum cognitio et curatio traduntur, de catarrho, phrenitide, lethargo et epilepsia, L. VIII. Romae. 4. (Venetiis. 1619.)
 — Carterii (Melch.) Exercitationes in epilepsiam. Tolosae. 12.
 — Joel (Fr.) D. sist. contemplationem dogmatico-hermeticam morbi sacri. Marburgi.
 — Ramfower D. *περὶ διαγνώσεως, προγνώσεως καὶ θεραπειᾶς τῆς ἐπιληψίας*. Basileae.
 — Streiter (Jo. Hulder.) D. de gravissimo cerebri affectu, epilepsia. Basileae. 4.
 1618. Schaller D. de epilepsia. Witteberg. 4.
 — Sennert (Dan.) D. de epilepsia. Viteberg. 4. (an idem cum praecedente?)
 1619. Schroeter D. *περὶ ἐπιληψίας*. Jenae. 4.

1619. Ziegler (Christoph.) D. de epilepsia. Basileae. 4.
 1620. Altorii D. de epilepsia. Erford. 4.
 1621. Heintze D. de epilepsia. Lipsiae. 4.
 — Wolf (Jo.) D. de epilepsia. Helmstad. 4.
 1622. Marles (Rich.) et Fr. Pijart, Ergo epilepsiae *πυρόρμα*. Parisiis.
 1625. Torraei (Georg. epileptica consideratio. Francof. ad Viadr. 4.
 1626. Mouram (Didacius) de passione hysterica sive de epilepsia hyste-
 rica. Ortholii. 4.
 1628. Vega (Petr. de) Gemmula de epilepsia. Extat c. Ejusd. Pace me-
 thodicorum cum Spagyricis. Genevae. 12.
 1629. Charles (Hugo) et Dyon. Bazin, Ergo epilepsia hydropi su-
 perveniens lethalis. Parisiis.
 — Rolfink (Werner.) D. de epilepsia. Jenae. 4.
 1630. Rhümelii (Jo. Conr.) D. de morbo sacro. Altorf. 4.
 — Rolfink (Werner.) D. de epilepsia. Jenae. 4.
 1631. Ponce de Santa Cruz (Anton.) Praelectiones Vallisfolctanae
 in Hippocratis L. de morbo sacro. Madriti. fol.
 1634. Bouche (Honorat) de morbo scelestio, in quo causa, signa et cu-
 ratio explanantur. Avenionae. 8.
 — Scharlach (Sam.) D. de epilepsia. Francofurt. ad Viadr. 4.
 — Serna (Joh. Gallego de la) (Malacitani) L. de calculi et epilepsiae
 in pueris praecautio et curatione. Extat quoque in Oper. omn. \
 Lugdun. fol.
 1636. Michaelis D. de epilepsia. Lipsiae. 4.
 — Schilling D. de morbo caduco s. epilepsia. Altorf.
 — Tinctorii D. de epilepsia. Regiomonti. 4.
 — Willich (Christ. Frid.) D. de epilepsia. Argentorat. 4.
 1637. Rolfinck (Wern.) D. de epilepsia. Jenae. 4.
 1640. Langlois (Flor.) et Euseb. Renaudot, Ergo epilepsiae et
 melancholiae haemorrhoides salutare. Parisiis. 4.
 — Mafius (Jo.) D. de morbo sacro s. epilepsia. Regiomont. 4.
 — Rolfink (Wern.) D. de epilepsia. Jenae. 4.
 1642. Conring (Herm.) D. de epilepsia. Helmstad. 4.
 — Slegel (J. M.), resp. G. Gartz, D. de epilepsia. Jenae. 4.
 1643. Beets (Henr. van der) D. de morbo comitiali. Lugdun. Batav. 4.
 1643.

1643. Guenault (Petr.) et J. Forestier, Ergo epilepsiae per consensum Aquae Borbonienses archimbaldicae. Parisiis. 4.
- Horst (Jo. Dan.) D. de epilepsia. Marburg. 4.
1644. Engelhard (Andr.) D. de epilepsia. Franecker. 4.
- Schellhammer (Christoph.), resp. Jo. Georg. Macasio, D. de epilepsia. Jenae. 4.
- Schoner (Joh.) de epilepsia. Gryphiswald. 4.
1645. Du Cledet, Ergo ab humore bilioso epilepsia. Parisiis. 4.
1646. Velden (Petr.) D. de epilepsia. Leidae. 4.
- Walaei (Jo.), resp. Jo. de Schafer, D. de epilepsia. Lugdun. Batav. 4.
1647. Langelott (Joel.) D. de epilepsia. Lugdun. Batav. 4.
1648. Sebitz (Melch.) D. de epilepsia. Argentorat. 4.
1650. Manet (Fr.) et J. Ant. Bourgaud, Ergo epilepsiae et melancholiae mutuae vires. Parisiis. 4.
- Schneider (C. V.), resp. Sam. Sturm, D. de epilepsia. Witteberg. 4.
1651. Eggebert (Jo.) D. de epilepsia. Leidae. 4.
- Lubini (J. E. F.) Bedenken von der Epilepsia, wie diese mit gebührlichen Mitteln möge curiret werden. Stralsund. 8.
1652. Rolfink (Werner.) D. de epilepsia. Jenae. 4.
- Thulemeier (Conr.) D. de epilepsia. Leidae. 4.
1653. Gilgii D. de epilepsia. Basileae. 4.
1656. Conring (Herm.), resp. Frisio, D. de epilepsia. Helmstad. 4.
1657. Fontani (Gabr.) Epitome Tractatus de febribus. Acced. Tetras gravissimorum capitis affectuum: vertiginis, epilepsiae, convulsionis et apoplexiae. Lion. 4.
- Hoefer (Wolfg.) Hercules medicus. Tom. I. Vindobonae. 4.
1658. Bindi (Jo. Bapt.) de nova epilepsiae differentia consultatio. Romae. 8.
- Brandes (Jo. Dietr.) D. de epilepsia. Ultraject. 4.
- Coeller (Henr.) Disquisitio, morbum sacrum veluti ignotum in republica medica humani corporis hospitem, vulgata medicorum de eodem dogmata refellendo ac veram essentiam et sedem declarando, introducens. Giesae. 4.
- Frieße (Mart. Frid.) D. de epilepsia. Lipsiae. 4.

1659. Andreae (Tob.) Casus epileptici. Duisburg. 4.
 — Moebii (Gethofr.), resp. Theod. Buffio, D. de epilepsia. Jenae. 4.
 1660. Tappe (J.) D. de epilepsia ejusque causis contra communem opinionem. Helmstad. 4.
 1662. Petit (Guil.) et Nicol. Rainssant, Ergo tantum ab habitu epilepsia. Parisiis. 4.
 1664. Moebii (Gethofr.), resp. Chilian, D. de epilepsia. Jenae. 4.
 — Schneider (Conr. Vict.), resp. J. Kockert, D. de morbo comitiali. Viteberg. 4.
 1666. Fleischhauer (Salom.) D. de epilepsia. Giesiae. 4.
 1667. Nettelblatt (Jo. Christ.) D. de epilepsia. Lipsiae. 4.
 — Schneider (Conr. Vict.) D. de epilepsia. Viteberg. 4.
 1669. Bultingk (Abrah.) D. de epilepsia. Leidae. 4.
 1670. Schneider (Conr. Vict.) D. de epilepsia. Viteberg. 4.
 — Tien (Petr. de) de epilepsia. Neomagi.
 — Wenesteel (Jo.) D. sist. casum epilepticum. Leidae. 4.
 — Hercules vere cognitus, certus exul; id est, Epilepsiae vera digno-
 tio et ejusdem certa curatio, libris duobus comprehensa, studio et
 opera Georgii Kovacs Tatai, N. M. K. Nobilis Ungari. Lug-
 dun. Batavor. 12.
 — Daalhemii (Dan.) D. de epilepsia. Ultraject. 4.
 1671. Teicher (Jo.) D. de epilepsia. Lugdun. Bat. 4.
 1672. Bauhin (Jo. Casp.) D. de epilepsia. Basileae. 4.
 — Biefter (Jo.) D. de epilepsia. Ultraject. 4.
 — Kanngieffer (Jo. Dietr.) D. de epilepsia. Lugd. Bat. 4.
 — Mangold (Jo. Georg.) D. de epilepsia. Basileae. 4.
 — Riccii D. de doctrina Galeno-chymica tam veterum quam neote-
 ricorum circa epilepsiam. Lugdun. Batav.
 1673. Wedel (Georg. Wolfg.), resp. Jac. Roefer, D. sist. aegrum epi-
 lepticum. Jenae. 4.
 1675. Hofmann (Jo. Maur.) D. de paroxysmis frequentioribus et vehe-
 mentioribus, scilicet febrilibus, asthmaticis, epilepticis, colicis et hy-
 stericis. Altorf.

1675. Schoenfeld (Phil. Jac.) Tractat von dem Kinderweh, Kraus und Hinfallen, nebst eilf Regeln an die Hebammen. Ingolstadt. 8.
1676. Craanen (Theod.), resp. B. Albino, D. de epilepsia. Lugdun. Batavor. 4.
- Ettmüller (Mich.), resp. Godofr. Weinlig, D. de epilepsia. Lipsiae. 4.
- Waldschmidt (Jo. Jac.) D. de epilepsia sive von der schweren Noth. Marburg. 4.
- Wedel (Georg. Wolfg.), resp. F. W. Gründel, D. de epilepsia. Jenae. 4.
1677. Tilemann (Ad.) dictus Schenk, de epilepsia hypochondriaca. Lugd. Batav. 4.
1678. Kronland (Joh. Marcus Marcia) Liturgia mentis sive disceptatio medico-philosophica de natura epilepsiae, ejusque ortu et causis. Ratisbonae. 4. acced. Tract. medicus de urinae natura et Consilia III. medica.
- Pechlin (o Nicol.) D. de epilepsia et contra eam remediis. Kiloniae. 4.
- Stiffer D. de epilepsia. Lugdun. Batav.
1679. Fasch (Aug. Henr.), resp. Jos. Fuhrmann, D. de epilepsia. Jenae. 4.
- Foster (Georg.) D. de epilepsia. Lugd. Batav. 4.
- Simon (Berthold.) D. de epilepsia. Lugd. Batav. 4.
1680. Ameltoncii von Forst D. de epilepsia puerorum. Leidae. 4.
- Arnold (Ernest.) D. de epilepsia. Erford. 4.
- Camerarii (El. Rud.) D. cur hodie epilepsia inter nos tam frequens sit. Tubingae. 4.
- Scheitsmeier (Petr.) D. de epilepsia. Ultraject. 4.
- Winneseil D. sist. casum epilepticum. Lugd. Batav. 4.
1681. Beddevole (Dominic.) D. de epilepsia. Basileae. 4.
1682. Peierlen (J. B.) D. de epilepsia puerorum. Lugd. Bat. 4.
1683. Engelen (Engelb. ab) D. de epilepsia. Ultraject. 4.
- Ettmüller (Mich.) D. de epilepsia. Lipsiae. 4.
- Herrmann (P.), resp. C. B. Behrens, D. de epilepsia. Lugdun. Batav. 4.

1684. Dietrich (Balthaf.) D. de epilepsia. Lugd. Batav. 4.
 — Jägerschmidt (J. V.) D. sist. infantem epilepticum. Altorf. 4.
 — Richter (Christoph.) D. de morbo caduco. Jenae. 4.
 1685. Munting (Albert.) D. de epilepsia. Utrecht. 4.
 — Schwartz (W. R.) D. de epilepsia. Lugd. Batav. 4.
 1686. Fasch (Aug. Henr.) D. de epilepsia. Jenae. 4.
 1687. Vesti (Just.) D. de epilepsia. Erford. 4.
 1688. Hartenfels (Georg. Chr. Petr. a) D. de morbo comitiali. Erford. 4.
 — Link D. sist. casum aegri epileptici. Altorf. 4.
 — Schmidt (Franc. Joach.) D. de epilepsia. Lugdun. Batav. 4.
 1689. Richard (Nicol.) et Phil. Caron, Ergo epilepsiae venarum jugularium sectio. Parisiis. 4.
 1690. Albin (Bernard.) D. de epilepsia. Francofurt. ad Viadr. 4.
 — Berger (Jo. Gottfr. de), resp. C. Etzler, D. de epilepsia. Viteberg. 4.
 — Camerarii (El. Rudolph.) D. sist. catalepsin epilepticam. Tubing. 4.
 — Tiesma D. de epilepsia. Lugd. Batav. 4.
 1691. Hartenfels (Georg. Chr. Petr. a) D. de morbo herculeo five epilepsia. Erford. 4.
 1692. Brisseau (Pierre) Traité des mouvemens sympathiques, avec explication des ceux, qui arrivent dans le vertige, l'épilepsie, l'affection hypochondriaque et la passion hysterique. à Montpellier. 12.
 — Fitzmann (Jo.) D. de epilepsia. Utrecht. 4.
 — Meyer (Marc. de) D. de epilepsia. Utrecht. 4. (an idem cum praecedente?)
 1693. Gaulken (Christ.) D. de morbo caduco, five der fallenden Sucht. Erford. 4.
 — Johnston (Jo.) D. de motibus convulsivis et epilepsia infantum. Lugd. Batav. 4.
 1695. Schaper (Jo. Ern.), resp. H. M. Bartholomaei, D. de epilepsia. Rostochii. 4.
 — Ejusd. Progr. (ad hanc dissert.) de epilepsia. ibid. 4.
 — Stern (H) D. sist. de epilepsia casum resolutum. Lugd. Batav. 4.
 1696. Slevogt (Jo. Hadrian.) D. de epilepsia infantili. Jenae. 4.
 1697. Faber (Jo.) D. de epilepsia. Marburg. 4.

1697. Satler (D. G.) D. de epilepsia. Traject. ad Rhenum. 4.
 — Schmidt (J.) D. de epilepsia adultorum et infantum insultis epilepticis. Lugdun. Batav. 4.
 1698. Eikmeyer D. de epilepsia uterina. Ultraject. 4.
 — Eyselii D. de epilepsia. Erford. 4.
 1699. Bruno (Jac. Pancrat.) D. de epilepsia puerili. Altorf. 4.
 * * *
 1700. Johrenii (Jo. Contr.) D. de epilepsia. Francofurt. ad Viadr. 4.
 1701. Hübner D. de epilepsia. Traject. ad Rhen. 4.
 — Winter D. de epilepsia. Rintelae. 4.
 1702. Cole (Guil.) Consilium actiologicum de casu quodam epileptico, quo respondetur Thomae Hobart. Londini. 8.
 — Vater (Christian.) D. de morbo fontico, olim sacro dicto. Viteberg. 4.
 1704. Freudenberg D. de maculis volaticis epilepsia comitatis. Giesae. 4.
 — Guillermet D. de epilepsia. Lugd. Batav. 4.
 — Moor (Barthol. de) Tract. de epilepsia et convulsionibus. Amstelod.
 1705. Erberfeld D. de epilepsia haereditaria casum exhibens. Duisburg. 4.
 1706. Hannemann D. de dolore capitis et epilepsia. Kiloniae. 4.
 — Lange (Christ. J.) D. de morbo caduco. Lipsiae. 4. recus. in Ej. Oper. omn. ed. Rivino. Lipsiae 1715. T. III. fol.
 — Woellner (Petr. Mich.) D. de epilepsia ejusque curatione medicamento specifico essentia dulcis nominato. Lugdun. Batav. 4.
 1707. Mercerii (J.) D. de epilepsia. Harderovici. 4.
 1708. Scheidt (Jo. Valent.) D. de epilepsia verminosa. Argentorati. 4.
 — Teucher (Sam.) D. de remediis antepilepticis aliis fossilibus. Lips. 4.
 — Wedel (Georg. Wolfg.), resp. J. H. Nasse, D. de epilepsia. Jenae. 4.
 1710. Henrici (H.), resp. J. J. Kolb, D. de epilepsia. Halae. 4.
 — Rivini (Aug. Quirin.) D. de remediis antepilepticis terreis. Lipsiae. 4.
 1711. Des D. J. F. Forlaffe unschätzbare Arznei wider die Epilepsie, von 31 Personen bewährt gefunden; von D. L. L. B.
 1712. Crause (Rud. Wilh.) D. de epilepsia. Jenae. 4.

1712. Crüger Epierifis de naevis maternis et de epilepsia. Zittaviae. 8.
 1713. Kornzweig D. de epilepsia ex terrore. Gissiae. 4.
 ——— Discursus de epilepsia, d. i. eine kurz zusammengefaßte, jedoch ausführliche, Beschreibung von der gröfsten Krankheit der Epilepsie; von J. J. A. (ppel) M. (ed.) L. (icent.) und P. (ract.) zu C. (ahla.) Altenburg. 1713. 40 S. in 8.
 1714. Zwinger (Theod.) D. de epilepsia. Basileae. 4.
 1718. Alberti (Mich.), resp. J. E. Stanl, D. de epilepsia. Halae. 4.
 1719. Wiele (van der) D. de epilepsia. Lugd. Batav. 4.
 ——— Wucherer, resp. Welfsch, D. de epilepsia. Jenae. 4.
 1720. Buchwald (de) D. de epilepsia. Havniae. 4.
 1722. Kriegel D. de epilepsia rotatoria. Lugd. Batav. 4.
 1723. Colbatch (J.) Dissertation concerning Mistleto, a most wonderful specifick remedy for the Cure of convulsive distempers. London. 8.
 1724. Boretius (Matth. Ern.), resp. J. G. Arnold, D. de epilepsia ex depressio cranio. Regiomonti. 4. recus in Alb. ab Haller. Collect. Disput. T. I. et in L. Crell's Auszüge. B. I. p. 78—87.
 ——— Frankenau (a) D. de morbo comitiali. Havniae. 4.
 1725. Cunningham (Alexand.) D. de epilepsia. Lugdun. Batav. 4.
 ——— Karcher D. de epilepsia. Argentorat. 4.
 ——— Vater (Abrah.) De specificorum antepilepticorum figillatim olei animalis virtutibus hujusque virtute et efficacia in curanda epilepsia rationibus et experimentis confirmata. Viteberg.
 1727. Fischer (Jo. Andr.) D. de convulsionibus epilepticis habitualibus ex terrore. Erford. 4.
 ——— Goelike (Andr. Ottom.) D. de epilepsiae consensualis singulari specie. Francof. ad Viadr. 4.
 ——— Vrye (Theod. van) D. de epilepsia idiopathica. Lugdun. Batav. 4.
 1730. Luther (C. F.), resp. D. H. Höflich, D. de epilepsia. Kiloniae. 4.
 ——— Stahl (J. J.) D. de morbo caduco. Erford. 4.
 1732. Hofmann (Fr.), resp. C. G. Büttner, D. de vera mali epileptici causa. Halae. 4.
 ——— Porcinus (J.) D. de epilepsia. Lugd. Batav. 4.
 ——— Schacher (Polye. Gottl.) D. de epilepsia simulata. Lipsiae. 4.

1734. Fries D. de morbo herculeo, vulgo epilepsia. Argentorat. 4.
 1736. Behling, praef. J. J. Jantke, D. de epilepsia. Altorf. 4.
 ——— Hovii D. de epilepsia. Lugdun. Batav. 4.
 ——— Schulze D. exhibens resolutionem casus hysterico - epileptici. Halae. 4.
 1738. Fabricius (P. C.) D. de epilepsia saltatoria. Giesiae. 4.
 1740. Meibom (Brandan.), resp. S. Buchholz, D. de epilepsia stomachica. Helmstad. 4.
 1741. Juch (H. M.), resp. J. G. Hannimann, D. sist. facillimam ac certissimam methodum curandi epilepsiam. Erford. 4. (pilulis balsamicis-Stahl.)
 ——— Junker (J.), resp. A. ab Heimbach, D. de nova methodo curandi epilepsiam sine specificis. Halae. 4.
 1742. Traité de l'épilepsie avec sa description, ses différences, ses causes etc. par M^r. Pierre Brescon. à Bourdeaux. 8.
 1747. Doederlein (C. Z.) D. de epilepsia autocratia naturae curata. Altorf. 4.
 ——— Graeff (J. P.) D. de motibus epileptico-convulsivis herniae incarceratae supervenientibus per venaesectionem sublatis. Altorf. 4.
 1748. Colbatch (Jo.) Abhandl. von dem Mistel und dessen Kraft wider die Epilepsie; a. d. Engl. Altenburg. 8.
 1752. Rügemer D. de epilepsia. Wirceburg. 4.
 ——— Wiert (Cornel. van) D. de epilepsia. Trajecti ad Rhenum. 4.
 1753. Pietseh (J. G.) Erklärte Ursachen und Cur der Fallsucht. Hamburg u. Leipzig. 8.
 ——— Watts D. de epilepsia. Lugdun. Batav. 4.
 1754. Falk (Joh. Gottfr.) D. de epilepsia seu convulsivis virginum motibus. Gottingae. 4.
 ——— Rosén (Nicol.), resp. Petr. Sundio, D. de epilepsia. Upsaliae. 4.
 1756. Samson (Petr.) D. de epilepsia et praecipuis ejusdem sic dictis specificis. Helmstad. 4.
 1757. Müller (Paul. Sam.) Convulsionum et epilepsiae infantum ex leviori dolore prodeuntium rationes medicae. Halae. 4.
 1759. Orlovius (Andr. Jo.), resp. Jo. Guil. Werner, D. sist. observationes circa nonnulla remedia antepileptica usitata. Regiomont. 4.
 1761.

1761. Arcelin (Petr.) Quaest. medic. an epilepsiae rara venaelectio? affirmat Lud. Gilb. Boyrot de Joncheres. Parisiis. 4.
1762. Locher (Maxim.) Observationes practicae circa luem veneream, epilepsiam et maniam. Vindobon. 8.
1763. Junker (Frid. Christ.), resp. Ein. Guil. Horn, D. sist. raram epilepsiae speciem. Halae. 4.
1764. Mangold Progr. de epilepsiae nonnullis speciebus. Erfordiae, recus. in Ej. Opusc. Tom. I. p. 49. Altenburg. 1767.
- Cases of the epilepsy, hyseric fits and St. Vits dance, by J. Andree. London. 8.
- Nunn (A.) D. de epilepsia uterina. Erford. 4.
- Retenbacher (J.) D. de epilepsia. Lugd. Batav. 4.
- Siegwart D. sist. exemplum epileptici verminosi non a vermibus epileptici. Tubingae. 4.
1765. Ahlefeld (J.), resp. Jo. Andr. Schreiber, D. de epilepsia febrium intermittentium comite. Giesae. 4.
- Traitement periodique de la Goute ou moyens d'adoucir les accès et guerison de l'épilepsie et des ecrouelles, par Mfr. Moncerbert. à Paris. 8.
- Westphal (Andr.), resp. Jo. Georg. A'kermann, D. de epilepsiae et motuum convulsivorum infantum praecipuis causis. Gryphiae. 4.
1766. Hannes (C. R.) de puero epileptico foliis aurantiorum recentibus curato. Lipsiae. 4. recus. in E. Sandifort. Thesaur. Dissertation. Vol. III. Lugd. Batav. 1778. p. 311.
- Kortum D. de epilepsia. Duisburg. 4.
- Pasquallati (Jos. Bened.) D. de epilepsia. Vindobon. 4.
1768. Boehmer (Ph. Ad.), resp. Jo. Ern. Stahl, D. de nonnullis momentis ad curationem epilepsiae spectantibus. Halae. 4.
- Delius (Henr. Frid.), resp. J. Ph. J. Rudolph, D. de uestione cranii in epilepsia. Erlangae. 4.
- Hirschel (Leon Elias) Gedanken die Heilart der fallenden Sucht betreffend, nebst einem Anhang von einigen gegen die Würmer dienlichen Mitteln. Berlin. 8. 2te Auflage. Berlin. 1770. 3te Auflage. Mictau. 1774.

1770. Dissertation sur les parties sensibles du corps animal, suivie d'une mémoiree sur les avantages, que procurent les frictions mercurielles dans le traitement de quelques epilepsies idiopathiques; par Mfr. E. J. P. Houffet. à Lausanne. 8.
- Gordack Geschichte der Krankheit und Cur eines 27 Jahre mit der Epilepsie geplagten Frauenzimmers. Königsberg. 8.
- Tiffot (S. A. D.) Traité de l'épilepsie. à Lausanne et Paris. 8. recuf. in Ej. Traité des Nerfs et leurs maladies. T. III. à Basle. 1779. Ackermanni Verf. german. T. III. Leipz. 1782. Sammtl. Schriften. Th. V.
1771. Baldinger (Ern. Gottfr.) D. de epilepsia ex tumore duræ matris scirrhuso et carie cranii. Jenæ. 1771. 4. recuf. in Waiz. Auszug. B. VI. n. 7.
- Loof (Jul. Aug.) Historia epilepsiae foliis aurantium sanatae. Groningæ.
- Rosen (Eberh.), resp. Paul. Bänge, D. de sanatione epilepsiae per imminutum vitium irritabilitatis nervorum. Londini Gothorum. 4.
- Tiffot (S. A. T.) Abhandl. von der Epilepsie; a. d. Franz. überf. v. Krünitz. Berlin. 8. Leipzig. 1773. 1778.
1772. Practical essays upon intermitting fevers, dry pty, diseases of the liver, the epilepsy, the colic, dysenterial fluxes etc. by Dan. Lysons. Bath. 8. german. verf. prodiit Lipsiæ. 1774. 8.
- Essay on epilepsy, in which a new theory of that disease is attempted, from which the proximate cause is investigated and indications brought from thence shewing clearly the consistency of the method of cure; by W. Threlful, M. D. London. 8.
1774. Leveling (Henr. Palmat.) D. de cranio militis quondam venerei postea epileptici tandem apoplectici defuncti. Ingolstadt. 4. cum Tab. aen.
1776. Gehler (Jo. Car.), resp. Jo. Gotth. Gutsch, D. de eclampsia parturientium gravi morbo quidem neque adeo funesto. Sectio prior pathologica. Lipsiæ. 4.
- Hofmann (Franc. Ant.) D. de epilepsia. Vindobonæ. 4.
1777. Gehler (Jo. Car.), resp. C. A. Gerischer, D. de eclampsia parturientium. Sectio posterior therapeutica. Lipsiæ. 4.

1780. Siegwart (J. A.), resp. J. A. Rueff, D. sist. casum puellae post-
menstruam suppressionem in epilepticae et postea, sub fluxu earum difficili,
hystericae; cum epierisi. Tubingae. 4.
- Tournay (J. A.), resp. J. F. Holandre, D. de epilepsia. Nan-
cayae. 4. epitom. in C. G. Gruner's neuest. kritisch. Nachr. v. klein.
mediz. Schrift. Th. I. Jenae. 1788. p. 18.
1781. Brown (Tipping.) D. de epilepsia. Edinburg. 4.
- Cappel (L.) D. de epilepsia ex tumore nervo vago inhaerente.
Helmstad. 4.
- Perfect (W.) Cases of insanity, epilepsy etc. London. 8.
- Turpin (Phil.) D. de epilepsia. Edinburg. 4. recus. in Car. Web-
ster System. medic. pract. T. II. p. 147.
1783. Melleret D. de epilepsia. Monspeliae. 4.
- Münch (J. H.) Observation. practicae circa usum Belladonnae in
melancholia, mania et epilepsia. Gottingae. 8.
1786. Brückmann (C. P.) Enarratio Choreae S. Viti et epilepsiae, quae
per fontes medicatas et thermas Embsenses curatae sunt. Francof. 8.
- Gay D. de epilepsia. Edinburg. 4. german. vers. in Heinr. Ta-
bor's Auszüge. a. d. besten engl. mediz. Streitschriften. B. I. Heidel-
berg. 1792.
1787. Millar (Franc. Xaver.) D. de medicamentis antepilepticis. Argen-
torati. 4.
- Röllmert (Car. Benj. Andr.), praef. P. J. Hartmann, D. sist. va-
rias epilepsiae medendi methodos. Francofurt. ad Viadr. 4.
1788. Henning (Frid.), praef. Car. Frid. Rehfeldt, D. sist. Ana-
lecta historica ad theoriam epilepsiae. Gryphiswaldiae. 4.
- Mithof (Hect. Burch.) D. de sede irritamenti in epilepsia, adspers-
is practicis analectis. Gotting. 4.
- Rehfeldt (Car. Frid.) Progr. (ad Diss. meam) morbi singularis
epileptico-cataleptici opio potissimum sanati historiam exhibens. Gry-
phiae. 4.
1791. Douglass (Adam.) D. de epilepsia. Edinburg.
1792. Feurstein (Jo. Henr.) D. de epilepsia. Gottingae. 4.
- Maurer (Fr. Guil.) Comm. de medicamentis antepilepticis. Mar-
burg. 8.

1793. Rumpelt (Car. Aug. Ferd.), praef. C. C. Krause, D. sist. pathologiam epilepsiae. Lipsiae. 4.
1795. Berger (Franc.) D. de remediis in epilepsia usitatis. Francofurt. ad Viadr. 8.
1796. Nürettein (François Tolyot de) Observations nouvelles sur la Surdit , la c cit , l' pilepsie, l'apoplexie. suivies d'un nouveau r gime propre   ces diff rentes maladies. Paris, l'An. III. de la r publique. 8. Verf. germanica jam promissa a libraria Raspiana (Norimbergenfi). v. Intell. Bl. d. Allg. Litt. Ztg. 1797. n. 79.
1797. De l' pilepsie en g n ral et particuli rement de celle, d termin e par des causes morales par J. L. Doullin - Dubreuil.   Paris. 8.

Additamentum.

Loco terminorum, in Append. I. p. 72—91. saepius occurrentium „*epileptico-furiosis*, *epileptico-furialis*“ rectius legitur: *epileptico-maniacis*, *epileptico-melancholicis*.

60, 187 Gothofredus Thomasius in 1695 u. 1696

